

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลกรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 โดยภาพรวมในขณะนี้ ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ พบว่าตัวบ่งชี้อาการป่วยโรคทางเดินหายใจ และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในภาพรวมเพิ่มขึ้น ประเทศในอเมริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) pdm09 และ ชนิด B หมุนเวียนกัน ประเทศในทวีปยุโรป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาค พบว่าบางประเทศในยุโรปเหนือเข้าสู่จุดสูงสุด ประเทศในเอเชียกลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ทุกชนิด ประเทศในแอฟริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ในประเทศแอลจีเรีย และประเทศตูนิเซีย โดยพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) pdm09 และ ชนิด B ประเทศในเอเชียตะวันตก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมยังคงสูง แต่มีบางประเทศที่สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง เอเชียตะวันออก พบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในภาพรวมยังคงเพิ่มขึ้น ประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน และประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน ยกเว้น ประเทศเม็กซิโก ที่มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1) pdm09 เพิ่มขึ้น ประเทศในเขตร้อนอเมริกาใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ประเทศในเขตร้อนแอฟริกา มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศในเอเชียใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำในประเทศที่มีการรายงาน ยกเว้นประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงในประเทศส่วนใหญ่ที่มีการรายงาน ในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก ส่วนใหญ่ยังคงพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง รายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** พบตัวบ่งชี้อาการป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นในหลายประเทศ ประเทศในอเมริกาเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ประเทศแคนาดา พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทั้งชนิด A และชนิด B ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1)pdm09 และพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B (mainly B/Victoria lineage) สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่าร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ลดลง ซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มค่าเฉลี่ยของฤดูกาลที่ผ่านมา

จำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น และยังคงสูงกว่าค่าที่สูงที่สุดของข้อมูลย้อนหลัง 5 ปี ในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ยังคงต่ำกว่าระดับสูงสุดในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และพบว่าจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากโรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น แต่มีแนวโน้มลดลงกว่าช่วง 2-3 สัปดาห์ก่อนหน้านี้ ในฤดูกาลนี้ เชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่พบในโรงพยาบาล ร้อยละ 80 เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1)pdm09 อย่างไรก็ตาม พบว่าจากการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลประมาณร้อยละ 50 เป็นไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ในสหรัฐอเมริกา สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ทั้งชนิด A และชนิด B โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1)pdm09 ตามด้วย ชนิด B/Victoria และพบว่าจำนวนผู้ป่วย ILI ยังคงอยู่ในระดับสูง อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอยู่ในระดับใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา และร้อยละการตายจากโรคปอดบวม และโรคไข้หวัดใหญ่ จะต่ำกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรค ภูมิภาคพื้นยุโรป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค และพบว่าเข้าสู่จุดสูงสุดในบางประเทศ ในยุโรปตอนเหนือ การตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ และตัวชี้วัดการเฝ้าระวังกลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่ ลดลง แม้จะมีการรายงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางประเทศ เช่น ประเทศเดนมาร์ก ไอร์แลนด์ ลิทัวเนีย และนอร์เวย์ โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศไอร์แลนด์ ผู้ป่วย ILI และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน สหราชอาณาจักร และไอร์แลนด์เหนือ (UK) สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และตัวบ่งชี้อาการป่วยโรคทางเดินหายใจ ลดลงอย่างต่อเนื่อง และอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ในยุโรปตะวันออก ผู้ป่วย ILI และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ ชนิด B ในยุโรปตะวันตกเฉียงใต้ ผู้ป่วย ILI และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ความรุนแรงปานกลาง ในประเทศส่วนใหญ่ที่รายงาน ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A


- เอเชียกลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น โดยพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทุกชนิด
- แอฟริกาเหนือ สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศแอลจีเรีย และตูนิเซีย โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1) pdm09 ตามมาด้วยชนิด B ประเทศอียิปต์ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1) pdm09 และ ชนิด B หมุนเวียนกันไป
- ภูมิภาคเอเชียตะวันตก สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้นทั่วทั้งภูมิภาค ประเทศอาร์เมเนีย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น ประเทศอิสราเอล เลบานอน และตุรกี สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ยังคงเพิ่มขึ้น โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1) pdm09 และชนิด B ประเทศกาตาร์ ร้อยละของโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เป็นครั้งที่ 2 ในช่วงฤดูกาลนี้ โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1) pdm09 ในประเทศอิรัก คูเวต โอมาน เขตเวสแบงก์ และฉนวนกาซา และประเทศซาอุดีอาระเบีย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A และชนิด B ในสัดส่วนที่แตกต่างกัน

- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาค สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้น ประเทศจีน พบรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มขึ้นอีกครั้ง หลังจากมีรายงานลดลงเล็กน้อย ในสัปดาห์ที่ผ่านมา และอยู่ในระดับที่สูงกว่า จากการรายงานในช่วงเวลาเดียวกันของ 3 ฤดูกาล ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม พบว่าเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2) และชนิด B/Victoria lineage ลดลงอย่างต่อเนื่อง เขตปกครองพิเศษฮ่องกง และเขตปกครองพิเศษไทเป พบรายงานผู้ป่วย ILI และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ประเทศมองโกเลีย พบว่าตัวบ่งชี้การป่วยโรคทางเดินหายใจ อยู่ในระดับสูง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H3N2)
- ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต้ ประเทศในแถบแคริบเบียน และประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ยกเว้น ประเทศเม็กซิโก ที่สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1)pdm09 ประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ ประเทศโคลัมเบีย และเอกวาดอร์ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลง ส่วนใหญ่ตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A (H1N1)pdm09
- ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา แอฟริกาตะวันตก และแอฟริกาตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน แอฟริกากลาง ประเทศคองโก การตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลลดลง ทุกชนิด ประเทศแซมเบีย การรายงานผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
- ประเทศเอเชียเขตร้อน ในเอเชียใต้ รายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ ทั่วทั้งภูมิภาค ยกเว้นประเทศอัฟกานิสถาน มีรายงานผู้ป่วย ILI และรายงานการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเทศอิหร่าน และเนปาล พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B และ ชนิด A ในระดับต่ำ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลงในประเทศที่มีการรายงาน
- ประเทศเขตอบอุ่นซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับไข้หวัดตามฤดูกาล

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_02_17_surveillance_update_361.pdf?ua=1


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 3 มีนาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 76,723 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 115.72 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 2 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 480.86 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 416.30 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 250.54 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กจึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	32,453	0	193.67	0.00	0.00
เหนือ	21,070	0	169.43	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	19,573	1	88.96	0.00	0.01
ใต้	3,627	1	38.48	0.01	0.03

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 193.67 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 169.43 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 88.96 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 38.48 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนรวมทั้งหมด 2 ราย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ราย และภาคใต้ 1 ราย


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พะเยา	1,894	397.77
2	เชียงใหม่	6,463	368.20
3	หนองคาย	1,720	329.51
4	กรุงเทพมหานคร	16,586	292.03
5	ระยอง	2,002	279.11

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา อัตราป่วย 397.77 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 368.20 ต่อประชากรแสนคน หนองคาย อัตราป่วย 329.51 ต่อประชากรแสนคน กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 292.03 ต่อประชากรแสนคน และระยอง อัตราป่วย 279.11 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 292.03 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 251.76 ต่อประชากรแสนคน และ เขตบริการสุขภาพที่ 9 อัตราป่วย 126.02 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 3 มีนาคม 2563)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	76723	2	66301242	115.72	0.00	0.00
ภาคเหนือ	21070	0	12436028	169.43	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่/เครือข่ายบริการที่ 1	23107	0	5878537	251.76	0.00	0.00
เชียงใหม่	12289	0	1755291	368.20	0.00	0.00
เชียงราย	3031	0	1289873	223.98	0.00	0.00
ลำปาง	2415	0	744714	199.14	0.00	0.00
ลำพูน	1675	0	405936	178.11	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	448	0	280826	37.39	0.00	0.00
น่าน	1047	0	479414	107.21	0.00	0.00
พะเยา	1561	0	476157	397.77	0.00	0.00
แพร่	641	0	446326	163.33	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/เครือข่ายบริการที่ 2	6612	0	3565071	94.98	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	1105	0	994936	99.91	0.00	0.00
พิษณุโลก	2693	0	866129	154.25	0.00	0.00
สุโขทัย	1032	0	598287	46.13	0.00	0.00
ตาก	590	0	649472	42.34	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1192	0	456247	110.69	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/เครือข่ายบริการที่ 3	7212	0	2992420	96.38	0.00	0.00
ชัยนาท	126	0	328993	31.00	0.00	0.00
กำแพงเพชร	2259	0	728470	53.26	0.00	0.00
นครสวรรค์	3742	0	1064649	163.25	0.00	0.00
พิจิตร	707	0	540620	90.82	0.00	0.00
อุทัยธานี	378	0	329688	50.05	0.00	0.00



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	32453	0	16756435	193.67	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	2725	0	5343264	51.00	0.00	0.00
อ่างทอง	273	0	281014	97.15	0.00	0.00
ลพบุรี	356	0	758003	46.97	0.00	0.00
นครนายก	146	0	259718	56.21	0.00	0.00
นนทบุรี	547	0	1238015	44.18	0.00	0.00
อยุธยา	566	0	815647	69.39	0.00	0.00
ปทุมธานี	539	0	1137603	47.38	0.00	0.00
สระบุรี	246	0	643531	38.23	0.00	0.00
สิงห์บุรี	52	0	209733	24.79	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	5705	0	5324608	107.14	0.00	0.00
กาญจนบุรี	855	0	890565	96.01	0.00	0.00
นครปฐม	1742	0	914273	190.53	0.00	0.00
เพชรบุรี	364	0	483335	75.31	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	540	0	546396	98.83	0.00	0.00
ราชบุรี	405	0	872615	46.41	0.00	0.00
สมุทรสาคร	501	0	573215	87.40	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	146	0	193847	75.32	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	1152	0	850362	135.47	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	7437	0	6088563	122.15	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	1229	0	712449	172.50	0.00	0.00
จันทบุรี	663	0	535478	123.81	0.00	0.00
ชลบุรี	1383	0	1522285	90.85	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	420	0	489592	85.79	0.00	0.00
ระยอง	2002	0	717276	279.11	0.00	0.00
สระแก้ว	88	0	563014	15.63	0.00	0.00
สมุทรปราการ	1582	0	1318687	119.97	0.00	0.00
ตราด	70	0	229782	30.46	0.00	0.00

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases


จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	19573	1	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	3942	0	5062199	77.87	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	327	0	985676	33.18	0.00	0.00
ขอนแก่น	2496	0	1805903	138.21	0.00	0.00
มหาสารคาม	564	0	963060	58.56	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	555	0	1307560	42.45	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	3855	0	5553738	69.41	0.00	0.00
บึงกาฬ	86	0	423485	20.31	0.00	0.00
เลย	486	0	642220	75.68	0.00	0.00
นครพนม	508	0	718406	70.71	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	492	0	511878	96.12	0.00	0.00
หนองคาย	1720	0	521995	329.51	0.00	0.00
สกลนคร	201	0	1150876	17.46	0.00	0.00
อุดรธานี	362	0	1584878	22.84	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	8535	1	6772779	126.02	0.01	0.01
บุรีรัมย์	1671	0	1593378	104.87	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1458	0	1139067	128.00	0.00	0.00
นครราชสีมา	4831	1	2642815	182.80	0.04	0.02
สุรินทร์	575	0	1397519	41.14	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/เครือข่ายบริการที่ 10	3241	0	4613643	70.25	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	103	0	378363	27.22	0.00	0.00
มุกดาหาร	456	0	351532	129.72	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	445	0	1472521	30.22	0.00	0.00
อุบลราชธานี	1929	0	1872091	103.04	0.00	0.00
ยโสธร	308	0	539136	57.13	0.00	0.00

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	3627	1	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/เครือข่าย บริการที่ 11	2447	1	4466673	54.78	0.02	0.04
ชุมพร	337	0	510307	66.04	0.00	0.00
กระบี่	171	0	471754	36.25	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	544	0	1558958	34.90	0.00	0.00
พังงา	133	0	267866	49.65	0.00	0.00
ภูเก็ต	418	0	406113	102.93	0.00	0.00
ระนอง	26	0	191134	13.60	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	818	1	1060541	77.13	0.09	0.12
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	1180	0	4960215	23.79	0.00	0.00
นราธิวาส	432	0	799357	54.04	0.00	0.00
ปัตตานี	53	0	713937	7.42	0.00	0.00
พัทลุง	194	0	524951	36.96	0.00	0.00
สตูล	29	0	320637	9.04	0.00	0.00
สงขลา	303	0	1428429	21.21	0.00	0.00
ตรัง	97	0	643093	15.08	0.00	0.00
ยะลา	72	0	529811	13.59	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	16586	0	5679532	292.03	0.00	0.00

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 – 3 มีนาคม 2563 พบจำนวน 19 เหตุการณ์ ใน 14 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 7 เหตุการณ์ เรือนจำ 4 เหตุการณ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ และโครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของ คนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิง ในเอกสารวิชาการ การนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปลสถานการณ์ประจำปี