


สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ ประเทศไทย พ.ศ. 2563 (ประจำสัปดาห์ที่ 13)

กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค


ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 - 4 เมษายน 2563 มีรายงานผู้ป่วย 94,598 ราย อัตราป่วย 142.44 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย ในจังหวัดนครราชสีมา 2 ราย จังหวัดหนองบัวลำภูและสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย อัตราป่วยตาย 0.004 สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ 2 ราย ยังไม่ทราบเชื้อ 2 ราย ในสัปดาห์นี้รายงานผู้ป่วยยังคงมีแนวโน้มลดลงและไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ดังแสดงในรูปที่ 1



รูปที่ 1 จำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตไข้หวัดใหญ่รายสัปดาห์ ประเทศไทย ปี 2562, 2563
เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปี


กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่มักพบในเด็กเล็กกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี เท่ากับ 604.80 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (403.35) และ 25-34 ปี (103.06) ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 2

ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ ภาคเหนือ 211.76 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นภาคกลาง (170.29) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (114.23) และภาคใต้ (52.04) ตามลำดับ



รูปที่ 2 อัตราป่วยไข้หวัดใหญ่ต่อแสนประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุ

จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก ได้แก่ พะเยา อัตราป่วย 447.96 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ (406.83) นongคาย (350.19) กรุงเทพมหานคร (329.43) ระยอง (323.86) เชียงราย (260.34) ลำปาง (240.36) นครปฐม (237.02) พิษณุโลก (232.64) และนครราชสีมา (228.77) ตามลำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3



ลำดับ	จังหวัด	อัตราป่วยต่อแสนประชากร
1	พะเยา	447.96
2	เชียงใหม่	406.83
3	หนองคาย	350.19
4	กรุงเทพมหานคร	329.43
5	ระยอง	323.86
6	เชียงราย	260.34
7	ลำปาง	240.36
8	นครปฐม	237.02
9	พิษณุโลก	232.64
10	นครราชสีมา	228.77

รูปที่ 3 อัตราป่วยไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด และจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูง 10 อันดับแรก



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข


Department of Disease Control, Ministry of Public Health

กองระบาดวิทยา Division of Epidemiology

www.ddc.moph.go.th โทร: 0 2590 3800 โทรสาร: 0 2590 3845

ผู้เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ 4 ราย เป็นเพศหญิง 3 ราย เพศชาย 1 ราย อายุอยู่ระหว่าง 36 – 77 ปี มีผู้เสียชีวิต 2 ราย มีปัจจัยเสี่ยงร่วม คือ มี BMI > 30 หรือมีภาวะอ้วน และไม่มีประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และอีก 2 ราย อยู่ระหว่างการติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

ผลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 4 เมษายน 2563 ได้รับตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 1,062 ราย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 265 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.95 ในจำนวนเชื้อไข้หวัดใหญ่ทั้งหมดจำแนกเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1(2009) 188 ราย (70.94) ชนิด A/H3N2 66 ราย (24.91) และชนิด B 11 ราย (4.15) สัปดาห์ที่ 13 (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2563) ได้รับตัวอย่างส่งตรวจทั้งสิ้น 16 ราย จากโรงพยาบาลเครือข่าย 6 แห่ง พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 เป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H3 ทั้ง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 100 จากการติดตามอาการผู้ป่วยทั้ง 16 ราย จนถึงวันที่ 4 เมษายน 2563 ไม่พบผู้เสียชีวิต ในสัปดาห์นี้ พบว่าจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าในช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสัดส่วนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ต่ำลงอย่างต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่ 2 ส่วนหนึ่งอาจเป็นผลมาจากการระบาดของ COVID-19 ซึ่งมาด้วยอาการทางเดินหายใจเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ ดังนั้น บุคลากรทางการแพทย์จึงควรซักประวัติเสี่ยงของผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจโดยละเอียดเพื่อจำแนกชนิดของผู้ป่วยและให้การรักษานอกจากนี้สัดส่วนของเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H1 2009 ยังคงพบเชื้อสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่ 38 ของปี 2562 ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 จำนวนตัวอย่างผู้ป่วยที่ส่งตรวจ และผลการตรวจหาเชื้อสาเหตุก่อโรคไข้หวัดใหญ่สะสม
ตั้งแต่ มกราคม 2562 – 4 เมษายน 2563



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control


กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

Department of Disease Control, Ministry of Public Health

กองระบาดวิทยา Division of Epidemiology

www.ddc.moph.go.th โทร: 0 2590 3800 โทรสาร: 0 2590 3845

จากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 เมษายน 2563 มีรายงานการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่สะสมทั้งหมด 25 เหตุการณ์ ใน 15 จังหวัด มีรายงานมากที่สุด 1 ในจังหวัดเชียงใหม่ อุบลราชธานี จังหวัดละ 3 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นเพชรบูรณ์ นนทบุรี ลำพูน สุรินทร์ สระบุรี จังหวัดละ 2 เหตุการณ์ นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ อุดรธานี ตรัง ลพบุรี และสุโขทัย จังหวัดละ 1 เหตุการณ์ เป็นการระบาดในโรงเรียนจำนวน 11 เหตุการณ์ รองลงมาเป็นเรือนจำ 8 เหตุการณ์ สถานที่ทำงานและค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งละ 3 เหตุการณ์ เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A/H1N1(2009) 9 เหตุการณ์ ชนิดเอ (ไม่ทราบสายพันธุ์) 6 เหตุการณ์ ชนิด A/H3N2 2 เหตุการณ์ และชนิดบี 1 เหตุการณ์ พบทั้งเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ และชนิดบี 1 เหตุการณ์ ไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ 3 เหตุการณ์ ไม่ระบุเชื้อสาเหตุ 3 เหตุการณ์ ปัจจุบันจากการเฝ้าระวังเหตุการณ์ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 9 เมษายน 2563 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ 1 เหตุการณ์ ในจังหวัดสุโขทัย พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 405 ราย โดยผู้ป่วยรายแรกเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ (พยาบาล) เริ่มป่วยวันที่ 16 มีนาคม 2563 ด้วยอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ซึ่งไม่ได้แยกกักตนเอง ส่งผลให้ผู้ต้องขังชายป่วย 404 ราย โดยเริ่มป่วยวันที่ 21 มีนาคม 2563 จากนั้นได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งตรวจที่กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.2 พิษณุโลก ผลพบเชื้อ Influenza A จำนวน 1 ราย และพบเชื้อ Influenza A virus (H1N1) จำนวน 4 ราย ผู้ป่วยทุกรายได้รับยาต้านไวรัส Oseltamivir ดังแสดงในรูปที่ 5



รูปที่ 5 จำนวนเหตุการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ แยกรายเดือน และสถานที่ที่พบการระบาด ตั้งแต่ 1 มกราคม 2562 – 9 เมษายน 2563

เรียบเรียงโดย: อ้อยทิพย์ ยาโสภา กองระบาดวิทยา