

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่า ข้อมูลระบาดวิทยา และไวรัสวิทยาในปัจจุบัน ควรวิเคราะห์และอธิบายผล อย่างระมัดระวัง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ แตกต่างไป เนื่องจากประเทศสมาชิก มีมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยเช่นกัน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 27 เมษายน 2563 โดยภาพรวมในขณะนี้ ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมอยู่ในระดับต่ำ พบการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นในประเทศเครือข่ายยุโรป ประเทศในแถบทะเลแคริบเบียน และประเทศในอเมริกากลาง มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นในหลายประเทศของภูมิภาคย่อย สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ และโรคจากระบบทางเดินหายใจอื่นๆ อยู่ในระดับต่ำ ประเทศในเขตร้อนอเมริกาใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ ประเทศในแอฟริกาเขตร้อน มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในระดับต่ำ ยกเว้นประเทศโมซัมบิก ประเทศในเอเชียใต้ มีการรายงาน ILI และ SARI ลดลงในประเทศอัฟกานิสถาน และภูฏาน ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน ในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทั้งทั้งภูมิภาค มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลงในประเทศชิลี และโปรตุเกส สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และชนิด B ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง และรายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

ช่วงระหว่างการรายงานสถานการณ์ มีหลายประเทศที่ตรวจตัวอย่างส่งตรวจโรคไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 และพบว่า บางตัวอย่างให้ผลบวกกับ COVID-19 ดังนั้น องค์การอนามัยโลก จึงสนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 เพื่อสร้างรูปแบบการรายงานในระดับภูมิภาค และระดับโลก

- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำ ทั้งทั้งภูมิภาค ประเทศในอเมริกาเหนือ ตัวชี้วัดโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำมาก ยกเว้น ร้อยละของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) ในสหรัฐอเมริกา พบว่าสูงกว่าระดับฤดูกาลเล็กน้อย อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสะสม อยู่ในระดับใกล้เคียงกับฤดูกาลที่ผ่านมา ยกเว้นในวัยเด็ก และวัยรุ่นหนุ่มสาว ที่พบว่าสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมา ร้อยละการเสียชีวิตจากโรคปอดบวม และโรคไข้หวัดใหญ่ สูงกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรค

- ในยุโรป สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งภูมิภาค มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มขึ้นในประเทศเอสโตเนีย และเนเธอร์แลนด์ และลดลงในประเทศไอร์แลนด์ และเบลเยียม แต่ยังคงสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ผู้ป่วยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นในประเทศรัสเซีย การตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่น้อยในประเทศที่มีการรายงาน ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และชนิด B การคาดการณ์อัตราการตายแบบรวมจากเครือข่าย EuroMOMO พบว่า การเสียชีวิตจากทุกสาเหตุเพิ่มขึ้น ซึ่งพบว่าการเสียชีวิตที่มากขึ้นในยุโรปบางประเทศ มาจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 และพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป ตามด้วย กลุ่มอายุ 15-64 ปี
- เอเชียกลาง และแอฟริกาเหนือ ไม่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ เอเชียตะวันตก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ต่ำลงในประเทศที่มีการรายงาน เอเชียตะวันออก ตัวบ่งชี้การป่วยโรคทางเดินหายใจ และสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทุกประเทศ ทั่วทั้งภูมิภาค
- ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต้ ประเทศในแถบแคริบเบียน และประเทศในอเมริกากลาง สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ มีน้อย ในประเทศที่มีการรายงาน มีรายงานการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ในสาธารณรัฐโดมินิกัน เฮติ ฮอนดูรัส และจาไมกา ในขณะที่ SARI ในประเทศคอสตาริกา ลดลง ประเทศแม็กซิโก สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B/Victoria ประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ มีการตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ น้อยลงในประเทศโบลิเวีย และบราซิล
- ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา ไม่มีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในทุกประเทศที่มีการรายงาน มีรายงานพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1)pdm09 ในประเทศโมซัมบิก ประเทศมาลี มีรายงานผู้ป่วย ILI ลดลง แต่รายงาน SARI เพิ่มขึ้น
- ประเทศเอเชียเขตร้อน ในเอเชียใต้ ไม่มีการตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศที่มีการรายงาน การรายงานผู้ป่วย ILI และ SARI ลดลงเล็กน้อยในประเทศอัฟกานิสถาน และประเทศภูฏาน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ลดลงทั่วทั้งภูมิภาค สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว การรายงานผู้ป่วย ILI และ SARI ลดลง และไม่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
- ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับของไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล บางส่วนของออสเตรเลีย มีข้อมูล พบอาการโรคระบบทางเดินหายใจสูงกว่าค่าการพยากรณ์ ในช่วงเวลานี้ของปี สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่จะอยู่ในช่วงไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล แอฟริกาใต้ พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A(H1N1)pdm09 ในระดับต่ำ ในเขตอบอุ่นของอเมริกาใต้ มีรายงานการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลงในประเทศชิลี และประเทศปารากวัย มีรายงานอัตราผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในประเทศปารากวัย

ที่มา : องค์การอนามัยโลก


https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_04_27_surveillance_update_366.pdf?ua=1



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 7 พฤษภาคม 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศ จำนวน 98,831 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 149.06 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลง ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 634.05 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 520.82 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 311.45 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กจึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	40,287	0	240.43	0.00	0.00
เหนือ	26,544	0	213.44	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	26,458	2	120.25	0.01	0.01
ใต้	5,542	1	58.79	0.01	0.02

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 240.43 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 213.44 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 120.25 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 58.79 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนรวมทั้งหมด 3 ราย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย และภาคใต้ 1 ราย

❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พะเยา	2,158	453.21
2	เชียงใหม่	7,278	414.63
3	หนองคาย	1,833	351.15
4	กรุงเทพมหานคร	18,893	332.65
5	ระยอง	2,354	328.19

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา




สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา อัตราป่วย 453.21 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 414.63 ต่อประชากรแสนคน หนองคาย อัตราป่วย 351.15 ต่อประชากรแสนคน กรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 332.65 ต่อประชากรแสนคน และระยอง อัตราป่วย 328.19 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพ และกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 332.65 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 295.29 ต่อประชากรแสนคน และ เขตบริการสุขภาพที่ 6 อัตราป่วย 162.26 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	98831	3	66301242	149.06	0.00	0.00
ภาคเหนือ	26544	0	12436028	213.44	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่/เครือข่ายบริการที่ 1	23107	0	5878537	295.29	0.00	0.00
เชียงใหม่	12289	0	1755291	414.63	0.00	0.00
เชียงราย	3031	0	1289873	265.14	0.00	0.00
ลำปาง	2415	0	744714	246.00	0.00	0.00
ลำพูน	1675	0	405936	195.84	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	448	0	280826	112.88	0.00	0.00
น่าน	1047	0	479414	157.90	0.00	0.00
พะเยา	1561	0	476157	453.21	0.00	0.00
แพร่	641	0	446326	179.69	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/เครือข่ายบริการที่ 2	6612	0	3565071	147.01	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	1105	0	994936	132.17	0.00	0.00
พิษณุโลก	2693	0	866129	242.23	0.00	0.00
สุโขทัย	1032	0	598287	114.66	0.00	0.00
ตาก	590	0	649472	72.37	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1192	0	456247	147.29	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/เครือข่ายบริการที่ 3	7212	0	2992420	131.80	0.00	0.00
ชัยนาท	126	0	328993	39.82	0.00	0.00
กำแพงเพชร	2259	0	728470	103.92	0.00	0.00
นครสวรรค์	3742	0	1064649	203.17	0.00	0.00
พิจิตร	707	0	540620	119.31	0.00	0.00
อุทัยธานี	378	0	329688	75.22	0.00	0.00



สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	40287	0	16756435	240.43	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	3728	0	5343264	69.77	0.00	0.00
อ่างทอง	349	0	281014	124.19	0.00	0.00
ลพบุรี	511	0	758003	67.41	0.00	0.00
นครนายก	184	0	259718	70.85	0.00	0.00
นนทบุรี	668	0	1238015	53.96	0.00	0.00
อยุธยา	845	0	815647	103.60	0.00	0.00
ปทุมธานี	630	0	1137603	55.38	0.00	0.00
สระบุรี	430	0	643531	66.82	0.00	0.00
สิงห์บุรี	111	0	209733	52.92	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	7787	0	5324608	146.25	0.00	0.00
กาญจนบุรี	1338	0	890565	150.24	0.00	0.00
นครปฐม	2190	0	914273	239.53	0.00	0.00
เพชรบุรี	442	0	483335	91.45	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	682	0	546396	124.82	0.00	0.00
ราชบุรี	815	0	872615	93.40	0.00	0.00
สมุทรสาคร	751	0	573215	131.02	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	230	0	193847	118.65	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	1339	0	850362	157.46	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	9879	0	6088563	162.26	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	1570	0	712449	220.37	0.00	0.00
จันทบุรี	885	0	535478	165.27	0.00	0.00
ชลบุรี	2085	0	1522285	136.97	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	648	0	489592	132.36	0.00	0.00
ระยอง	2354	0	717276	328.19	0.00	0.00
สระแก้ว	150	0	563014	26.64	0.00	0.00
สมุทรปราการ	2109	0	1318687	159.93	0.00	0.00
ตราด	78	0	229782	33.95	0.00	0.00



กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วย ตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	26458	2	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	5288	0	5062199	104.46	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	476	0	985676	48.29	0.00	0.00
ขอนแก่น	3146	0	1805903	174.21	0.00	0.00
มหาสารคาม	859	0	963060	89.19	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	807	0	1307560	61.72	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	5482	0	5553738	98.71	0.00	0.00
บึงกาฬ	440	0	423485	103.90	0.00	0.00
เลย	754	0	642220	117.41	0.00	0.00
นครพนม	824	0	718406	114.70	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	557	0	511878	108.81	0.00	0.00
หนองคาย	1833	0	521995	351.15	0.00	0.00
สกลนคร	393	0	1150876	34.15	0.00	0.00
อุดรธานี	681	0	1584878	42.97	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	10763	2	6772779	158.92	0.03	0.02
บุรีรัมย์	2086	0	1593378	130.92	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1692	0	1139067	148.54	0.00	0.00
นครราชสีมา	6315	2	2642815	238.95	0.08	0.03
สุรินทร์	670	0	1397519	47.94	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/เครือข่ายบริการที่ 10	4925	0	4613643	106.75	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	273	0	378363	72.15	0.00	0.00
มุกดาหาร	638	0	351532	181.49	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	661	0	1472521	44.89	0.00	0.00
อุบลราชธานี	2883	0	1872091	154.00	0.00	0.00
ยโสธร	470	0	539136	87.18	0.00	0.00




กรมควบคุมโรค
กองโรคติดต่อทั่วไป

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	5542	1	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/เครือข่าย บริการที่ 11	3735	1	4466673	83.62	0.02	0.03
ชุมพร	604	0	510307	118.36	0.00	0.00
กระบี่	273	0	471754	57.87	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	1066	0	1558958	68.38	0.00	0.00
พังงา	298	0	267866	111.25	0.00	0.00
ภูเก็ต	446	0	406113	109.82	0.00	0.00
ระนอง	48	0	191134	25.11	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	1000	1	1060541	94.29	0.09	0.10
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	1807	0	4960215	36.43	0.00	0.00
นราธิวาส	606	0	799357	75.81	0.00	0.00
ปัตตานี	61	0	713937	8.54	0.00	0.00
พัทลุง	373	0	524951	71.05	0.00	0.00
สตูล	48	0	320637	14.97	0.00	0.00
สงขลา	440	0	1428429	30.80	0.00	0.00
ตรัง	156	0	643093	24.26	0.00	0.00
ยะลา	123	0	529811	23.22	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	18893	0	5679532	332.65	0.00	0.00

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 พฤษภาคม 2563 พบจำนวน 25 เหตุการณ์ ใน 18 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 7 เหตุการณ์ เรือนจำ 9 เหตุการณ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เหตุการณ์ และค่ายบำบัดยาเสพติด 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัว

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการ การนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปสถานการณ์ประจำปี