

ด่วนที่สุด

ପ୍ରକାଶିତ ଦିନ ୦୫୮୮୯୮୮/୧୦୩୮୩



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวนันท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

၁၇ พฤษาคม ၂၄၀၈

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทำโดยยุ่ง滥ใช้ชิงรุกในพื้นที่  
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน้ำโดยยังลายเขิงรกรในพื้นที่ จำนวน ๔ แห่ง

ด้วยสถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ พบรู้ป่วยสะสม ๑๐,๐๘๓ ราย ผู้ป่วยเสียชีวิต ๙ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๙ ซึ่งต่ำกว่าปี ๒๕๖๒ แต่ยังสูงกว่าปี ๒๕๖๐ และปี ๒๕๖๑ อีกทั้งข้อมูลจากการพยากรณ์โรค คาดว่าในปีนี้จะมีผู้ป่วยสูงถึง ๗๐,๐๐๐ ราย โดยในช่วงฤดูฝน อาจมีผู้ป่วยจำนวน ๑๐,๐๐๐ รายต่อเดือน โรคไข้ปวดข้อยุงลาย พบรู้ป่วยสะสม ๘๗๕ ราย อัตราป่วย ๑.๓๔ ต่อประชากรแสนคน และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา พบรู้ป่วย ในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ๑ ราย และหารักษาเบี้ยงเล็ก ๒ ราย ประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ยังคงพบรายงานผู้ป่วยรายใหม่ เจ้าหน้าที่และบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข ต้องเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากมีการป่วยเป็นโรคติดต่อนำโดยยุงลายร่วมด้วย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก จะทำให้การรักษาลำบากและอาการรุนแรงมากขึ้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย แต่ยังสามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุงลายได้ กระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เชิงรุกในพื้นที่ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์กองโรคติดต่อนำโดยแมลง <http://ddc.moph.go.th/dbv/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความร่วมมือในเรื่องดังกล่าวต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

## ขอแสดงความนับถือ

‘(นายศุภกิจ ศรีลักษณ์)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มการกิจเจ้านพัฒนาการสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค  
กองโรคติดต่อน้ำโดยแมลง  
โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๐๔ - ๕  
โทรสาร ๐ ๒๕๕๑ ๘๗๗๓  
สำเนาส่ง สำนักงานป้องกันฯ



## มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่

### กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย เป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญระดับประเทศ ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคไข้ป่าดูดซอก แล้วโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยจะมีแนวโน้มการระบาดสูงขึ้นในช่วงฤดูฝน ระหว่างเดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปัจจุบัน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๓ จากข้อมูลรายงาน ๕๐๖ กองระบบวิทยา ดังนี้

#### สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลาย

- โรคไข้เลือดออก มีผู้ป่วยสะสม ๑๐,๐๙๓ ราย อัตราป่วย ๐.๐๙ ต่อประชากรแสนคน โดยมีรายงานจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ร้อยละ ๔๔ แต่จำนวนผู้ป่วยยังสูงกว่าปี ๒๕๖๑ และ ๒๕๖๐ ผู้ป่วยเสียชีวิต ๔ ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ ๐.๐๙
- โรคไข้ป่าดูดซอก มีรายงานผู้ป่วยสะสม ๘๗๕ ราย อัตราป่วย ๑.๓๔ ต่อประชากรแสนคน ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบรู้ป่วยมากในภาคกลางและภาคใต้
- โรคติดเชื้อไวรัสซิกา มีรายงานผู้ติดเชื้อในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ๑ ราย และหารถศรีษะเล็ก ๒ ราย

#### ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลาย

ในเดือนเมษายน ๒๕๖๓ (โปรแกรมทันระบาด) พบว่า ผลสำรวจลูกน้ำยุงลายเกินร้อยละ ๑๐ ของบ้าน โรงเรียน และสถานสถานที่สำรวจในชุมชน ยังพบแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยเฉพาะอำเภอที่มีการระบาดต่อเนื่องเกิน ๒๘ วัน เกือบทุกอำเภอ มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในชุมชนเกินเกณฑ์มาตรฐาน ( $HI > 5$ ) ซึ่งถือว่ายังมีพำนักระยะที่โรคในหลายพื้นที่ ดังนั้น เมื่อเข้าฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูการระบาดของโรค จะทำให้มีโอกาสการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกมากขึ้นได้

#### ผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้

- ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก márับการรักษาในโรงพยาบาลล่าช้า เนื่องจากมีความกังวลเสี่ยงติด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- กิจกรรมรณรงค์ ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ไม่สามารถดำเนินการได้
- ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ เนื่องจาก ต้องมีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก
- ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ได้
- เจ้าหน้าที่ บุคลากร มีภาระงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
- สถานที่สาธารณะที่ถูกปิด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น สนามกีฬา สวนสุขภาพ สวนสาธารณะ สถานศึกษา เป็นต้น รวมทั้งศาสนสถาน โรงแรมที่มีประชาชนไป น้อยลง ทำให้อาจไม่มีผู้ดูแลจัดการสิ่งแวดล้อม อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้

#### มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่

เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้ดูแลรับผิดชอบในแต่ละสถานที่มีความปลอดภัย แต่ยังสามารถดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายได้ ขอให้ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ประชาชนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง ทุกสัปดาห์

๒. ให้ดำเนินการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุกสัปดาห์ ในชุมชนพื้นที่สาธารณะทุกแห่ง โดยเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน/จิตอาสาที่ดูแลพื้นที่ และควรมีผู้รับผิดชอบ ติดตามผล

**การดำเนินงาน เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล ทุก ๒ สัปดาห์ โดย มีอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เป็นต้น**

๓. ในสถานที่ที่ปิดชั่วคราว เช่น โรงเรียน โรงแรม ความมีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยผู้รับผิดชอบสถานที่นั้นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งยุงพาหะสามารถเคลื่อนที่ไปยังสถานที่อื่นได้

#### ๔. ไม่วัดกิจกรรมรณรงค์ที่รวมกลุ่มคนจำนวนมาก

๕. การดำเนินกิจกรรมของจิตอาสาต้องมีระยะห่างระหว่างบุคคล ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วม กิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ เช่น จัดสถานที่ให้กว้างขวางเพียงพอ ไม่ให้นั่งหรือยืนอยู่ร่วมกันอย่างเบียดเสียด กระจายมุ่งบริการอาหารและเครื่องดื่ม

๖. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดโปร่ง กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร หน้ากากอนามัย เศษใบไม้ เป็นต้น

๗. เมื่อพบผู้ป่วยรายใหม่ของหมู่บ้านหรือชุมชน ยังต้องดำเนินมาตรการควบคุมโรค ๓-๓-๑ ในรัศมี ๑๐๐ เมตร รอบบ้านผู้ป่วย

๘. ให้ความรู้ สร้างความตระหนักร่องการป้องกันโรค ผ่านสื่อโซเชียล หรือสื่อทางสาย วิทยุชุมชน

### ค่าเป้าหมาย

๑. อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกน้อยกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ร้อยละ ๒๐

๒. ลดอัตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกไม่เกินร้อยละ ๐.๑๐

๓. ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด

- บ้าน ชุมชน HI < ๕

- โรงเรียน และรพ. CI = ๐

- โรงพยาบาล โรงแรม โรงงาน และ สถานที่ราชการ CI < ๕

| พื้นที่เป้าหมาย             | มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่   |
|-----------------------------|---|
| ๑. โรงเรียน<br>(บ้าน/ชุมชน) | <ul style="list-style-type: none"><li>ให้ประชาชนสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย <u>ในบ้านตนเอง ทุกสัปดาห์</u> ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงลายกัด เช่น ใช้สเปรย์กระป๋องฉีดพ่นยุงตัวเต็มวัย นอนกลางมุ้ง ใช้ยาจุดกันยุง</li><li>ให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจิตอาสา สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย <u>ในชุมชน สัปดาห์ละครั้งตามปกติ</u> และให้เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล และ สำนักงานสาธารณสุข อำเภอ ติดตามผลการดำเนินงานทุกสองสัปดาห์ โดยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องน้อยกว่า ๕ (<math>HI &lt; 5</math>)</li><li>ในพื้นที่สาธารณสุข เช่น สวนสาธารณะที่ถูกปิดไว้วันนາ ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเป็นประจำทุกสัปดาห์</li><li>กำจัดขยะ เน้นภาชนะใส่อาหารที่นำกลับไปที่บ้าน รวมทั้งหน้ากากอนามัย เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</li><li>งดการจัดตั้งร่องคูในรูปแบบกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก</li><li>ในการนีการจัดกิจกรรมจิตอาสา ควรลดความแออัดของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ เช่น จัดสถานที่ให้กว้างขวางเพียงพอ ไม่ให้นั่งหรือยืนอยู่ร่วมกันอย่างเบียดเสียด กระจายมุ่งบริการอาหารและเครื่องดื่ม</li></ul> |

| พื้นที่เป้าหมาย                                    | มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่   |
|--|---|
| ๒. โรงเรียน<br>(ศาสนสถาน :<br>วัด โบสถ์<br>มัสยิด) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา สำรวจ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เช่น เปลี่ยนน้ำในแจกัน มีฝ่าปิดอ่างน้ำ ในห้องน้ำ เป็นต้น โดยสำรวจสัปดาห์ละครึ่งตามปกติ และให้มีผู้รับผิดชอบติดตาม ผลการดำเนินงานด้วย <u>โดยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องน้อยกว่า ๕ (<math>CI&lt;5</math>)</u></li> <li>- ในการณ์ที่ประชาชนมาร่วมกิจกรรมทางศาสนา ควรเว้นระยะห่างที่นั่งอย่างน้อย ๑-๒ เมตร</li> <li>- ทำความสะอาด วัด มัสยิด โบสถ์ การตัดเศษใบไม้ ใต้ต้นไม้ กำจัดภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว เพื่อลดแหล่งน้ำขัง</li> </ul>   |
| ๓. โรงเรียน/<br>สถานศึกษา                          | <p><b>ก่อนเปิดภาคเรียนและช่วงปิดภาคเรียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน/สถานศึกษา กำจัดขยะ เก็บกวาดเศษ ใบไม้ ตัดต้นไม้ ทำให้สิ่งแวดล้อมปลอดโปร่ง สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำ ยุงลายในโรงเรียน เป็นประจำทุกสัปดาห์จนกระทั่งเปิดภาคเรียน เนื่องจากจะเข้าสู่ ฤดูฝนแล้ว และให้มีผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน <u>โดยก่อนเปิดภาคเรียน หนึ่งสัปดาห์ค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ (<math>CI=0</math>)</u></li> <li>- ในการณ์ที่มียุงจำนวนมาก ควรฉีดพ่นกำจัดยุงตัวเต็มวัยก่อนเปิดภาคเรียน ๑ สัปดาห์</li> </ul> <p><b>ระหว่างเปิดเรียน</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในโรงเรียน <u>เป็นประจำทุกสัปดาห์</u></li> <li>- สื่อสารให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ จัดการเรียนการ สอน/กิจกรรม โดยเว้นระยะห่างที่นั่งอย่างน้อย ๑-๒ เมตร</li> <li>- ดำเนินคัดกรองอาการป่วยเบื้องต้นและคัดกรองอุณหภูมินักเรียนก่อนเข้าเรียน เพื่อเฝ้าระวังการป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</li> </ul> |
| ๔. โรงเรือน  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสถานที่ด้านสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอก ไม่ให้มีแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น สวนหย่อม อ่างบัว กระถางต้นไม้ เป็นต้น <u>อย่างน้อยสัปดาห์ ๑ ครั้ง ทุกสัปดาห์</u> และให้มีผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน <u>โดยค่าดัชนี ลูกน้ำยุงลายต้องน้อยกว่า ๕ (<math>CI&lt;5</math>)</u></li> <li>- ในการณ์ที่พบยุงจำนวนมาก ให้ฉีดพ่นสเปรย์กำจัดยุงตัวเต็มวัยในห้องพักก่อนที่แขก จะเข้าพัก</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงให้พนักงานในองค์กร ได้รับความรู้</li> </ul>   |
| ๕. โรงพยาบาล                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีผู้รับผิดชอบสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง กำจัดเศษภาชนะที่ไม่ได้ใช้งานและมีน้ำขัง เช่น ที่ร่องน้ำทึ้งตื้อก้นน้ำ ขยะพลาสติก ขยะโฟม ควรจานรองกระถาง ทั้งหมด และทำอย่างต่อเนื่อง <u>สัปดาห์ละครึ่ง โดยเฉพาะบ้านพักเจ้าหน้าที่ใน</u></li> </ul>  |

|                  |  |
|------------------|--|
| พื้นที่เป้าหมาย  | มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายเชิงรุกในพื้นที่  |
|                  | <p>โรงพยาบาล และให้มีผู้รับผิดชอบติดตามผลการดำเนินงาน <b>โดยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องเป็นศูนย์ (CI=0)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำ Dengue corner ให้เป็นสัดส่วนชัดเจน เพื่อรับการระบบโรคไข้เลือดออก</li> <li>- สื่อสารให้ความรู้เรื่องอาการป่วยที่ต้องสงสัยโรคไข้เลือดออกให้เจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วย และผู้มารับบริการ ได้รับทราบถึงอาการที่ต้องมารับการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล</li> <li>- ควรแจกวิชาทางกันยุงให้ผู้ป่วย</li> <li>- เตรียมความพร้อมในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ก่อนช่วงฤดูการระบาด เช่น ทบทวนแนวทางการวินิจฉัยรักษาโรคไข้เลือดออก CPG, ทบทวนทะเบียนรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา</li> <li>- งดการใช้เจကันใส่น้ำปลูกตันไม้ แต่ถ้าใช้ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์</li> <li>- จัดทำมุ่งลดหรือมุ่งทาง่าย ในหอพักผู้ป่วยที่มีผู้ป่วยไข้เลือดออกพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล</li> </ul>                        |
| ๖. โรงงาน        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้เจ้าหน้าที่โรงงาน จัดเตรียมผิดชอบสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สัปดาห์ละครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมทั้งบ้านพักคนงาน อาจประสานขอคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้มีหัวหน้าติดตามผลการดำเนินงาน <b>โดยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องน้อยกว่า ๕ (CI&lt;5)</b></li> <li>- กำจัดขยะ เศษใบไม้ ภาชนะที่เม็ดได้ใช้งานและมีน้ำขัง เช่น เศษขยะพลาสติก ขยะโพม เศษกระถาง ยางรถยก คว่าจานรองกระถางทั้งหมด และจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณรอบโรงงานให้ปลอดโปร่ง</li> <li>- งดใช้โพมหรือพลาสติกบรรจุอาหาร เพื่อลดขยะที่มีน้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง โดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายในสิ่งแวดล้อม</li> <li>- ยกเลิกการใช้แหงค์น้ำก่อปูนในห้องสุขา เปลี่ยนมาใช้ถังที่สามารถล้างและคว่าไว้ไม่ให้น้ำขัง</li> </ul>   |
| ๗. สถานที่ราชการ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ในการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายของแต่ละหน่วยงาน <b>สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง</b> และให้มีหัวหน้าติดตามผลการดำเนินงาน <b>โดยค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายต้องน้อยกว่า ๕ (CI&lt;5)</b></li> <li>- ดำเนินการจัดทำ ๕.ส. ในสถานที่ทำงาน เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ความรู้ในการจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงให้พนักงานในองค์กร ได้รับความรู้</li> <li>- กำจัดขยะ เศษใบไม้ และจัดการสิ่งแวดล้อมบริเวณสถานที่ทำงานให้สะอาด</li> <li>- ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ และจัดการสิ่งแวดล้อม ภายในบ้านและรอบบ้านพักเจ้าหน้าที่</li> <li>- งดใช้โพมหรือพลาสติกบรรจุอาหาร โดยเปลี่ยนมาใช้วัสดุที่ย่อยสลายง่ายในสิ่งแวดล้อม เพื่อลดขยะที่มีน้ำขังและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ในสถานที่ทำงาน</li> <li>- งดใช้เจကัน ภาชนะใส่น้ำปลูกตันไม้ เช่น พลูด่าง แต่ถ้าใช้ ต้องเปลี่ยนน้ำทุกสัปดาห์</li> </ul> |

**คำแนะนำการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥  
ในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)**

กองโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥 กรมควบคุมโรค  
พฤษภาคม 2563

ด้วยสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในปัจจุบันที่แพร่ระบาดรวดเร็ว กระจายไปในหลายจังหวัดของประเทศไทยรวมถึงทั่วโลก ทำให้การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥 เช่น การสำรวจลูกน้ำยุ่ง滥ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอสม. และการควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥 ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการดำเนินการ เป็นไปได้ยาก

ทั้งนี้ มาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥ยังมีความจำเป็น เพื่อตัดวงจรการระบาดของโรคในชุมชน และป้องกันการระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥เป็นวงกว้าง แต่เนื่องด้วยมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เป็นสิ่งสำคัญ กองโรคติดต่อนำโดยแมลง จึงได้จัดทำคำแนะนำการการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥ในสถานการณ์ที่มีการระบาดโรค COVID – 19 ดังต่อไปนี้

|                      | การสำรวจลูกน้ำยุ่ง滥   | การควบคุมยุงตัวเต็มวัย   |
|----------------------|---|--|
| ก่อนการปฏิบัติงาน    | <p>1. ผู้ปฏิบัติงาน ควรสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ดูการปฏิบัติงานและแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที</p> <p>2. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥 ควรมีมาตรการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนลงพื้นที่ทุกครั้ง หากพบผู้ปฏิบัติงานมีไข้ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรืออาการเข้าได้กับนิยาม โรค COVID – 19 ให้ดูปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล กรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทันที</p> <p>3. หน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุ่ง滥 ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เจลล้างมือ ให้เพียงพอกับผู้ปฏิบัติงาน</p> <p>4. สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจจะต้องใช้ร่วมกัน เช่น ไฟฉาย คลิปบอร์ด เป็นต้น ให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 75% ก่อนการใช้งานเสมอ</p> <p>5. ผู้ปฏิบัติงานต้องรักษาสุขอนามัยตนเองเสมอ เช่น หมั่นล้างมือก่อนหยิบจับสิ่งของ เป็นต้น</p> <p>6. ผู้ปฏิบัติงานพ่นสารเคมีควบรวมชุดป้องกันสารเคมี หน้ากากที่สามารถรองตัวทำลายอินทรีย์ ถุงมือ และรองเท้าบูท</p> <p>หมายเหตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- สำหรับเครื่องพ่นหมอกวนหากมีการสลับเปลี่ยนผู้ใช้งาน ให้เช็คบริเวณ ระบบอกรสูบ และด้ามจับ ด้วยแอลกอฮอล์ 75% ก่อนปฏิบัติงานเสมอ</li> <li>- สำหรับเครื่องพ่น ULV สะพายหลัง ให้เช็คบริเวณด้ามจับด้วยแอลกอฮอล์ 75% ก่อนปฏิบัติงานเสมอ</li> <li>- สำหรับเครื่องพ่น ULV ติดรถยนต์ ควรมีการเช็คบริเวณ พวงมาลัย เกียร์ คอนโทรลเครื่องพ่น หรือสิ่งที่ต้องจับต้องร่วมกัน ด้วยแอลกอฮอล์ 75% ก่อนปฏิบัติงานเสมอ</li> </ul> |  |
| ระหว่างการปฏิบัติงาน | <p>1. ผู้ปฏิบัติงานสำรวจลูกน้ำยุ่ง滥 ควรเข้าไปในบ้าน ไม่เกิน 2 – 3 คนต่อหลังคาเรือน</p> <p>2. เว้นระยะห่างระหว่างผู้ลงสำรวจลูกน้ำยุ่ง滥 และเจ้าของบ้าน อย่างน้อย 1 – 1.5 เมตร หรือใช้เสียงตามสายของชุมชนในการชี้แจงการพ่นสารเคมี</p> <p>3. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ระหว่างปฏิบัติงานในชุมชน</p>   | <p>1. การเตรียมชุมชนก่อนการพ่นสารเคมี ผู้ปฏิบัติงานควรเว้นระยะห่างจากเจ้าของบ้านอย่างน้อย 1 – 1.5 เมตร หรือใช้เสียงตามสายของชุมชนในการชี้แจงการพ่นสารเคมี</p> <p>2. ผู้ปฏิบัติงานพ่นสารเคมี ควบรวมชุดป้องกันสารเคมี หน้ากากที่สามารถรองตัว</p> |

|                   | การสำรวจลูกน้ำยุ่งลาย   | การควบคุมยุงตัวเต็มวัย   |
|-------------------|---|--|
|                   | <p>4. ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>5. หากมีการต้องสนับสนุนสิ่งของระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น ยาหากันยุง ทรายที่มีฟอส เป็นต้น ให้ใช้วิธีการวาง แทนการยื่นให้ถึงมือเจ้าของบ้าน หรือสมาชิกในบ้าน</p> <p>6. การให้สุขศึกษา ควรเว้นระยะห่างกับเจ้าของบ้าน หรือสมาชิกในบ้าน อย่างน้อย 1 – 1.5 เมตร และไม่ควรเกิน 30 นาที</p> <p><b>หมายเหตุ</b><br/>หากเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในบ้านอยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน ให้ผู้ปฏิบัติงานขี้แจงความสำคัญในการสำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพัฒน์ด้วยตนเอง โดยควรเว้นระยะห่างกับเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในบ้าน อย่างน้อย 1 – 1.5 เมตร และไม่ควรเกิน 30 นาที</p> | <p>ทำลายอินทรีย์ ถุงมือ และรองเท้าบูทตลอดเวลา</p> <p>3. ผู้พ่นสารเคมีควรเว้นระยะห่างจากสมาชิกในทีม และบุคคลอื่น อย่างน้อย 1 – 1.5 เมตร</p> <p>4. ผู้ปฏิบัติงานต้องหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ระหว่างปฏิบัติงาน</p> <p>5. ในกรณีบ้านผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อนำโดยยุงลายจำเป็นต้องพ่นสารเคมี โดยให้เจ้าของบ้าน และสมาชิกในบ้าน ออกมารออยู่นอกบ้านให้อยู่ห่างกัน 1 – 1.5 เมตร ขณะผู้พ่นกำลังดำเนินการพ่นสารเคมีในบ้านและบริเวณบ้าน</p> <p><b>หมายเหตุ</b><br/>หากเจ้าของบ้านหรือสมาชิกในบ้านอยู่ระหว่างการกักตัว 14 วัน ผู้ปฏิบัติงานควรแนะนำให้เจ้าของบ้านหรือสมาชิกในบ้านใช้สเปรย์กระปองด้วยวิธีการที่ถูกต้อง กำจัดยุงลายในบ้านตนเอง</p> |
| หลังการปฏิบัติงาน | <p>1. หลังจากการปฏิบัติการลงพื้นที่ ให้ผู้ปฏิบัติงานสังเกตอาการของตนเอง หากมีไข้ มากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส หรืออาการเข้าได้กับนิยาม โรค COVID – 19 ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล กรณีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ทันที</p> <p>2. หลังใช้สิ่งของหรืออุปกรณ์ที่อาจจะต้องใช้ร่วมกันเสร็จสิ้นให้มีการทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ หรือแอลกอฮอล์ 75% เสมอ</p>  |  |

#### หมายเหตุ

- หากไม่สามารถดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุ่งลายตามแผนการดำเนินงานปกติได้ ให้บูรณาการการดำเนินการควบคู่กับการลงพื้นที่ในการเฝ้าระวังโรค COVID – 19
- ควรมีมาตรการป้องกันโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในสถานที่กักกันผู้สัมผัสโรคหรือผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ (State Quarantine) ได้แก่ การแยกหากันยุง นอนในมุ้งหรือห้องที่มีมุ้งลวด มีการพ่นสารเคมีกำจัดยุง และกำจัดแหล่งเพาะพัฒน์ยุงทุกสิ่ง