

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่า ข้อมูลระบาดวิทยา และไวรัสวิทยาในปัจจุบัน ควรวิเคราะห์และอธิบายผลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ แตกต่างไป เนื่องจากประเทศสมาชิก มีมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยเช่นกัน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์อยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ ในช่วงเวลานี้ของปีประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ยังไม่เริ่มต้น โดยมีรายงานการตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่น้อยมากประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าฤดูกาล ในประเทศแถบแคริบเบียนและอเมริกากลางมีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ประปราย สถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นในบางประเทศที่มีการรายงานในเขตร้อนของอเมริกาใต้ แอฟริกาใต้ เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ประปรายหรือไม่มีการตรวจพบในประเทศที่รายงาน สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก มีการรายงานในระดับต่ำมากโดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

องค์การอนามัยโลก สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 เพื่อสร้างรูปแบบการรายงานในระดับภูมิภาค และระดับโลก

- ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำกว่าฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้านี้
- ในโอเชียเนียมีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และตัวบ่งชี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น ๆ อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติในช่วงเวลานี้ของปี แม้ว่าการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น แต่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่น้อยมาก ซึ่งเชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่น ๆ ที่พบบ่อยที่สุด คือ rhinovirus
- ในแอฟริกาใต้ ไม่มียารายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และโรคปอดบวมจากการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ แต่ตรวจพบกลุ่มผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจโรค COVID-19 ในช่วงระยะเวลาของการรายงานนี้
- ในเขตอบอุ่นของอเมริกาใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพียงเล็กน้อย ในประเทศอาร์เจนตินา ส่วนในประเทศชิลี พบผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับเวลาที่พบโรค COVID-19 เพิ่มขึ้น

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียนและอเมริกาใต้**ในประเทศแคริบเบียนและอเมริกากลางมีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศนิการากัว ประเทศจาเมกามีรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI เพิ่มขึ้นและรักษาในโรงพยาบาล SARI ในประเทศคอสตาริกาพบผู้ติดเชื้อ SARI เพิ่มขึ้นและยังคงอยู่ในระดับที่สูงกว่าเกณฑ์การระบาด ส่วนผู้ป่วย ILI ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในประเทศฮอนดูรัสสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง สู่ระดับเกณฑ์การระบาด และมีรายงานการตรวจพบเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นในหลายประเทศในอนุภูมิภาค
- ในประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ SARI ลดลงอย่างต่อเนื่อง ในประเทศบราซิล และในขณะที่ประเทศโคลอมเบีย มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI เพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- **ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา**มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ B เพิ่มขึ้น ในประเทศโกตดิวัวร์ จากการทดสอบเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ในประเทศบูร์กินาฟาโซ และประเทศมาลีไม่พบโรคไข้หวัดใหญ่ ในตะวันออกกลางมีรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง ในแอฟริกาตะวันออกประเทศมาดากัสการ์มีรายงานการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ แม้ว่าจะไม่มีรายงานการตรวจพบก็ตาม
- **ประเทศเอเชียเขตร้อน**ในเอเชียใต้มีรายงานสถานการณ์ผู้ป่วย ILI และ SARI อยู่ในระดับต่ำและไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่มีการรายงาน
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีรายงานการตรวจพบไข้หวัดใหญ่ประปราย ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** ในภาพรวม พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล ตัวบ่งชี้สถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รวมถึงร้อยละของผลบวกของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำ ในประเทศสหรัฐอเมริกา สถานการณ์พบผู้ป่วย ILI ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นในเด็กช่วงอายุ 0-4 ปี ที่พบว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละของการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่หรือโรค COVID-19 สูงกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรค เนื่องจากการรายงานการเสียชีวิตจากโรค COVID-19 ล่าช้า หรือไม่สมบูรณ์
- ในยุโรปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล การคาดการณ์อัตราการตายแบบรวมจากเครือข่าย EuroMOMO กลับสู่ระดับปกติที่คาดไว้
- ในเอเชียกลาง และในแอฟริกาเหนือ ไม่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ที่เป็นปัจจุบัน
- ในเอเชียตะวันตกไม่มีการรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และพบผู้ป่วย ILI อยู่ในระดับต่ำทุกประเทศที่รายงาน
- ในเอเชียตะวันออกตัวชี้วัดอาการป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่และสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับตามฤดูกาลในทุกประเทศ


ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_08_31_surveillance_update_375.pdf?ua=1

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 9 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 108,946 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 164.32 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 699.43 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 553.28 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 338.82 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กจึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	43,150	0	257.51	0.00	0.00
เหนือ	28,382	0	228.22	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	30,880	2	140.35	0.01	0.01
ใต้	6,534	1	69.31	0.01	0.02

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 257.51 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 228.22 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 140.35 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 69.31 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนรวมทั้งหมด 3 ราย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย และภาคใต้ 1 ราย

❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พะเยา	2,206	463.29
2	เชียงใหม่	7,049	401.59
3	หนองคาย	1,926	368.97
4	ระยอง	2,513	350.35
5	กรุงเทพมหานคร	19,369	341.03


ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา อัตราป่วย 463.29 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 401.59 ต่อประชากรแสนคน หนองคาย อัตราป่วย 368.97 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 350.35 ต่อประชากรแสนคน และกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 341.03 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 341.03 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 303.61 ต่อประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพที่ 6 อัตราป่วย 179.40 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2563)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	108946	3	66301242	164.32	0.00	0.00
ภาคเหนือ	28382	0	12436028	228.22	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่/เครือข่ายบริการที่ 1	23107	0	5878537	303.61	0.00	0.00
เชียงใหม่	12289	0	1755291	401.59	0.00	0.00
เชียงราย	3031	0	1289873	292.04	0.00	0.00
ลำปาง	2415	0	744714	261.98	0.00	0.00
ลำพูน	1675	0	405936	204.47	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	448	0	280826	129.97	0.00	0.00
น่าน	1047	0	479414	171.67	0.00	0.00
พะเยา	1561	0	476157	463.29	0.00	0.00
แพร่	641	0	446326	192.01	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/เครือข่ายบริการที่ 2	6612	0	3565071	172.84	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	1105	0	994936	148.05	0.00	0.00
พิษณุโลก	2693	0	866129	280.10	0.00	0.00
สุโขทัย	1032	0	598287	131.21	0.00	0.00
ตาก	590	0	649472	102.39	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1192	0	456247	178.19	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/เครือข่ายบริการที่ 3	7212	0	2992420	146.10	0.00	0.00
ชัยนาท	126	0	328993	42.55	0.00	0.00
กำแพงเพชร	2259	0	728470	123.96	0.00	0.00
นครสวรรค์	3742	0	1064649	222.61	0.00	0.00
พิจิตร	707	0	540620	128.00	0.00	0.00
อุทัยธานี	378	0	329688	80.99	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	43150	0	16756435	257.51	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	4202	0	5343264	78.64	0.00	0.00
อ่างทอง	393	0	281014	139.85	0.00	0.00
ลพบุรี	606	0	758003	79.95	0.00	0.00
นครนายก	192	0	259718	73.93	0.00	0.00
นนทบุรี	695	0	1238015	56.14	0.00	0.00
อยุธยา	955	0	815647	117.08	0.00	0.00
ปทุมธานี	663	0	1137603	58.28	0.00	0.00
สระบุรี	571	0	643531	88.73	0.00	0.00
สิงห์บุรี	127	0	209733	60.55	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	8656	0	5324608	162.57	0.00	0.00
กาญจนบุรี	1526	0	890565	171.35	0.00	0.00
นครปฐม	2281	0	914273	249.49	0.00	0.00
เพชรบุรี	497	0	483335	102.83	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	725	0	546396	132.69	0.00	0.00
ราชบุรี	1094	0	872615	125.37	0.00	0.00
สมุทรสาคร	873	0	573215	152.30	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	240	0	193847	123.81	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	1420	0	850362	166.99	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	10923	0	6088563	179.40	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	1714	0	712449	240.58	0.00	0.00
จันทบุรี	984	0	535478	183.76	0.00	0.00
ชลบุรี	2311	0	1522285	151.81	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	696	0	489592	142.16	0.00	0.00
ระยอง	2513	0	717276	350.35	0.00	0.00
สระแก้ว	218	0	563014	38.72	0.00	0.00
สมุทรปราการ	2332	0	1318687	176.84	0.00	0.00
ตราด	155	0	229782	67.46	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	30880	2	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	6264	0	5062199	123.74	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	518	0	985676	52.55	0.00	0.00
ขอนแก่น	3808	0	1805903	210.86	0.00	0.00
มหาสารคาม	983	0	963060	102.07	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	955	0	1307560	73.04	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	6159	0	5553738	110.90	0.00	0.00
บึงกาฬ	484	0	423485	114.29	0.00	0.00
เลย	893	0	642220	139.05	0.00	0.00
นครพนม	970	0	718406	135.02	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	651	0	511878	127.18	0.00	0.00
หนองคาย	1926	0	521995	368.97	0.00	0.00
สกลนคร	439	0	1150876	38.14	0.00	0.00
อุดรธานี	796	0	1584878	50.22	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	11903	2	6772779	175.75	0.03	0.02
บุรีรัมย์	2520	0	1593378	158.15	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1850	0	1139067	162.41	0.00	0.00
นครราชสีมา	6611	2	2642815	250.15	0.08	0.03
สุรินทร์	922	0	1397519	65.97	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/ เครือข่ายบริการที่ 10	6554	0	4613643	142.06	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	291	0	378363	76.91	0.00	0.00
มุกดาหาร	740	0	351532	210.51	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	785	0	1472521	53.31	0.00	0.00
อุบลราชธานี	4099	0	1872091	218.95	0.00	0.00
ยโสธร	639	0	539136	118.52	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	6534	1	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/ เครือข่ายบริการที่ 11	4384	1	4466673	98.15	0.02	0.02
ชุมพร	652	0	510307	127.77	0.00	0.00
กระบี่	402	0	471754	85.21	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	1375	0	1558958	88.20	0.00	0.00
พังงา	353	0	267866	131.78	0.00	0.00
ภูเก็ต	455	0	406113	112.04	0.00	0.00
ระนอง	61	0	191134	31.91	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	1086	1	1060541	102.40	0.09	0.09
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	2150	0	4960215	43.34	0.00	0.00
นราธิวาส	712	0	799357	89.07	0.00	0.00
ปัตตานี	77	0	713937	10.79	0.00	0.00
พัทลุง	427	0	524951	81.34	0.00	0.00
สตูล	65	0	320637	20.27	0.00	0.00
สงขลา	505	0	1428429	35.35	0.00	0.00
ตรัง	216	0	643093	33.59	0.00	0.00
ยะลา	148	0	529811	27.93	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	19369	0	5679532	341.03	0.00	0.00


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 9 กันยายน 2563 พบจำนวน 27 เหตุการณ์ ใน 20 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 9 เหตุการณ์ เรือนจำ 9 เหตุการณ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เหตุการณ์ และค่ายบำบัดยาเสพติด 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็น สถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิง ในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปรายสัปดาห์