

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่า ข้อมูลระบาดวิทยา และไวรัสวิทยาในปัจจุบัน ควรวิเคราะห์และอธิบายผลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ แตกต่างไป เนื่องจากประเทศสมาชิก มีมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยเช่นกัน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 โดยภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์อยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ ในช่วงเวลานี้ของปี ประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ยังไม่เริ่มต้น แม้ว่าจะมีการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง หรือเพิ่มขึ้นในบางประเทศทางซีกโลกใต้ แต่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่น้อยมาก ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำกว่าฤดูกาล ในประเทศแถบแคริบเบียนและอเมริกากลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ซึ่งอาจเกิดจากโรค COVID-19 ลดลงในบางประเทศที่มีการรายงาน ในเขตร้อนของอเมริกาใต้ แอฟริกา เขตร้อน และเอเชียใต้ มีรายงานการตรวจพบไวรัสไข้หวัดใหญ่ประปราย หรือไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศที่มีการรายงาน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2) ในประเทศกัมพูชา สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก มีการรายงานในระดับต่ำมาก โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A องค์การอนามัยโลก แนะนำให้มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

องค์การอนามัยโลก สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 เพื่อสร้างรูปแบบการรายงานในระดับภูมิภาค และระดับโลก

- **ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้** สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ มีการรายงานในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้านี้
- **ในโอเชียเนีย** มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และตัวบ่งชี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น ๆ อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติในช่วงเวลานี้ของปี แม้ว่าการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น แต่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่น้อยมาก
- **ในแอฟริกาใต้** ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และโรคปอดบวมจากการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ แต่ตรวจพบโรคระบบทางเดินหายใจ และโรค COVID-19 ในกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยโรคปอดบวม ในช่วงระยะเวลาของการรายงาน
- **ในเขตอบอุ่นของอเมริกาใต้** มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B เล็กน้อย ในประเทศอาร์เจนตินา ประเทศชิลี พบผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลงอย่างต่อเนื่อง และต่ำกว่าเกณฑ์การระบาด ซึ่งสัมพันธ์กับการพบโรค COVID-19 ลดลง

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียนและอเมริกาใต้** ในประเทศแคริบเบียนและอเมริกากลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศเฮติ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI เพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์การระบาด ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศจาเมกา พบอัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์การระบาด ประเทศคอสตาริกา พบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง และอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ป่วย ILI ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศฮอนดูรัส สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง สู่ระดับเกณฑ์การระบาด ยังคงมีรายงานการตรวจพบเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในหลายประเทศ ในภูมิภาคย่อย
- ในประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในขณะที่ ประเทศโคลอมเบีย มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI สูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- **ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา** มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B ในประเทศโกตดิวัวร์ จากการทดสอบเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศเคนยา ประเทศไนเจอร์ และประเทศแซมเบีย ไม่พบโรคไข้หวัดใหญ่ เขตแอฟริกากลาง มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
- **ประเทศเอเชียเขตร้อน** ในเอเชียใต้ มีรายงานสถานการณ์ผู้ป่วย ILI และ SARI อยู่ในระดับต่ำ และไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่มีการรายงาน
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่รายงาน ยกเว้นในประเทศกัมพูชา มีการรายงานตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2) เพิ่มขึ้น ในช่วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ผู้ป่วย ILI และ SARI อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน
- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** ในภาพรวม พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล ประเทศในอเมริกาเหนือ พบตัวบ่งชี้สถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงร้อยละของผลบวกของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับมาตรฐาน ผู้ป่วย ILI ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นในเด็กช่วงอายุ 0-4 ปี ที่พบว่า อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของการเสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรค COVID-19 สูงกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรคปอดบวม และอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ประมาณการณจากข้อมูลในอดีต ซึ่งมีความสอดคล้องกับโรค COVID-19
- ในยุโรปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล การคาดการณ์อัตราการตายแบบรวมจากเครือข่าย EuroMOMO กลับสู่ระดับปกติที่คาดไว้
- ในเอเชียกลาง และในแอฟริกาเหนือ ไม่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ที่เป็นปัจจุบัน
- ในเอเชียตะวันตก ไม่มีการรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และพบผู้ป่วย ILI อยู่ในระดับต่ำ ทุกประเทศที่มีการรายงาน
- ในเอเชียตะวันออก ตัวชี้วัดอาการป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับตามฤดูกาล ในทุกประเทศ


ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_09_14_surveillance_update_376.pdf

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 109,401 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 165.01 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 703.41 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 554.44 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 339.70 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กจึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราราย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	43,421	0	259.13	0.00	0.00
เหนือ	28,372	0	228.14	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31,030	2	141.03	0.01	0.01
ใต้	6,578	1	69.78	0.01	0.02

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 259.13 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 228.14 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 141.03 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 69.78 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนรวมทั้งหมด 3 ราย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย และภาคใต้ 1 ราย


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พะเยา	2,207	463.50
2	เชียงใหม่	6,932	394.92
3	หนองคาย	1,935	370.69
4	ระยอง	2,518	351.05
5	กรุงเทพมหานคร	19,393	341.45

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา อัตราป่วย 463.50 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 394.92 ต่อประชากรแสนคน หนองคาย อัตราป่วย 370.69 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 351.05 ต่อประชากรแสนคน และกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 341.45 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 341.45 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 302.06 ต่อประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพที่ 6 อัตราป่วย 182.47 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2563)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	109401	3	66301242	165.01	0.00	0.00
ภาคเหนือ	28372	0	12436028	228.14	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่/เครือข่ายบริการที่ 1	23107	0	5878537	302.06	0.00	0.00
เชียงใหม่	12289	0	1755291	394.92	0.00	0.00
เชียงราย	3031	0	1289873	292.66	0.00	0.00
ลำปาง	2415	0	744714	263.59	0.00	0.00
ลำพูน	1675	0	405936	204.71	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	448	0	280826	130.33	0.00	0.00
น่าน	1047	0	479414	171.88	0.00	0.00
พะเยา	1561	0	476157	463.50	0.00	0.00
แพร่	641	0	446326	192.46	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/เครือข่ายบริการที่ 2	6612	0	3565071	174.47	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	1105	0	994936	148.45	0.00	0.00
พิษณุโลก	2693	0	866129	283.33	0.00	0.00
สุโขทัย	1032	0	598287	131.88	0.00	0.00
ตาก	590	0	649472	104.24	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1192	0	456247	180.38	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/เครือข่ายบริการที่ 3	7212	0	2992420	146.87	0.00	0.00
ชัยนาท	126	0	328993	43.16	0.00	0.00
กำแพงเพชร	2259	0	728470	124.23	0.00	0.00
นครสวรรค์	3742	0	1064649	223.64	0.00	0.00
พิจิตร	707	0	540620	129.30	0.00	0.00
อุทัยธานี	378	0	329688	81.29	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	43421	0	16756435	259.13	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	4251	0	5343264	79.56	0.00	0.00
อ่างทอง	399	0	281014	141.99	0.00	0.00
ลพบุรี	615	0	758003	81.13	0.00	0.00
นครนายก	192	0	259718	73.93	0.00	0.00
นนทบุรี	695	0	1238015	56.14	0.00	0.00
อยุธยา	961	0	815647	117.82	0.00	0.00
ปทุมธานี	664	0	1137603	58.37	0.00	0.00
สระบุรี	592	0	643531	91.99	0.00	0.00
สิงห์บุรี	133	0	209733	63.41	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	8667	0	5324608	162.77	0.00	0.00
กาญจนบุรี	1533	0	890565	172.14	0.00	0.00
นครปฐม	2284	0	914273	249.82	0.00	0.00
เพชรบุรี	496	0	483335	102.62	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	726	0	546396	132.87	0.00	0.00
ราชบุรี	1094	0	872615	125.37	0.00	0.00
สมุทรสาคร	871	0	573215	151.95	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	243	0	193847	125.36	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	1420	0	850362	166.99	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	11110	0	6088563	182.47	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	1726	0	712449	242.26	0.00	0.00
จันทบุรี	989	0	535478	184.69	0.00	0.00
ชลบุรี	2323	0	1522285	152.60	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	820	0	489592	167.49	0.00	0.00
ระยอง	2518	0	717276	351.05	0.00	0.00
สระแก้ว	222	0	563014	39.43	0.00	0.00
สมุทรปราการ	2356	0	1318687	178.66	0.00	0.00
ตราด	156	0	229782	67.89	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31030	2	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	6315	0	5062199	124.75	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	522	0	985676	52.96	0.00	0.00
ขอนแก่น	3841	0	1805903	212.69	0.00	0.00
มหาสารคาม	991	0	963060	102.90	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	961	0	1307560	73.50	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	6174	0	5553738	111.17	0.00	0.00
บึงกาฬ	486	0	423485	114.76	0.00	0.00
เลย	896	0	642220	139.52	0.00	0.00
นครพนม	967	0	718406	134.60	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	652	0	511878	127.37	0.00	0.00
หนองคาย	1935	0	521995	370.69	0.00	0.00
สกลนคร	437	0	1150876	37.97	0.00	0.00
อุดรธานี	801	0	1584878	50.54	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	11931	2	6772779	176.16	0.03	0.02
บุรีรัมย์	2528	0	1593378	158.66	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1858	0	1139067	163.12	0.00	0.00
นครราชสีมา	6611	2	2642815	250.15	0.08	0.03
สุรินทร์	934	0	1397519	66.83	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/ เครือข่ายบริการที่ 10	6610	0	4613643	143.27	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	286	0	378363	75.59	0.00	0.00
มุกดาหาร	744	0	351532	211.65	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	801	0	1472521	54.40	0.00	0.00
อุบลราชธานี	4141	0	1872091	221.20	0.00	0.00
ยโสธร	638	0	539136	118.34	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	6578	1	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/ เครือข่ายบริการที่ 11	4404	1	4466673	98.60	0.02	0.02
ชุมพร	656	0	510307	128.55	0.00	0.00
กระบี่	409	0	471754	86.70	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	1376	0	1558958	88.26	0.00	0.00
พังงา	353	0	267866	131.78	0.00	0.00
ภูเก็ต	457	0	406113	112.53	0.00	0.00
ระนอง	64	0	191134	33.48	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	1089	1	1060541	102.68	0.09	0.09
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	2174	0	4960215	43.83	0.00	0.00
นราธิวาส	722	0	799357	90.32	0.00	0.00
ปัตตานี	79	0	713937	11.07	0.00	0.00
พัทลุง	429	0	524951	81.72	0.00	0.00
สตูล	71	0	320637	22.14	0.00	0.00
สงขลา	506	0	1428429	35.42	0.00	0.00
ตรัง	219	0	643093	34.05	0.00	0.00
ยะลา	148	0	529811	27.93	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	19393	0	5679532	341.45	0.00	0.00


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 กันยายน 2563 พบจำนวน 27 เหตุการณ์ ใน 20 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 9 เหตุการณ์ เรือนจำ 9 เหตุการณ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เหตุการณ์ และค่ายบำบัดยาเสพติด 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปรายการประจำปี