

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่า ข้อมูลระบาดวิทยา และไวรัสวิทยาในปัจจุบัน ควรวิเคราะห์และอธิบายผลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ แตกต่างไป เนื่องจากประเทศสมาชิก มีมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยเช่นกัน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 14 กันยายน 2563 โดยภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์อยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ ในช่วงเวลานี้ของปี ประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ยังไม่เริ่มต้น แม้ว่าจะมีการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง หรือเพิ่มขึ้นในบางประเทศทางซีกโลกใต้ แต่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่น้อยมาก ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำกว่าฤดูกาล ในประเทศแถบแคริบเบียนและอเมริกากลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ สถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ซึ่งอาจเกิดจากโรค COVID-19 ลดลงในบางประเทศที่มีการรายงาน ในเขตร้อนของอเมริกาใต้ แอฟริกาเขตร้อน และเอเชียใต้ มีรายงานการตรวจพบไวรัสไข้หวัดใหญ่ประปราย หรือไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศที่มีการรายงาน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2) ในประเทศกัมพูชา สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก มีการรายงานในระดับต่ำมาก โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A องค์การอนามัยโลก แนะนำให้มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

องค์การอนามัยโลก สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 เพื่อสร้างรูปแบบการรายงานในระดับภูมิภาค และระดับโลก


- **ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้** สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ มีการรายงานในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้านี้
- ในโอเชียเนีย มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และตัวบ่งชี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น ๆ อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติในช่วงเวลานี้ของปี แม้ว่าการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น แต่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่น้อยมาก
- ในแอฟริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และโรคปอดบวมจากการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ แต่ตรวจพบโรคระบบทางเดินหายใจ และโรค COVID-19 ในกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยโรคปอดบวม ในช่วงระยะเวลาของการรายงาน
- ในเขตอบอุ่นของอเมริกาใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B เล็กน้อย ในประเทศอาร์เจนตินา ประเทศชิลี พบผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลงอย่างต่อเนื่อง และต่ำกว่าเกณฑ์การระบาด ซึ่งสัมพันธ์กับการพบโรค COVID-19 ลดลง

- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียนและอเมริกาใต้** ในประเทศแคริบเบียนและอเมริกากลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศเฮติ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI เพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์การระบาด ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศจาเมกา พบอัตราการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์การระบาด ประเทศคอสตาริกา พบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง และอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนผู้ป่วย ILI ลดลงอย่างต่อเนื่อง ประเทศฮอนดูรัส สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง สู่ระดับเกณฑ์การระบาด ยังคงมีรายงานการตรวจพบเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะลดลงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ในหลายประเทศ ในภูมิภาคย่อย
- ในประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในขณะที่ ประเทศโคลอมเบีย มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI สูงกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- **ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา** มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B ในประเทศโกตดิวัวร์ จากการทดสอบเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศเคนยา ประเทศไนเจอร์ และประเทศแซมเบีย ไม่พบโรคไข้หวัดใหญ่ เขตแอฟริกากลาง มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง ในสาธารณรัฐแอฟริกากลาง
- **ประเทศเอเชียเขตร้อน** ในเอเชียใต้ มีรายงานสถานการณ์ผู้ป่วย ILI และ SARI อยู่ในระดับต่ำ และไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่มีการรายงาน
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ไม่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่รายงาน ยกเว้นในประเทศกัมพูชา มีการรายงานตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A (H3N2) เพิ่มขึ้น ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ผู้ป่วย ILI และ SARI อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน
- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** ในภาพรวม พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล ประเทศในอเมริกาเหนือ พบตัวบ่งชี้สถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงร้อยละของผลบวกของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับที่ต่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับมาตรฐาน ผู้ป่วย ILI ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นในเด็กช่วงอายุ 0-4 ปี ที่พบว่า อยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของการเสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรค COVID-19 สูงกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรคปอดบวม และอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ประมาณการณ์จากข้อมูลในอดีต ซึ่งมีความสอดคล้องกับโรค COVID-19
- ในยุโรปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล การคาดการณ์อัตราการตายแบบรวมจากเครือข่าย EuroMOMO กลับสู่ระดับปกติที่คาดไว้
- ในเอเชียกลาง และในแอฟริกาเหนือ ไม่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ที่เป็นปัจจุบัน
- ในเอเชียตะวันตก ไม่มีการรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และพบผู้ป่วย ILI อยู่ในระดับต่ำ ทุกประเทศที่มีการรายงาน
- ในเอเชียตะวันออก ตัวชี้วัดอาการป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับตามฤดูกาล ในทุกประเทศ

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_09_14_surveillance_update_376.pdf


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 22 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 110,182 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 166.18 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 710.29 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 556.69 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 341.76 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กจึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	43,711	0	260.86	0.00	0.00
เหนือ	28,503	0	229.20	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31,351	2	142.49	0.01	0.01
ใต้	6,617	1	70.19	0.01	0.02

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 260.86 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 229.20 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 142.49 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 70.19 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนรวมทั้งหมด 3 ราย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย และภาคใต้ 1 ราย

❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พะเยา	2,207	463.50
2	เชียงใหม่	6,935	395.09
3	หนองคาย	1,942	372.03
4	ระยอง	2,523	351.75
5	กรุงเทพมหานคร	19,412	341.79


ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา อัตราป่วย 463.50 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 395.09 ต่อประชากรแสนคน หนองคาย อัตราป่วย 372.03 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 351.75 ต่อประชากรแสนคน และกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 341.79 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 341.79 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 302.73 ต่อประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพที่ 6 อัตราป่วย 185.18 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2563)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	110182	3	66301242	166.18	0.00	0.00
ภาคเหนือ	28503	0	12436028	229.20	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่/เครือข่ายบริการที่ 1	23107	0	5878537	302.73	0.00	0.00
เชียงใหม่	12289	0	1755291	395.09	0.00	0.00
เชียงราย	3031	0	1289873	293.67	0.00	0.00
ลำปาง	2415	0	744714	263.59	0.00	0.00
ลำพูน	1675	0	405936	204.96	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	448	0	280826	132.82	0.00	0.00
น่าน	1047	0	479414	174.59	0.00	0.00
พะเยา	1561	0	476157	463.50	0.00	0.00
แพร่	641	0	446326	192.91	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/เครือข่ายบริการที่ 2	6612	0	3565071	175.14	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	1105	0	994936	149.16	0.00	0.00
พิษณุโลก	2693	0	866129	286.56	0.00	0.00
สุโขทัย	1032	0	598287	128.70	0.00	0.00
ตาก	590	0	649472	104.39	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1192	0	456247	181.92	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/เครือข่ายบริการที่ 3	7212	0	2992420	149.14	0.00	0.00
ชัยนาท	126	0	328993	43.77	0.00	0.00
กำแพงเพชร	2259	0	728470	130.00	0.00	0.00
นครสวรรค์	3742	0	1064649	225.33	0.00	0.00
พิจิตร	707	0	540620	130.22	0.00	0.00
อุทัยธานี	378	0	329688	81.59	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	43711	0	16756435	260.86	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	4293	0	5343264	80.34	0.00	0.00
อ่างทอง	404	0	281014	143.77	0.00	0.00
ลพบุรี	616	0	758003	81.27	0.00	0.00
นครนายก	193	0	259718	74.31	0.00	0.00
นนทบุรี	704	0	1238015	56.87	0.00	0.00
อยุธยา	978	0	815647	119.90	0.00	0.00
ปทุมธานี	664	0	1137603	58.37	0.00	0.00
สระบุรี	601	0	643531	93.39	0.00	0.00
สิงห์บุรี	133	0	209733	63.41	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	8731	0	5324608	163.97	0.00	0.00
กาญจนบุรี	1533	0	890565	172.14	0.00	0.00
นครปฐม	2297	0	914273	251.24	0.00	0.00
เพชรบุรี	499	0	483335	103.24	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	730	0	546396	133.60	0.00	0.00
ราชบุรี	1094	0	872615	125.37	0.00	0.00
สมุทรสาคร	895	0	573215	156.14	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	243	0	193847	125.36	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	1440	0	850362	169.34	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	11275	0	6088563	185.18	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	1739	0	712449	244.09	0.00	0.00
จันทบุรี	992	0	535478	185.26	0.00	0.00
ชลบุรี	2344	0	1522285	153.98	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	832	0	489592	169.94	0.00	0.00
ระยอง	2523	0	717276	351.75	0.00	0.00
สระแก้ว	224	0	563014	39.79	0.00	0.00
สมุทรปราการ	2461	0	1318687	186.63	0.00	0.00
ตราด	160	0	229782	69.63	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31351	2	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	6388	0	5062199	126.19	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	519	0	985676	52.65	0.00	0.00
ขอนแก่น	3880	0	1805903	214.85	0.00	0.00
มหาสารคาม	1017	0	963060	105.60	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	972	0	1307560	74.34	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	6156	0	5553738	110.84	0.00	0.00
บึงกาฬ	475	0	423485	112.16	0.00	0.00
เลย	898	0	642220	139.83	0.00	0.00
นครพนม	972	0	718406	135.30	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	653	0	511878	127.57	0.00	0.00
หนองคาย	1942	0	521995	372.03	0.00	0.00
สกลนคร	438	0	1150876	38.06	0.00	0.00
อุดรธานี	778	0	1584878	49.09	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	12052	2	6772779	177.95	0.03	0.02
บุรีรัมย์	2561	0	1593378	160.73	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1863	0	1139067	163.55	0.00	0.00
นครราชสีมา	6690	2	2642815	253.14	0.08	0.03
สุรินทร์	938	0	1397519	67.12	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/ เครือข่ายบริการที่ 10	6755	0	4613643	146.41	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	309	0	378363	81.67	0.00	0.00
มุกดาหาร	747	0	351532	212.50	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	805	0	1472521	54.67	0.00	0.00
อุบลราชธานี	4229	0	1872091	225.90	0.00	0.00
ยโสธร	665	0	539136	123.35	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	6617	1	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/ เครือข่ายบริการที่ 11	4419	1	4466673	98.93	0.02	0.02
ชุมพร	656	0	510307	128.55	0.00	0.00
กระบี่	413	0	471754	87.55	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	1376	0	1558958	88.26	0.00	0.00
พังงา	359	0	267866	134.02	0.00	0.00
ภูเก็ต	457	0	406113	112.53	0.00	0.00
ระนอง	65	0	191134	34.01	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	1093	1	1060541	103.06	0.09	0.09
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	2198	0	4960215	44.31	0.00	0.00
นราธิวาส	735	0	799357	91.95	0.00	0.00
ปัตตานี	80	0	713937	11.21	0.00	0.00
พัทลุง	431	0	524951	82.10	0.00	0.00
สตูล	73	0	320637	22.77	0.00	0.00
สงขลา	508	0	1428429	35.56	0.00	0.00
ตรัง	220	0	643093	34.21	0.00	0.00
ยะลา	151	0	529811	28.50	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	19412	0	5679532	341.79	0.00	0.00


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 22 กันยายน 2563 พบจำนวน 27 เหตุการณ์ ใน 20 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 9 เหตุการณ์ เรือนจำ 9 เหตุการณ์ กองร้อยอาสาสมัครติดแดน 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เหตุการณ์ และค่ายบำบัดยาเสพติด 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิง
ในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปรายการประจำปี