

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่า ข้อมูลระบาดวิทยา และไวรัสวิทยาในปัจจุบัน ควรวิเคราะห์และอธิบายผลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ แตกต่างไป เนื่องจากประเทศสมาชิก มีมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยเช่นกัน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 28 กันยายน 2563 โดยภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์อยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ ในช่วงเวลานี้ของปี ประเทศเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ยังไม่เริ่มต้น แม้ว่าจะมีการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง หรือเพิ่มขึ้นในบางประเทศทางซีกโลกใต้ แต่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่น้อยมาก ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำกว่าฤดูกาลในประเทศแถบแคริบเบียนและอเมริกากลาง มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ประปราย สถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ซึ่งอาจเกิดจากโรค COVID-19 อยู่ในระดับสูงในบางประเทศที่มีการรายงาน ในเขตร้อนของอเมริกาใต้ แอฟริกาเขตร้อน และเอเชียใต้ มีรายงานการตรวจพบไวรัสไข้หวัดใหญ่ประปราย หรือไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่มีการรายงาน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ประปราย ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและประเทศไทย สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก มีการรายงานในระดับต่ำมาก โดยส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อ และฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

องค์การอนามัยโลก สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่ และ COVID-19 เพื่อสร้างรูปแบบการรายงานในระดับภูมิภาค และระดับโลก

- **ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้** สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ มีการรายงานในระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับฤดูกาลก่อนหน้านี้
- ในโอเชียเนีย มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และตัวบ่งชี้สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่น ๆ อยู่ในระดับต่ำกว่าปกติในช่วงเวลานี้ของปี แม้ว่าการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น แต่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่น้อยมาก และมีรายงานพบผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) เพิ่มขึ้นในบางแห่งของหมู่เกาะแปซิฟิก แม้ว่าจะยังไม่มีที่ยืนยันสาเหตุของการเกิดโรค
- ในแอฟริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มตัวอย่างของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และโรคปอดบวมจากการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ แต่มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นตั้งแต่สัปดาห์ที่ 29

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

- ในเขตบ่อนของอเมริกาใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เล็กน้อย ส่วนใหญ่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B ที่มีรายงานในประเทศอาร์เจนตินา ประเทศปารากวัย พบผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้น ส่วนในประเทศชิลี พบผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัมพันธ์กับการพบโรค COVID-19 ลดลง
- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียนและอเมริกาใต้** ในประเทศแคริบเบียนและอเมริกากลาง ไม่พบเชื้อไข้หวัดใหญ่ จนถึงพบประปราย ในประเทศที่มีการรายงาน ประเทศเฮติ มีรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI เพิ่มขึ้นสูงกว่าเกณฑ์การระบาด ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศจาเมกา พบอัตราการรักษาในโรงพยาบาล จากการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในระดับปานกลาง ประเทศคอสตาริกา พบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่ยังคงอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์การระบาด และพบผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้น ประเทศฮอนดูรัส สถานการณ์ผู้ติดเชื้อ SARI ลดลงสู่ระดับเกณฑ์การระบาด ยังคงมีรายงานการตรวจพบเชื้อ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง ในระดับที่สูงขึ้น ในหลายประเทศ ในภูมิภาคย่อย
- ในประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ประเทศโคลอมเบีย มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลงถึงเกณฑ์ตามฤดูกาล ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการลดลงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19
- **ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา** แอฟริกาตะวันตก ประเทศโกตดิวัวร์ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เล็กน้อย มีรายงานการพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด B เป็นส่วนใหญ่ จากการทดสอบเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ในประเทศบูร์กินาฟาโซ ประเทศมาลี ประเทศไนเจอร์ และประเทศโตโก ไม่พบโรคไข้หวัดใหญ่ เขตแอฟริกากลาง สาธารณรัฐแอฟริกากลาง มีการรายงานพบผู้ติดเชื้อ SARI ลดลง หลังจากเข้าสู่จุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม แอฟริกาตะวันออก อัตราการรายงานอยู่ในระดับต่ำ ในประเทศเคนยา มีการรายงานแนวโน้มผู้ติดเชื้อ SARI เพิ่มขึ้น โดยมีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B 2 ครั้ง ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- **ประเทศเอเชียเขตร้อน** ในเอเชียใต้ มีรายงานสถานการณ์ผู้ป่วย ILI และ SARI อยู่ในระดับต่ำ และไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่มีการรายงาน พบสัดส่วนการรับคำปรึกษาของผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้น ในประเทศอัฟกานิสถาน
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ประปราย ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา สถานการณ์ผู้ป่วย ILI และ SARI อยู่ในระดับต่ำ ในประเทศที่มีการรายงาน
- **ประเทศในเขตบ่อนซีกโลกเหนือ** ในภาพรวม พบว่าสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล ประเทศในอเมริกาเหนือ พบตัวบ่งชี้สถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงร้อยละของผลบวกของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ ประเทศสหรัฐอเมริกา สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับมาตรฐาน ผู้ป่วย ILI อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นในเด็กช่วงอายุ 0-4 ปี ที่มีการรายงาน พบอยู่ในระดับสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของการเสียชีวิตเนื่องจาก


โรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรค COVID-19 สูงกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรคปอดบวม และอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ประมาณการณจากข้อมูลในอดีต ซึ่งมีความสอดคล้องกับโรค COVID-19

- ในยุโรปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับฤดูกาล ในประเทศเบลเยียมและประเทศไอร์แลนด์ สถานการณ์ของผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้น และแพร่ระบาดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่เพิ่มขึ้น การคาดการณ์อัตราการตายแบบรวมจากเครือข่าย EuroMOMO กลับสู่ระดับปกติที่คาดไว้
- ในเอเชียกลาง และในแอฟริกาเหนือ ไม่มีการรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ที่เป็นปัจจุบัน
- ในเอเชียตะวันตก ไม่มีการรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ และพบผู้ป่วย ILI อยู่ในระดับต่ำ ทุกประเทศที่มีการรายงาน ประเทศโอมานและประเทศสหรัฐอเมริกาหรับเอมิเรตส์ ไม่มีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่
- ในเอเชียตะวันออก ตัวชี้วัดอาการป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับตามฤดูกาล ในประเทศส่วนใหญ่ ที่มีการรายงาน สถานการณ์ของผู้ป่วย ILI เพิ่มขึ้น ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการรายงานว่า อยู่ในระดับที่สูงกว่าปีที่ผ่านมา

ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2020_09_28_surveillance_update_377.pdf


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2563 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 29 กันยายน 2563 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 110,930 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 167.31 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 3 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 716.85 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 559.25 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 343.18 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็กจึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
กลาง	43,893	0	261.95	0.00	0.00
เหนือ	28,663	0	230.48	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	31,676	2	143.97	0.01	0.01
ใต้	6,698	1	71.05	0.01	0.01

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 261.95 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 230.48 ต่อประชากรแสนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 143.97 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคใต้ อัตราป่วย 71.05 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ นอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวนรวมทั้งหมด 3 ราย ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 ราย และภาคใต้ 1 ราย


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	พะเยา	2,213	464.76
2	เชียงใหม่	6,947	395.77
3	หนองคาย	1,939	371.46
4	ระยอง	2,526	352.17
5	กรุงเทพมหานคร	19,427	342.05

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดพะเยา อัตราป่วย 464.76 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ เชียงใหม่ อัตราป่วย 395.77 ต่อประชากรแสนคน หนองคาย อัตราป่วย 371.46 ต่อประชากรแสนคน ระยอง อัตราป่วย 352.17 ต่อประชากรแสนคน และกรุงเทพมหานคร อัตราป่วย 342.05 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า กรุงเทพมหานคร มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 342.05 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 304.06 ต่อประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพที่ 6 อัตราป่วย 185.87 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2563 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2563)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
รวมทั้งประเทศ	110930	3	66301242	167.31	0.00	0.00
ภาคเหนือ	28663	0	12436028	230.48	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่/เครือข่ายบริการที่ 1	23107	0	5878537	304.06	0.00	0.00
เชียงใหม่	12289	0	1755291	395.77	0.00	0.00
เชียงราย	3031	0	1289873	295.07	0.00	0.00
ลำปาง	2415	0	744714	264.93	0.00	0.00
ลำพูน	1675	0	405936	205.20	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	448	0	280826	139.23	0.00	0.00
น่าน	1047	0	479414	176.47	0.00	0.00
พะเยา	1561	0	476157	464.76	0.00	0.00
แพร่	641	0	446326	193.80	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/เครือข่ายบริการที่ 2	6612	0	3565071	176.74	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	1105	0	994936	149.56	0.00	0.00
พิษณุโลก	2693	0	866129	288.99	0.00	0.00
สุโขทัย	1032	0	598287	130.87	0.00	0.00
ตาก	590	0	649472	105.78	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	1192	0	456247	184.11	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/เครือข่ายบริการที่ 3	7212	0	2992420	149.98	0.00	0.00
ชัยนาท	126	0	328993	43.77	0.00	0.00
กำแพงเพชร	2259	0	728470	130.14	0.00	0.00
นครสวรรค์	3742	0	1064649	226.84	0.00	0.00
พิจิตร	707	0	540620	131.33	0.00	0.00
อุทัยธานี	378	0	329688	82.20	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	43893	0	16756435	261.95	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	4340	0	5343264	81.22	0.00	0.00
อ่างทอง	404	0	281014	143.77	0.00	0.00
ลพบุรี	616	0	758003	81.27	0.00	0.00
นครนายก	193	0	259718	74.31	0.00	0.00
นนทบุรี	713	0	1238015	57.59	0.00	0.00
อยุธยา	1015	0	815647	124.44	0.00	0.00
ปทุมธานี	664	0	1137603	58.37	0.00	0.00
สระบุรี	601	0	643531	93.39	0.00	0.00
สิงห์บุรี	134	0	209733	63.89	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	8809	0	5324608	165.44	0.00	0.00
กาญจนบุรี	1556	0	890565	174.72	0.00	0.00
นครปฐม	2297	0	914273	251.24	0.00	0.00
เพชรบุรี	505	0	483335	104.48	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	730	0	546396	133.60	0.00	0.00
ราชบุรี	1119	0	872615	128.24	0.00	0.00
สมุทรสาคร	916	0	573215	159.80	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	244	0	193847	125.87	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	1442	0	850362	169.57	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	11317	0	6088563	185.87	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	1748	0	712449	245.35	0.00	0.00
จันทบุรี	1006	0	535478	187.87	0.00	0.00
ชลบุรี	2359	0	1522285	154.96	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	831	0	489592	169.73	0.00	0.00
ระยอง	2526	0	717276	352.17	0.00	0.00
สระแก้ว	226	0	563014	40.14	0.00	0.00
สมุทรปราการ	2461	0	1318687	186.63	0.00	0.00
ตราด	160	0	229782	69.63	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	31676	2	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	6391	0	5062199	126.25	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	515	0	985676	52.25	0.00	0.00
ขอนแก่น	3883	0	1805903	215.02	0.00	0.00
มหาสารคาม	1023	0	963060	106.22	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	970	0	1307560	74.18	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	6437	0	5553738	115.90	0.00	0.00
บึงกาฬ	497	0	423485	117.36	0.00	0.00
เลย	1128	0	642220	175.64	0.00	0.00
นครพนม	973	0	718406	135.44	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	661	0	511878	129.13	0.00	0.00
หนองคาย	1939	0	521995	371.46	0.00	0.00
สกลนคร	438	0	1150876	38.06	0.00	0.00
อุดรธานี	801	0	1584878	50.54	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	12093	2	6772779	178.55	0.03	0.02
บุรีรัมย์	2587	0	1593378	162.36	0.00	0.00
ชัยภูมิ	1868	0	1139067	163.99	0.00	0.00
นครราชสีมา	6695	2	2642815	253.33	0.08	0.03
สุรินทร์	943	0	1397519	67.48	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/เครือข่ายบริการที่ 10	6755	0	4613643	146.41	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	292	0	378363	77.17	0.00	0.00
มุกดาหาร	749	0	351532	213.07	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	815	0	1472521	55.35	0.00	0.00
อุบลราชธานี	4234	0	1872091	226.16	0.00	0.00
ยโสธร	665	0	539136	123.35	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	6698	1	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/ เครือข่ายบริการที่ 11	4488	1	4466673	100.48	0.02	0.02
ชุมพร	660	0	510307	129.33	0.00	0.00
กระบี่	414	0	471754	87.76	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	1423	0	1558958	91.28	0.00	0.00
พังงา	366	0	267866	136.64	0.00	0.00
ภูเก็ต	458	0	406113	112.78	0.00	0.00
ระนอง	70	0	191134	36.62	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	1097	1	1060541	103.44	0.09	0.09
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	2210	0	4960215	44.55	0.00	0.00
นราธิวาส	737	0	799357	92.20	0.00	0.00
ปัตตานี	80	0	713937	11.21	0.00	0.00
พัทลุง	432	0	524951	82.29	0.00	0.00
สตูล	73	0	320637	22.77	0.00	0.00
สงขลา	514	0	1428429	35.98	0.00	0.00
ตรัง	221	0	643093	34.37	0.00	0.00
ยะลา	153	0	529811	28.88	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	19427	0	5679532	342.05	0.00	0.00


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กันยายน 2563 พบจำนวน 27 เหตุการณ์ ใน 20 จังหวัด โดยพบในโรงเรียน/มหาวิทยาลัย 9 เหตุการณ์ เรือนจำ 9 เหตุการณ์ กองร้อยอาสารักษาดินแดน 1 เหตุการณ์ โรงพยาบาล 2 เหตุการณ์ โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 1 เหตุการณ์ และค่ายบำบัดยาเสพติด 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิงในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปรายการประจำปี