



คำแนะนำการรับวัคซีนโควิด-19 สำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี*

โดยสมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรได้รับวัคซีนโควิด-19



วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่รุนแรงได้
แม้ว่าไม่มีข้อมูลของประสิทธิภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวีมากพอ

การตอบสนองต่อวัคซีนแตกต่างกันขึ้นกับระดับซีดีสี่
และปัจจัยทางสุขภาพของผู้รับวัคซีน

อาการข้างเคียงจากวัคซีนไม่แตกต่างจากประชากรกลุ่มอื่น



แนะนำให้ป้องกันด้วยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น ใส่หน้ากาก
ล้างมือ และการเว้นระยะห่าง

แนะนำให้รักษาด้วยยาต้านเอชไอวีอย่างต่อเนื่อง

กรณีมีโรคติดเชื้อฉวยโอกาสรุนแรงอยู่ควรรักษาจนอาการคงที่ก่อน

*ข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ในผู้ติดเชื้อเอชไอวียังมีจำกัด คำแนะนำนี้เป็นเพียงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
ผู้ติดเชื้อเอชไอวีควรปรึกษาแพทย์ก่อนตัดสินใจรับวัคซีน