



## สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

Thai Association for the Study of the Liver

ที่ ส.ต. 033 / 2564

18 พฤษภาคม 2564

นายกสมาคม

นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์

ผู้ร่วมดำเนินรายการสมาคม

พญ.อานันดา โสภณสุขุมวุฒิ

เลขานิการ

นพ.พูลศัย จารัสเจริญวิทยา

ปฏิคม

นพ.สุนทร ชลประเสริฐสุข

เหตุภัยภิก

พญ.ศิริพร ไชยนุวัติ

ประธานฝ่ายวิชาการ

และการศึกษาต่อเนื่อง

นพ.ธีระ พิรช์วิสุทธิ์

ประธานฝ่ายวิจัย

นพ.ทวีศักดิ์ แทนวันเดช

ประธานฝ่ายวารสาร

พญ.พนิตา ทองอุ่นทัยศรี

ประธานฝ่ายจิตยธรรม

พล.ต.นพ.อนุชิต รุ่งโรจน์

ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

พญ.อภิญญา สิรพันธ์

นายทะเบียน

นพ.สมบัติ ศรีประเสริฐสุข

กรรมการ (ฝ่ายเงินออม)

นพ.เฉลิมรัช บัญชากวงกุล

กรรมการ (รองเลขานิการ)

นพ.มล.ทanya กิติยากร

กรรมการ

พญ.ณัชญา จำรูญกุล

พญ.สุวัทศรี เกษรชุลิศรัตน์

พญ.วนุช จังศรีสวัสดิ์

พญ.ณัชชา ปันเจริญ

พีร์กญา

นพ.เติมชัย ไชยนุวัติ

พญ.ชุดima ประมูลลินทรัพย์

พญ.วิรชานา มหาชัย

นพ.ยงยุทธ ศรีวัฒนอักษร

พญ.วัฒนา อุ๊ชไพบูลย์วิริญ

นพ.ศตวรรษ ทองสวัสดิ์

พล.อ.ต.นพ.ชินวัตร สุทธิวนา

เรื่อง คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 จากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย

เรียน ประธานราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมโรคตับแห่งประเทศไทยขอนำส่ง คำแนะนำเรื่องการฉีดวัคซีน COVID-19 จากสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย ตามรายละเอียดด้านล่าง

- ผู้ที่สูงอายุ อ้วน และผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคปอด หอบหืด ไตวาย เรื้อรัง รวมทั้งโรคตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็ง มะเร็งตับ ผู้ป่วยที่ได้รับยา抗凝 และผู้ป่วยภายหลัง ปลูกถ่ายตับมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดโรค COVID-19 ที่รุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูงกว่าคนปกติ
- วัคซีน COVID-19 ช่วยลดความรุนแรงและโอกาสเสียชีวิตจากการป่วยด้วยโรค COVID-19 ทั้งในคนทั่วไปและผู้ป่วยโรคตับทุกชนิด
- ผู้ป่วยโรคตับประเภทต่างๆ และโรคตับแข็งระยะต้นควรฉีดวัคซีน COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ป่วยโรคตับแข็งระยะกลางและระยะท้าย มะเร็งตับ และผู้ป่วยภายหลังปลูกถ่ายตับที่มีอาการคงที่ เนื่องจากมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดโรค COVID-19 ที่รุนแรงมากขึ้น ผลข้างเคียงของวัคซีน มีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยเมื่อเทียบกับความรุนแรงของโรค ยกเว้นผู้ป่วยที่มีประวัติแพ้วัคซีน ควรปรึกษาแพทย์ก่อน
- ผู้ป่วยภายหลังปลูกถ่ายตับควรฉีดวัคซีน COVID-19 หลังปลูกถ่ายตับอย่างน้อย 3 เดือนขึ้นไป (หรืออย่างเร็วสุดคือ 1 เดือนหลังปลูกถ่ายตับ ขึ้นกับคุณภาพพิเศษของแพทย์ผู้ดูแล)
- ผู้ป่วยโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ตับอักเสบจากการแพ้ภูมิ มะเร็งตับ และ ภายหลังปลูกถ่ายตับที่ได้รับยาารักษा ไม่จำเป็นต้องหยุดยาต้านไวรัส การรักษาโรคนั้นๆ หรือยา抗凝 ก่อนและระหว่างฉีดวัคซีน COVID-19
- ผู้ป่วยโรคตับแข็งที่มีเกล็ดเลือดต่ำหรือเลือดแข็งตัวช้า ควรกดตัวแหน่งที่ฉีดยาไว้ 1-2 นาที หลังฉีดวัคซีน COVID-19
- ผู้ป่วยโรคตับที่ฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วมีไข้ สามารถรับประทานยาลดไข้พาราเซตามอล ตามขนาดยาที่ถูกต้องและเหมาะสมได้
- ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลว่าวัคซีน COVID-19 ได้ดีกว่ากันทั้งในคนปกติและผู้ป่วยโรคตับ สำหรับ วัคซีนของ AstraZeneca ใช้ไวรัสที่ไม่แบ่งตัว จึงไม่น่าเกิดข้อเสียจากการฉีดวัคซีน
- ในขณะนี้ ข้อมูลของวัคซีน COVID-19 ในผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปียังอยู่ระหว่างการศึกษา แต่มีแนวโน้มที่วัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 และลดความรุนแรงของโรค COVID-19 ได้เช่นเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์)

นายกสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย