

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่า ข้อมูลระบาดวิทยา และไวรัสวิทยาในปัจจุบัน ควรวิเคราะห์และอธิบายผลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ แตกต่างไป เนื่องจากประเทศสมาชิก มีมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยเช่นกัน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 29 มีนาคม 2564 โดยภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในบางประเทศ แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับต่ำกว่าที่คาดการณ์ในช่วงเวลานี้นี้ของปี ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์การระบาด แม้ว่าจะมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และ B อย่างต่อเนื่องในบางประเทศ ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับฤดูกาล ในประเทศแคริบเบียนและอเมริกากลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบโรคไข้หวัดใหญ่ ในเขตร้อนอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ แต่มีรายงานพบเชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ (ORVs) ในระดับที่ต่ำ ในบางประเทศ แอฟริกาเขตร้อน มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในบางประเทศที่มีการรายงานในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกาตะวันออก ช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ประเทศในเอเชียใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ประปราย ในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) อย่างต่อเนื่อง ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B ในระดับต่ำมาก องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มีมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อควบคุมการติดเชื้อและฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

องค์การอนามัยโลก สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่ และโควิด-19 เพื่อสร้างรูปแบบการรายงานในระดับภูมิภาค และระดับโลก

- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** ในภาพรวม สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์การระบาด ประเทศแถบอเมริกาเหนือ พบตัวบ่งชี้สถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงร้อยละของผลบวกของโรคไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) อยู่ในระดับที่ต่ำมาก แม้จะมีการทดสอบเชื้อไข้หวัดใหญ่ในระดับปกติ หรือในระดับที่เพิ่มขึ้นก็ตาม ในสหรัฐอเมริกา ร้อยละของการเสียชีวิตเนื่องจากโรคปอดบวม โรคไข้หวัดใหญ่หรือโรคโควิด-19 สูงกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรคปอดบวม และอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ ที่ประมาณการจากข้อมูลในอดีต
- **ในยุโรป** สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำมาก โดยมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และชนิด B ในบางประเทศอย่างต่อเนื่อง ตัวบ่งชี้อาการป่วยทางเดินหายใจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในบางประเทศที่มีการรายงาน แม้ว่าจะ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ก็ตาม และมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสทางเดินหายใจชนิดอื่น ๆ เพิ่มขึ้นในบางประเทศจากการเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ ประมาณการณ์การเสียชีวิตโดยรวม จากเครือข่าย EuroMOMO พบว่าอัตราการเสียชีวิตลดลง ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น

- ในเอเชียกลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในประเทศที่มีการรายงาน
- ในแอฟริกาเหนือ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ ในช่วงระยะเวลาของการรายงานนี้
- ในเอเชียตะวันตก สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์ของผู้ป่วย ILI อยู่ในระดับต่ำ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B ในสาธารณรัฐอิรัก ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อย่างต่อเนื่อง ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) อย่างต่อเนื่อง ในช่วงเวลานี้
- ในเอเชียตะวันออก ตัวบ่งชี้การเจ็บป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ หรือต่ำกว่าเกณฑ์การระบาด ในประเทศที่มีการรายงาน สถานการณ์ของผู้ป่วย ILI อยู่ในระดับปกติ หรือต่ำกว่าปกติ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงเวลานี้ของปี และมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B – Victoria ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน
- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต้** ในประเทศแคริบเบียนและอเมริกากลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ ผู้ป่วยโรคปอดบวมเพิ่มสูงขึ้น สู่ระดับเกณฑ์การระบาด ในประเทศจาเมกา ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น สถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ส่วนใหญ่อยู่ในระดับต่ำในประเทศที่มีการรายงาน มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ RSV เล็กน้อย ในสาธารณรัฐกัวเตมาลา และสาธารณรัฐนิการากัวในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้** ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ RSV และโรคทางเดินหายใจชนิดอื่นๆ เล็กน้อย ในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐโคลอมเบีย และประเทศเอกวาดอร์ นอกจากนี้มีรายงานสถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ในระดับปานกลางในประเทศเอกวาดอร์
- **ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา** ในแอฟริกาตะวันตก มีรายงานการพบโรคไข้หวัดใหญ่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 ในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และสาธารณรัฐกานา และมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) และชนิด B ในสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย สถานการณ์การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐโตโก ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา แอฟริกากลาง ไม่มีรายงานสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ที่เป็นปัจจุบัน ในช่วงระยะเวลาของการรายงานนี้ แต่เมื่อในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 และชนิด B ในสาธารณรัฐแคเมอรูน แอฟริกาตะวันออก ในสาธารณรัฐเคนยา มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) และชนิด B และมีรายงานสถานการณ์

การติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนในสาธารณรัฐยูกันดา มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2)

- **ประเทศเอเชียตะวันออก** ในเอเชียใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ส่วนในประเทศบังกลาเทศ สถานการณ์ของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และผู้ติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) อยู่ในระดับสูง แม้ว่าจะไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงเวลานี้
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นอกจากนี้มีรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) อยู่ในระดับคงที่
- **ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้** สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับตามฤดูกาล
- ในโอเชียเนีย สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับระหว่างฤดูกาล มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ RSV ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา ในบางพื้นที่ของเครือรัฐออสเตรเลีย และมีรายงานการตรวจพบ rhinovirus และ enterovirus แพร่กระจายในระดับเดียวกันของปี 2020
- ในแอฟริกาใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ 1 รายการ จากการเฝ้าระวังโรคปอดบวม แต่มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ RSV ได้รับการรายงานจากพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวัง และมีการตรวจพบโรคโควิด-19 ลดลงอย่างต่อเนื่องของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และโรคปอดบวม ในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมา
- ในเขตอบอุ่นของอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในประเทศที่มีการรายงาน มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ RSV อย่างต่อเนื่อง ในสาธารณรัฐชิลี และสาธารณรัฐปารากวัย สถานการณ์พบผู้ติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) อยู่ในระดับต่ำในสาธารณรัฐชิลี และสาธารณรัฐบราซิล ซึ่งสอดคล้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19


ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/influenza/surveillance_monitoring/updates/2021_03_29_surveillance_update_390.pdf?ua=1

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 มิถุนายน 2564 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 7,284 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 10.99 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 0 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายน้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 94.39 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 21.48 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 8.27 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็ก จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
เหนือ	2,380	0	19.14	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	2,688	0	12.22	0.00	0.00
ใต้	1,096	0	11.63	0.00	0.00
กลาง	1,120	0	6.68	0.00	0.00

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 19.94 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 12.22 ต่อประชากรแสนคน ภาคใต้ อัตราป่วย 11.63 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 6.68 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	อุบลราชธานี	856	45.72
2	พิษณุโลก	339	39.14
3	กระบี่	155	32.86
4	เชียงราย	410	31.79
5	น่าน	142	29.62

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี อัตราป่วย 45.72 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก อัตราป่วย 39.14 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดกระบี่ อัตราป่วย 32.86 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดเชียงราย อัตราป่วย 31.79 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดน่าน อัตราป่วย 29.62 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า เขตบริการสุขภาพที่ 10 มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 27.83 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที่ 2 อัตราป่วย 24.49 ต่อประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 20.00 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2564)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
รวมทั่วประเทศ	7284	0	66301242	10.99	0.00	0.00
ภาคเหนือ	2380	0	12436028	19.14	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่ / เครือข่ายบริการที่ 1	1176	0	5878537	20.00	0.00	0.00
เชียงใหม่	270	0	1755291	15.38	0.00	0.00
เชียงราย	410	0	1289873	31.79	0.00	0.00
ลำปาง	194	0	744714	26.05	0.00	0.00
ลำพูน	8	0	405936	1.97	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	51	0	280826	18.16	0.00	0.00
น่าน	142	0	479414	29.62	0.00	0.00
พะเยา	28	0	476157	5.88	0.00	0.00
แพร่	73	0	446326	16.36	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/ เครือข่ายบริการที่ 2	873	0	3565071	24.49	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	93	0	994936	9.35	0.00	0.00
พิษณุโลก	339	0	866129	39.14	0.00	0.00
สุโขทัย	173	0	598287	28.92	0.00	0.00
ตาก	187	0	649472	28.79	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	81	0	456247	17.75	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/ เครือข่ายบริการที่ 3	331	0	2992420	11.06	0.00	0.00
ชัยนาท	1	0	328993	0.30	0.00	0.00
กำแพงเพชร	135	0	728470	18.53	0.00	0.00
นครสวรรค์	136	0	1064649	12.77	0.00	0.00
พิจิตร	50	0	540620	9.25	0.00	0.00
อุทัยธานี	9	0	329688	2.73	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	1120	0	16756435	6.68	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	253	0	5343264	4.73	0.00	0.00
อ่างทอง	18	0	281014	6.41	0.00	0.00
ลพบุรี	22	0	758003	2.90	0.00	0.00
นครนายก	2	0	259718	0.77	0.00	0.00
นนทบุรี	27	0	1238015	2.18	0.00	0.00
อยุธยา	55	0	815647	6.74	0.00	0.00
ปทุมธานี	7	0	1137603	0.62	0.00	0.00
สระบุรี	106	0	643531	16.47	0.00	0.00
สิงห์บุรี	16	0	209733	7.63	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	253	0	5324608	4.75	0.00	0.00
กาญจนบุรี	108	0	890565	12.13	0.00	0.00
นครปฐม	57	0	914273	6.23	0.00	0.00
เพชรบุรี	8	0	483335	1.66	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	25	0	546396	4.58	0.00	0.00
ราชบุรี	35	0	872615	4.01	0.00	0.00
สมุทรสาคร	0	0	573215	0.00	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	2	0	193847	1.03	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	18	0	850362	2.12	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	402	0	6088563	6.60	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	64	0	712449	8.98	0.00	0.00
จันทบุรี	40	0	535478	7.47	0.00	0.00
ชลบุรี	30	0	1522285	1.97	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	18	0	489592	3.68	0.00	0.00
ระยอง	16	0	717276	2.23	0.00	0.00
สระแก้ว	14	0	563014	2.49	0.00	0.00
สมุทรปราการ	203	0	1318687	15.39	0.00	0.00
ตราด	17	0	229782	7.40	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	2688	0	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	465	0	5062199	9.19	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	30	0	985676	3.04	0.00	0.00
ขอนแก่น	200	0	1805903	11.07	0.00	0.00
มหาสารคาม	108	0	963060	11.21	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	127	0	1307560	9.71	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	263	0	5553738	4.74	0.00	0.00
บึงกาฬ	28	0	423485	6.61	0.00	0.00
เลย	68	0	642220	10.59	0.00	0.00
นครพนม	57	0	718406	7.93	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	20	0	511878	3.91	0.00	0.00
หนองคาย	12	0	521995	2.30	0.00	0.00
สกลนคร	46	0	1150876	4.00	0.00	0.00
อุดรธานี	32	0	1584878	2.02	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	676	0	6772779	9.98	0.00	0.00
บุรีรัมย์	292	0	1593378	18.33	0.00	0.00
ชัยภูมิ	64	0	1139067	5.62	0.00	0.00
นครราชสีมา	219	0	2642815	8.29	0.00	0.00
สุรินทร์	101	0	1397519	7.23	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/ เครือข่ายบริการที่ 10	1284	0	4613643	27.83	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	31	0	378363	8.19	0.00	0.00
มุกดาหาร	42	0	351532	11.95	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	201	0	1472521	13.65	0.00	0.00
อุบลราชธานี	856	0	1872091	45.72	0.00	0.00
ยโสธร	154	0	539136	28.56	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	1096	0	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/ เครือข่ายบริการที่ 11	635	0	4466673	14.22	0.00	0.00
ชุมพร	52	0	510307	10.19	0.00	0.00
กระบี่	155	0	471754	32.86	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	262	0	1558958	16.81	0.00	0.00
พังงา	66	0	267866	24.64	0.00	0.00
ภูเก็ต	9	0	406113	2.22	0.00	0.00
ระนอง	17	0	191134	8.89	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	74	0	1060541	6.98	0.00	0.00
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	461	0	4960215	9.29	0.00	0.00
นราธิวาส	206	0	799357	25.77	0.00	0.00
ปัตตานี	14	0	713937	1.96	0.00	0.00
พัทลุง	45	0	524951	8.57	0.00	0.00
สตูล	11	0	320637	3.43	0.00	0.00
สงขลา	115	0	1428429	8.05	0.00	0.00
ตรัง	30	0	643093	4.66	0.00	0.00
ยะลา	40	0	529811	7.55	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	212	0	5679532	3.73	0.00	0.00


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 6 มิถุนายน 2564 พบจำนวนรวม 1 เหตุการณ์ ได้แก่ โรงพยาบาล 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิง
ในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปลักษณะการประจำปี