

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์ต่างประเทศ

องค์การอนามัยโลก ชี้แจงว่า ข้อมูลระบาดวิทยา และไวรัสวิทยาในปัจจุบัน ควรวิเคราะห์และอธิบายผลอย่างระมัดระวัง เนื่องจากการระบาดของ COVID-19 อย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลให้ประชากรมีพฤติกรรมสุขภาพ การเฝ้าระวังในพื้นที่เฝ้าระวังเฉพาะ แตกต่างไป เนื่องจากประเทศสมาชิก มีมาตรการเพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งอาจมีผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ด้วยเช่นกัน

การรายงานสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในภาพรวมทั่วโลก ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยภาพรวมในขณะนี้ สถานการณ์ลดลงอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการทดสอบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นในบางประเทศ แต่ก็ยังคงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ในช่วงเวลานี้อย่างมาก ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือ สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับตามฤดูกาล ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้ สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับตามฤดูกาล ในประเทศแถบแคริบเบียน และอเมริกากลาง มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และชนิด B ในสหรัฐอเมริกา ในเขตร้อนอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ ในแอฟริกาตะวันออก มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในบางประเทศที่มีการรายงาน ในแอฟริกาตะวันตกและแอฟริกาตะวันออก ประเทศในเอเชียใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) และยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐอินเดีย และสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตย เนปาล ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) อย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต สถานการณ์ในภาพรวมทั่วโลก มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน องค์การอนามัยโลกแนะนำให้มาตรการจัดการที่เหมาะสม เพื่อควบคุมการติดเชื้อและฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยง โดยมีรายละเอียดสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาค ดังต่อไปนี้

องค์การอนามัยโลก สนับสนุนให้ประเทศสมาชิก ส่งผลตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคไข้หวัดใหญ่ และโควิด 19 เพื่อสร้างรูปแบบการรายงานในระดับภูมิภาค และระดับโลก

- **ประเทศในเขตอบอุ่นซีกโลกเหนือ** ในภาพรวม สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์การระบาด ในประเทศแถบอเมริกาเหนือ พบตัวบ่งชี้สถานการณ์การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงร้อยละของผลบวกของโรคไข้หวัดใหญ่ และผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) อยู่ในระดับต่ำมาก ในประเทศสหรัฐอเมริกา (USA) สถานการณ์ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) พบสูงขึ้นในเด็กอายุ 0-4 ปี มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ (RSV) และ parainfluenza เพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา ร้อยละของการเสียชีวิตจากโรคปอดบวมโรคไข้หวัดใหญ่ หรือโรคโควิด 19 สูงกว่าเกณฑ์การแพร่ระบาดของโรคปอดบวม และอัตราการเสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ประมาณการจากข้อมูลในอดีต

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

- ในยุโรป สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับระหว่างฤดูกาล โดยมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และชนิด B เพียงเล็กน้อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน และสหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่ และไอร์แลนด์เหนือ การตรวจพบ ORV และมีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ในบางประเทศจากการเฝ้าระวังในทุกพื้นที่ ประมาณการการเสียชีวิตโดยรวม จากเครือข่าย EuroMOMO อยู่ในระดับที่คาดการณ์ไว้
- ในเอเชียกลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ในประเทศที่มีการรายงาน
- ในแอฟริกาเหนือ ไม่ได้รับการรายงานสำหรับรอบระยะเวลาของการรายงานครั้งนี้ แต่มีรายงานสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) และชนิด B เพียงเล็กน้อยจากสัปดาห์ก่อนหน้านี้ ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
- ในเอเชียตะวันตก สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ และอัตราการพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) โดยรวมยังอยู่ในระดับต่ำ ที่รัฐกาตาร์มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) เพิ่มขึ้น
- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตัวบ่งชี้การเจ็บป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่ และสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งอัตราการพบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) อยู่ในระดับที่น้อยกว่าในปีก่อนหน้านี้ ยกเว้นในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน โรคไข้หวัดใหญ่ชนิด B- Victoria ยังคงตรวจพบทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระดับที่ใกล้เคียงกับช่วงที่ระยะเวลาของการรายงานครั้งก่อนหน้านี้ แต่ต่ำกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ยังมีการรายงานการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) pdm09 เพียงเล็กน้อยทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโรคปอดบวมยังคงเพิ่มขึ้นในประเทศมองโกเลีย
- **ประเทศเขตร้อนของอเมริกากลาง แคริบเบียน และอเมริกาใต้** ในประเทศแถบแคริบเบียนและอเมริกากลาง มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A และชนิด B ในสาธารณรัฐเม็กซิโก และมีการรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจ (RSV) อยู่ในระดับต่ำในแต่ละประเทศที่มีการรายงานข้อมูลในช่วงระยะเวลานี้
- ประเทศเขตร้อนของอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ สถานการณ์ของโรคทางเดินหายใจ (RSV) เพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐเปรู นอกจากนี้พบว่าสัดส่วนของผู้ป่วยติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) ลดลงถึงระดับต่ำในรัฐพหุชนชาติแห่งโบลิเวีย
- **ประเทศเขตร้อนของแอฟริกา** ในแอฟริกาตะวันตก มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H1N1) pdm09 เล็กน้อยในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในแอฟริกากลาง ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในช่วงระยะเวลานี้ แม้ว่าจะมีการทดสอบอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐชาด และสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ในแอฟริกาตะวันออก มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) เป็นส่วนใหญ่ในสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปีย
- **ประเทศเอเชียเขตร้อน** ในเอเชียใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A(H3N2) ส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล นอกจากนี้ยังมีการรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) pdm09 เพียงเล็กน้อยในสาธารณรัฐอินเดีย และมีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B-Victoria สองเพียงเล็กน้อยในสาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล

- ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H3N2) อย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
- **ประเทศในเขตอบอุ่นของซีกโลกใต้** สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ อยู่ในระดับตามฤดูกาล
- ในโอเชียเนีย มีรายงานอัตราของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และตัวบ่งชี้การเจ็บป่วยของโรคไข้หวัดใหญ่ชนิดอื่นๆ ยังคงต่ำมาก แม้จะทำการทดสอบอย่างต่อเนื่อง การตรวจหาเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ยังพบต่อเนื่อง ในบางพื้นที่ของเครือรัฐออสเตรเลีย มีรายงานการตรวจพบโรคทางเดินหายใจอื่น ๆ ที่ตรวจพบในระดับปกติในช่วงระยะเวลานี้ของปี ในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย มีรายงานว่าพบโรคติดต่อทางเดินหายใจเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส parainfluenza และมีรายงานว่าพบโรคติดต่อทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันที่มีสาเหตุจากเชื้อไวรัส metapneumovirus ในมนุษย์สูงกว่าระดับในอดีตในช่วงระยะเวลานี้ของปี แม้ว่าจะลดลงก็ตามในประเทศนิวซีแลนด์ นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARI) อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ตามฤดูกาล โดยพบว่าโรคทางเดินหายใจชนิด rhinovirus, parainfluenza และ Respiratory syncytial virus (RSV) เป็นไวรัสที่ตรวจพบบ่อยที่สุด
- ในแอฟริกาใต้ มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B เพียงเล็กน้อย (ไม่ได้ระบุเชื้อสาย) ในช่วงระยะเวลานี้ แม้ว่าสถานการณ์จะยังคงอยู่ในระดับระหว่างฤดูกาล การตรวจหาพบโรคทางเดินหายใจ RSV ยังคงดำเนินการต่อไป แม้ว่าสถานการณ์ยังคงต่ำกว่าระดับฤดูกาล และอัตราการตรวจพบโรคโควิด 19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในระบบเฝ้าระวังของผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และระบบเฝ้าระวังโรคปอดบวม
- ในเขตอบอุ่นของอเมริกาใต้ ไม่มีรายงานการตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ แต่พบว่าสถานการณ์ของโรคทางเดินหายใจ RSV ยังคงเพิ่มขึ้นในสาธารณรัฐอาร์เจนตินา และเหมือนว่าจะลดลงในประเทศอื่นๆ ที่มีการรายงาน


ที่มา : องค์การอนามัยโลก

https://cdn.who.int/media/docs/default-source/influenza/influenza-updates/2021/2021_08_30_surveillance_update_401.pdf?sfvrsn=1a92229d_5

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases


สถานการณ์ประเทศไทย



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2564 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 8 กันยายน 2564 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 8,747 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 13.19 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 0 ราย คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.00 จำนวนผู้ป่วยสะสมในภาพรวม ลดลง จำนวนผู้ป่วยสะสมมีแนวโน้มลดลงต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

❖ จำแนกตามกลุ่มอายุ



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่จำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่าส่วนใหญ่พบผู้ป่วยอยู่ในกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 107.33 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี มีอัตราป่วย 25.09 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่มอายุ 10 - 14 ปี มีอัตราป่วย 10.55 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่มีอัตราป่วยสูงจะอยู่ในช่วงวัยเด็ก จึงต้องมีการให้ความสำคัญต่อการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มวัยเรียนและเด็ก และในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มากขึ้น

❖ จำแนกรายภาค

ภาค	ผู้ป่วย (ราย)	ผู้ป่วยตาย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
เหนือ	2,888	0	23.22	0.00	0.00
ตะวันออกเฉียงเหนือ	3,121	0	14.18	0.00	0.00
ใต้	1,296	0	13.75	0.00	0.00
กลาง	1,442	0	8.61	0.00	0.00

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายภาค พบว่า ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคเหนือ อัตราป่วย 23.22 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อัตราป่วย 14.18 ต่อประชากรแสนคน ภาคใต้ อัตราป่วย 13.75 ต่อประชากรแสนคน และน้อยที่สุด คือ ภาคกลาง อัตราป่วย 8.61 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ


❖ จำแนกตามอัตราป่วยรายจังหวัด 5 อันดับ

อันดับ	จังหวัด	จำนวนผู้ป่วย (ราย)	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)
1	อุบลราชธานี	1,014	54.16
2	พิษณุโลก	407	46.99
3	ตาก	249	38.34
4	เชียงราย	482	37.37
5	กระบี่	170	36.04

ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

การกระจายของการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่รายจังหวัด พบว่าจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี อัตราป่วย 54.16 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดพิษณุโลก อัตราป่วย 46.99 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดตาก อัตราป่วย 38.34 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดเชียงราย อัตราป่วย 37.37 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดกระบี่ อัตราป่วย 36.04 ต่อประชากรแสนคนตามลำดับ

❖ จำแนกตามเครือข่ายบริการและกรุงเทพมหานคร



ที่มา : รายงาน 506 สำนักระบาดวิทยา

เมื่อพิจารณาจำแนกผู้ป่วยตามเขตบริการสุขภาพและกรุงเทพมหานคร พบว่า เขตบริการสุขภาพที่ 10 มีอัตราป่วยสูงสุด คือ 32.51 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือเขตบริการสุขภาพที่ 2 อัตราป่วย 29.82 ต่อประชากรแสนคน และเขตบริการสุขภาพที่ 1 อัตราป่วย 24.33 ต่อประชากรแสนคน ตามลำดับ

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 จำแนกตามรายจังหวัด (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2564)

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
รวมทั่วประเทศ	8747	0	66301242	13.19	0.00	0.00
ภาคเหนือ	2888	0	12436028	23.22	0.00	0.00
สคร.1 เชียงใหม่ / เครือข่ายบริการที่ 1	1430	0	5878537	24.33	0.00	0.00
เชียงใหม่	348	0	1755291	19.83	0.00	0.00
เชียงราย	482	0	1289873	37.37	0.00	0.00
ลำปาง	227	0	744714	30.48	0.00	0.00
ลำพูน	11	0	405936	2.71	0.00	0.00
แม่ฮ่องสอน	87	0	280826	30.98	0.00	0.00
น่าน	165	0	479414	34.42	0.00	0.00
พะเยา	30	0	476157	6.30	0.00	0.00
แพร่	80	0	446326	17.92	0.00	0.00
สคร.2 พิษณุโลก/ เครือข่ายบริการที่ 2	1063	0	3565071	29.82	0.00	0.00
เพชรบูรณ์	107	0	994936	10.75	0.00	0.00
พิษณุโลก	407	0	866129	46.99	0.00	0.00
สุโขทัย	201	0	598287	33.60	0.00	0.00
ตาก	249	0	649472	38.34	0.00	0.00
อุตรดิตถ์	99	0	456247	21.70	0.00	0.00
สคร.3 นครสวรรค์/ เครือข่ายบริการที่ 3	395	0	2992420	13.20	0.00	0.00
ชัยนาท	4	0	328993	1.22	0.00	0.00
กำแพงเพชร	159	0	728470	21.83	0.00	0.00
นครสวรรค์	156	0	1064649	14.65	0.00	0.00
พิจิตร	62	0	540620	11.47	0.00	0.00
อุทัยธานี	14	0	329688	4.25	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคกลาง	1442	0	16756435	8.61	0.00	0.00
สคร.4 สระบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 4	331	0	5343264	6.19	0.00	0.00
อ่างทอง	25	0	281014	8.90	0.00	0.00
ลพบุรี	29	0	758003	3.83	0.00	0.00
นครนายก	2	0	259718	0.77	0.00	0.00
นนทบุรี	32	0	1238015	2.58	0.00	0.00
อยุธยา	108	0	815647	13.24	0.00	0.00
ปทุมธานี	8	0	1137603	0.70	0.00	0.00
สระบุรี	106	0	643531	16.47	0.00	0.00
สิงห์บุรี	21	0	209733	10.01	0.00	0.00
สคร.5 ราชบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 5	315	0	5324608	5.92	0.00	0.00
กาญจนบุรี	123	0	890565	13.81	0.00	0.00
นครปฐม	66	0	914273	7.22	0.00	0.00
เพชรบุรี	14	0	483335	2.90	0.00	0.00
ประจวบคีรีขันธ์	37	0	546396	6.77	0.00	0.00
ราชบุรี	54	0	872615	6.19	0.00	0.00
สมุทรสาคร	0	0	573215	0.00	0.00	0.00
สมุทรสงคราม	2	0	193847	1.03	0.00	0.00
สุพรรณบุรี	19	0	850362	2.23	0.00	0.00
สคร.6 ชลบุรี/ เครือข่ายบริการที่ 6	511	0	6088563	8.39	0.00	0.00
ฉะเชิงเทรา	72	0	712449	10.11	0.00	0.00
จันทบุรี	64	0	535478	11.95	0.00	0.00
ชลบุรี	30	0	1522285	1.97	0.00	0.00
ปราจีนบุรี	19	0	489592	3.88	0.00	0.00
ระยอง	23	0	717276	3.21	0.00	0.00
สระแก้ว	14	0	563014	2.49	0.00	0.00
สมุทรปราการ	271	0	1318687	20.55	0.00	0.00
ตราด	18	0	229782	7.83	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	3121	0	22002359	142.58	0.03	0.02
สคร.7 ขอนแก่น/ เครือข่ายบริการที่ 7	564	0	5062199	11.14	0.00	0.00
กาฬสินธุ์	30	0	985676	3.04	0.00	0.00
ขอนแก่น	235	0	1805903	13.01	0.00	0.00
มหาสารคาม	143	0	963060	14.85	0.00	0.00
ร้อยเอ็ด	156	0	1307560	11.93	0.00	0.00
สคร.8 อุดรธานี/ เครือข่ายบริการที่ 8	296	0	5553738	5.33	0.00	0.00
บึงกาฬ	28	0	423485	6.61	0.00	0.00
เลย	81	0	642220	12.61	0.00	0.00
นครพนม	66	0	718406	9.19	0.00	0.00
หนองบัวลำภู	24	0	511878	4.69	0.00	0.00
หนองคาย	16	0	521995	3.07	0.00	0.00
สกลนคร	49	0	1150876	4.26	0.00	0.00
อุดรธานี	32	0	1584878	2.02	0.00	0.00
สคร.9 นครราชสีมา/ เครือข่ายบริการที่ 9	761	0	6772779	11.24	0.00	0.00
บุรีรัมย์	321	0	1593378	20.15	0.00	0.00
ชัยภูมิ	72	0	1139067	6.32	0.00	0.00
นครราชสีมา	252	0	2642815	9.54	0.00	0.00
สุรินทร์	116	0	1397519	8.30	0.00	0.00
สคร.10 อุบลราชธานี/ เครือข่ายบริการที่ 10	1500	0	4613643	32.51	0.00	0.00
อำนาจเจริญ	36	0	378363	9.51	0.00	0.00
มุกดาหาร	44	0	351532	12.52	0.00	0.00
ศรีสะเกษ	235	0	1472521	15.96	0.00	0.00
อุบลราชธานี	1014	0	1872091	54.16	0.00	0.00
ยโสธร	171	0	539136	31.72	0.00	0.00

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่


กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

จังหวัด/พื้นที่	รวม		อัตรา			
	จำนวนป่วย (ราย)	จำนวนตาย (ราย)	ประชากร	อัตราป่วย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราตาย (ต่อประชากรแสนคน)	อัตราป่วยตาย (ร้อยละ)
ภาคใต้	1296	0	9426888	91.03	0.01	0.01
สคร.11 นครศรีธรรมราช/ เครือข่ายบริการที่ 11	797	0	4466673	17.84	0.00	0.00
ชุมพร	58	0	510307	11.37	0.00	0.00
กระบี่	170	0	471754	36.04	0.00	0.00
นครศรีธรรมราช	357	0	1558958	22.90	0.00	0.00
พังงา	82	0	267866	30.61	0.00	0.00
ภูเก็ต	11	0	406113	2.71	0.00	0.00
ระนอง	31	0	191134	16.22	0.00	0.00
สุราษฎร์ธานี	88	0	1060541	8.30	0.00	0.00
สคร.12 สงขลา/ เครือข่ายบริการที่ 12	499	0	4960215	10.06	0.00	0.00
นราธิวาส	222	0	799357	27.77	0.00	0.00
ปัตตานี	14	0	713937	1.96	0.00	0.00
พัทลุง	50	0	524951	9.52	0.00	0.00
สตูล	12	0	320637	3.74	0.00	0.00
สงขลา	126	0	1428429	8.82	0.00	0.00
ตรัง	32	0	643093	4.98	0.00	0.00
ยะลา	43	0	529811	8.12	0.00	0.00
กรุงเทพมหานคร	285	0	5679532	5.02	0.00	0.00


สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Division of Communicable Diseases

❖ เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน



ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด



เหตุการณ์พบผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มก้อน ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 12 กันยายน 2564 พบจำนวนรวม 1 เหตุการณ์ ได้แก่ โรงพยาบาล 1 เหตุการณ์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนหมู่มาก

หมายเหตุ: ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่สัปดาห์แรก ดังนั้น จึงไม่ควรนำข้อมูลปัจจุบันไปอ้างอิง
ในเอกสารวิชาการการนำข้อมูลไปอ้างอิงนั้น ขอให้ใช้ข้อมูลจากสรุปรายการประจำปี