

บ่ำเพ็ชร์สื่อมวลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3859 โทรสาร 02 590 3386



กรมควบคุมโรค ห่วงเยาวชนไทย เสี่ยงติดเชื้อฟิตาชาวนร หลังพบเดือน ส.ค. ติดเพิ่ม 16 ราย และมีเพลสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยหรือกับคนแปลกหน้า ป้องกันติดเชื้อฟิตาชาวนร

กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์ระบาดโรคฟิตาชาวนรในประเทศไทย ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เริ่มพบผู้ป่วยในกลุ่มเยาวชน ผู้ป่วยส่วนใหญ่ติดเชื้อจากการมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าที่ไม่ทราบประวัติ หรือมีคู่นอนมากกว่าหนึ่งคน แนะนำคงสัมภัยมีประวัติเสี่ยง ให้ปรึกษาและแจ้งข้อมูลความเสี่ยงแก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประกอบการวินิจฉัยโรค โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

วันนี้ (3 กันยายน 2566) นายแพทย์ธีรศ กรัษนีย์ริววงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์ล่าสุด ของโรคฟิตาชาวนรในประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566 มีรายงานผู้ป่วยรวม 316 ราย (เสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง) เป็นกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายมากถึง 271 ราย (ร้อยละ 85.8) และมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี 143 ราย (ร้อยละ 45.3) มีสัญชาติไทย 277 ราย ชาวต่างชาติ 36 ราย ไม่ระบุ 3 ราย ส่วนใหญ่อายุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (198 ราย) จังหวัดชลบุรี (22 ราย) นนทบุรี (17 ราย) และสมุทรปราการ (12 ราย) ผู้ป่วยส่วนใหญ่อายุ 30-39 ปี จำนวน 152 ราย รองลงมาอายุ 20-29 ปี จำนวน 85 ราย กลุ่มเยาวชน อายุ 15-24 ปี จำนวน 28 ราย ซึ่งกลุ่มเยาวชนมีความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สถานการณ์ 4 เดือนย้อนหลังพบการระบาดอย่างต่อเนื่อง ในเดือนพฤษภาคม 2566 ได้รับรายงานผู้ป่วย 22 ราย มิถุนายน 48 ราย กรกฎาคม 80 ราย และเดือนสิงหาคมได้รับรายงานเพิ่มอีก 145 ราย เกือบทั้งหมดเป็นคนไทย และรับเข้าอภัยในประเทศ ในจำนวนนี้มีรายงานพบผู้ป่วยฟิตาชาวนรเสียชีวิต 1 ราย เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการรุนแรงและติดเชื้อจวยโอดาสแทรกซ้อน

ทั้งนี้ ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนยา Tecovirimat (ชื่อการค้า TPOXX) จากองค์การอนามัยโลกให้นำมาใช้ในการฉีดฉีด เป็นยาที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสกลุ่ม Poxvirus เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการมากและแพทย์รับเข้ารักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น

นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริภาว รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ระยะแรกของการแพร่เชื้อฟิตาชาวนรในประเทศไทยกลุ่มเสี่ยงเป็นชายวัยทำงาน แต่ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเริ่มพบเยาวชนติดเชื้อฟิตาชาวนรเพิ่มมากถึง 16 ราย โดยมีรายงานจากทั่วไปบ้านติดเชื้อฟิตาชาวนร กล่องระบาดวิทยา สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีและหน่วยงานในพื้นที่ สอบสวนผู้ป่วยยืนยันฟิตาชาวนร รายหนึ่งเป็นนักเรียนชาย อายุ 16 ปี เริ่มป่วยเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2566 เข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 ด้วยอาการตุ่มน้ำใส่ขึ้นตามร่างกาย ร่วมกับอวัยวะเพศบวมอักเสบ ตรวจพบเชื้อฟิตาชาวนรประวัติเสี่ยง ผู้ป่วยมีเพศสัมพันธ์กับหลายคน ดำเนินการติดตามอาการของผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ซึ่งเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านจนครบ 21 วันนับตั้งแต่วันสัมผัสผู้ป่วยวันสุดท้าย ยังไม่พบผู้ป่วยในครัวเรือน

ดังนั้น ขอเชิญชวนเยาวชนและกลุ่มชายรักชายให้หันมาใช้บริการรักษาที่ไม่ปลอดภัย เช่น ไม่สัมผัสใกล้ชิด เนื้อแนบเนื้อ หรือกอดจูบกับผู้ที่ไม่รู้จัก เวลาที่มีสถานการณ์ผู้ป่วยในไทยเริ่มแพร่ระบาดจากกลุ่มวัยทำงาน วัยรุ่น ไปสู่กลุ่มที่อายุน้อยลงได้แก่เยาวชนวัยเรียนแล้ว ขอให้ตระหนักรู้ว่า เยาวชนต้องป้องกันตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดโรค โดยสังเกตด้วยโรค อาการแสดง และสังเกตดูผิวหนังตามร่างกายของคุณเอง ว่ามีผื่น แบบหรืออุบัติใหม่ ตุ่มน้ำใส่ ตุ่มหนองและตกสะเก็ด มักพบตามอวัยวะเพศรอบทวารหนัก แขน ขา หรือฝ่ามือฝ่าเท้า ลักษณะติดเชื้อฟิตาชาวนร ที่มีลักษณะติดเชื้อฟิตาชาวนร ให้ไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา พร้อมกับแยกตัวออกจากสมาชิกในครอบครัว ที่พัก หรือสถานที่ทำงาน ไม่รับประทานดื่มน้ำด้วยภาชนะร่วมกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ช่วงป่วย การรักษาความสะอาดทำความสะอาดด้วยสเปรย์ผ้าเครื่องนอนเครื่องใช้แยก ใช้สุขาแยก หรือ ทำความสะอาดด้วยการเช็ดน้ำยาทารายการ เชือกกลมสารซักฟอก เช่น ไฮโดรคลอริโน น้ำสบู่ เป็นต้น สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ข้อมูลจาก : กองระบาดวิทยา กองโรคเอดส์ สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 3 กันยายน 2566