

“โรคคอตีบ” ภัยเงียบ

ย้ำ! ผู้ปกครองพาบุตรหลานฉีดวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา เตือนผู้ปกครอง ระวังบุตรหลานป่วยด้วยโรคคอตีบ ณะพาบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนผู้ใหญ่ก็ป่วยได้ ควรฉีดวัคซีนกระตุ้น ทุก ๆ 10 ปี

นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โรคคอตีบ เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย *Corynebacterium diphtheria* ติดต่อกันได้ง่ายผ่านทาง การไอ จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งหรือสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ป่วย นับเป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นเฉียบพลันและร้ายแรง อาการของโรคจะแสดงหลังจากการติดเชื้อประมาณ 2 - 5 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง หนาวสั่น มีน้ำมูก เจ็บคอ คออักเสบ กลืนอาหารลำบาก รู้สึกเจ็บเวลากลืน คอบวม หอบ หายใจลำบาก หากอาการรุนแรงมากอาจทำให้หายใจไม่ออก จนเป็นอันตรายถึงชีวิต หากตรวจคออาจพบแผ่นฝ้าสีขาวปนเทาขึ้นบริเวณลำคอ ต่อมนอนซิล หรือลิ้นไก่ อาจพบ ภาวะแทรกซ้อน เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และเส้นประสาทอักเสบ

นายแพทย์ไกรสร กล่าวเพิ่มว่า การป้องกันนับว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุด โดยการให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ 5 ครั้ง เมื่ออายุ 2, 4, 6 และ 18 เดือน และกระตุ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่ออายุ 4 ปี สำหรับผู้ใหญ่ควรฉีดวัคซีนบาดทะยัก คอตีบ กระตุ้น ทุก ๆ 10 ปี ดังนั้นขอให้ผู้ปกครองนำบุตรหลานไปรับวัคซีนให้ครบตามเวลาที่กำหนด เนื่องจากโรคนี้ เป็นโรคร้ายแรง หากเกิดขึ้นกับเด็กเล็ก และไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้อันตรายถึงชีวิตได้ ผู้ปกครองควรสังเกตอาการของบุตรหลานอย่างใกล้ชิด หากมีอาการดังกล่าวข้างต้น ให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422