

ป่าวเพื่อสั่ง mw ลชน

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทร 02 590 3859 โทรสาร 02 590 3386



กรมควบคุมโรค ชวนป้องกัน “ฝีดาษวานร” พร้อมประเมินความเสี่ยง สังเกตอาการ หากพบ รีบหาหนอรักษาทันที

กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย ยังพบผู้ป่วยเป็นระยะ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคม โดยทั่วไปโรคมีความรุนแรงน้อย แต่จะมีความรุนแรงมากขึ้นในกลุ่มผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ ติดจากการสัมผัสแบบชิดกับผู้ป่วย ผู้ที่มีผื่น ตุ่น หรือหนอง แนะนำป้องกันตัวเอง โดยเฉพาะกิจกรรมที่มีโอกาสสำนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จัก หรือกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมากที่อาจเสี่ยงติดโรคจากการสัมผัสผิวหนังหรือสารคัดหลัง ส่วนโอกาสรับเชื้อจากการพูดคุยกับกลุ่มเป็นระยะเวลานาน เป็นไปได้ค่อนข้างต่ำ

วันนี้ (29 พฤษภาคม 2567) นายแพทย์วีรวัฒน์ โนนสุทธิ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ โฆษณากรควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคฝีดาษวานรในประเทศไทย ตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อรายแรกในเดือนกรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 มีรายงานผู้ป่วยรวม 787 ราย เป็นเพศชาย 768 ราย (ร้อยละ 97) ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เชียงใหม่ ระยอง และอุดรธานี ตามลำดับ ข้อมูลตั้งแต่ต้นปี 2567 ที่ผ่านมา มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นระยะ และเริ่มนี้แนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายน (หลังเทศกาลสงกรานต์) จนถึงเดือนพฤษภาคม จึงต้องเฝ้าระวัง พร้อมป้องกันลดเสี่ยงลดโรค หากประชาชนมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้สูงอายุฝีดาษวานร หรือการสัมผัสใกล้ชิด แบบแน่น กอดจูบ ลูบ คลำ พูดคุยระยะ 1 เมตร โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือเคี้ยวดูแลผู้ป่วยสัมภัยฝีดาษวานร ให้สังเกตอาการตนเองเบื้องต้น ภายหลังสัมผัสผู้ป่วย หรือมีความเสี่ยงภายใน 21 วัน หากมีผื่น มีตุ่นน้ำ ตุ่มหนอง หนองขึ้นบนบริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือบริเวณรอบๆ มือ เท้า หน้าอก ในหน้า ปาก มีไข้ ตุ่มน้ำเหลืองตอบบริเวณหลังหู คอ ขาหนีบให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาล หรือสถานบริการสุขภาพใกล้บ้านทันที เพื่อตรวจหาเชื้อได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย จากนั้นจะทราบผลตรวจอายุใน 1-5 วัน ซึ่งระหว่างรอผลตรวจนั้น แนะนำให้แยกของใช้ส่วนตัว และแยกผ้าที่กับผู้ที่อยู่ร่วมบ้าน ที่พัก หรือ สถานที่ทำงาน ไม่ใช้จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ และของใช้ต่างๆ ร่วมกับผู้อื่น และส่วนหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการส่งต่อเชื้อ เนื่องจากสามารถติดได้จากการสัมผัสใกล้ชิด พร้อมเน้นย้ำถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หรือภูมิคุ้มกันต่ำ หากมีอาการให้รีบพบแพทย์ทันที อย่าชะล่าใจ เนื่องจากมีอาการรุนแรงได้

นายแพทย์วีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ประชาชนทุกคนไม่ควรประมาท โรคฝีดาษวานรติดได้ทุกคน หากมีพฤติกรรมเสี่ยง สามารถป้องกันโรคฝีดาษวานรได้ ดังนี้ 1. หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับคนไม่รู้จัก 2. ไม่ใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้ป่วย เช่น เสื้อผ้า ผ้าขนหนู เครื่องนอน เป็นต้น 3. หลีกเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่มีผื่นสัมภัยฝีดาษวานร 4. ไม่คลุกคลี หรือ สัมผัส ตุ่น หนอง หรือบาดแผลของสัตว์ที่ติดเชื้อ ซากสัตว์ป่า และบริโภคเนื้อสัตว์ปรุงสุก โดยเฉพาะกลุ่มสัตว์ฟันแทะที่นำเข้าหรือมีถิ่นกำเนิดในทวีปแอฟริกา ตอนกลาง เช่น หนูแกมเบียน กระอกดิน 5. หม่นล้างมือบ่อยๆ นอกจากนี้ การหลีกเลี่ยงไปในสถานที่ที่มีกิจกรรมการรวมตัว หรือกิจกรรมพบปะสังสรรค์ ที่อาจเสี่ยงติดโรคฝีดาษวานร ก็เป็นอีกวิธีที่สามารถป้องกันฝีดาษวานรได้ กรมควบคุมโรคห่วงใย อย่างเห็นคนไทยสุขภาพดี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422

ข้อมูลจาก : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์/กองமารดวิทยา/สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567