



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช

Office of Disease Prevention and Control 11, Nakhon Si Thammarat

เลขที่ 478/74 ถ.เทพบุรี ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 0 7534 1151



ข่าวที่ 40 / 2567

“ระวัง!! โรคไขเลือดออก”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 เตือนโรคไขเลือดออก มีแนวโน้มพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีฝนตกในหลายพื้นที่ทำให้เกิดน้ำขังในภาชนะต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย จึงขอเน้นย้ำมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากมีอาการป่วยไม่ชียาลดไข้ในกลุ่มเอ็นเสด (NSAID) เช่น ไอบูโพรเฟน ไทโคลฟีแนค แอสไพริน รวมถึงยาชุด มารับประทานเอง ควรรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว เพื่อรับการตรวจและรักษาที่ถูกต้อง ป้องกันอาการป่วยรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

แพทย์หญิงดารินดา รอชะ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผย สถานการณ์โรคไขเลือดออก ในเขตสุขภาพที่ 11 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 19 กรกฎาคม 2567 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไขเลือดออกสะสม จำนวน 5,853 ราย กลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี รองลงมาคือ 5 - 9 ปี และกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ ภูเก็ต รองลงมาคือ สุราษฎร์ธานี พังงา นครศรีธรรมราช กระบี่ ชุมพร และระนอง ตามลำดับ

แพทย์หญิงดารินดา กล่าวเพิ่มเติม ในช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย มีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไขเลือดออกเพิ่มขึ้น จึงขอความร่วมมือประชาชนให้ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายตามมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ได้แก่ 1) เก็บบ้านให้สะอาด ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในบ้าน ให้มีความเป็นระเบียบ ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง 2) เก็บขยะ บริเวณรอบบ้านไม่ให้เป็นแหล่งวางไข่ยุงลาย และ 3) เก็บน้ำ โดยปิดฝาภาชนะที่ใส่น้ำให้มิดชิด เปลี่ยนน้ำในแจกันทุกสัปดาห์ พร้อมทั้งขัดขอบภาชนะ เพื่อกำจัดไข่ยุงลาย ย้ำอย่าลืมนอนกางมุ้ง ทายากันยุง ป้องกันไขเลือดออก ไขปวดข้อยุงลาย และโรคติดเชื้อไวรัสซิกา

นอกจากนี้ขอความร่วมมือ/ คลินิก/ร้านขายยา หากพบผู้ป่วยสงสัยโรคไขเลือดออก ไม่ให้ยาลดไข้กลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ไอบูโพรเฟน ไทโคลฟีแนค แอสไพริน รวมถึงยาชุด ซึ่งมีผลทำให้เลือดออกในช่องทางเดินอาหารและยากต่อการรักษา เสี่ยงต่อการเสียชีวิต หากอาการไม่ดีขึ้นใน 2 วัน แนะนำผู้ป่วยไปโรงพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง สงสัยโรคไขเลือดออก ได้แก่ มีอาการไข้สูงลอย ร่วมกับอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา หน้าแดง คลื่นไส้ อาเจียน อาจมีผื่นหรือมีจุดเลือดออกที่ลำตัว แขน ขา เป็นต้น ทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422 “กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากรู้เห็นคนไทยมีสุขภาพดี”



กรมควบคุมโรคห่วงใย อยากรู้เห็นคนไทยสุขภาพดี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2567

ผู้เขียนข่าว ธัญญธร เขียวยอด

ผู้ตรวจ

ผู้อนุมัติ