



กำหนดการให้วัคซีน

ตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2568



อายุ	วัคซีนที่ให้	คำแนะนำ	อายุ	วัคซีนที่ให้	คำแนะนำ
แรกเกิด 1 เดือน	HB1 ¹ (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	ควรให้เร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมงหลังคลอด	1 ปี 6 เดือน	DTP4	(วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
	BCG (วัคซีนป้องกันวัณโรค)	ฉีดให้เด็กก่อนออกจากโรงพยาบาล		OPV4	(วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 4)
	HB2 (วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)	เฉพาะรายที่คลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี		MMR2	(วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
	DTP-HB-Hib1 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ชิบ)	การให้วัคซีโนร์ต้าครั้งแรก		LAJE2	(วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเฉื่อยนิดเข้มข้นอ่อนฤทธิ์)
	IPV1 ² (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 1)	ควรให้ก่อนทราบอายุครบ 15 สัปดาห์	2 ปี 6 เดือน 4 ปี	DTP5	(วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน)
	Rota1 (วัคซีนโรต้า)	การให้วัคซีโนร์ต้าครั้งสุดท้าย		OPV5	(วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 5)
	DTP-HB-Hib2	ควรเสริมสิ่งก่อนทราบอายุครบ 32 สัปดาห์ หากข้าว่าที่กำหนดให้ดำเนินการตามคำแนะนำการให้วัคซีนล่าช้า		MMR	(วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน)
	IPV2 (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 2)	การฉีดให้เด็กก่อนทราบอายุครบ 32 สัปดาห์ หากข้าว่าที่กำหนดให้ดำเนินการตามคำแนะนำการให้วัคซีนล่าช้า		HB	(วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี)
	Rota2 (วัคซีนโรต้า)	• กรณีใช้วัคซีน Rotarix ให้เพียง 2 ครั้ง (ไม่ต้องให้ครั้งที่ 3)		LAJE	(วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเฉื่อยนิดเข้มข้นอ่อนฤทธิ์)
	DTP-HB-Hib3 (วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี-ชิบ)	การให้วัคซีโนร์ต้าครั้งสุดท้าย		IPV	(วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด)
6 เดือน	OPV3 ³ (วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ครั้งที่ 3)	ควรเสริมสิ่งก่อนทราบอายุครบ 32 สัปดาห์ หากข้าว่าที่กำหนดให้ดำเนินการตามคำแนะนำการให้วัคซีนล่าช้า		dT	(วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)
	Rota3 (วัคซีนโรต้า)	การให้วัคซีโนร์ต้าครั้งสุดท้าย		OPV	(วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดรับประทาน)
	MMR1	ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด และไม่มีผลเป็นไม่ใช้ในเด็กติดเชื้อไวรัสที่มีอาการของโรคเอดส์	ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 5 ⁴ (หญิง)	BCG	(วัคซีนป้องกันวัณโรค)
9 เดือน	LAJE1 (วัคซีนป้องกันโรคไข้สมองอักเสบเฉื่อยนิดเข้มข้นอ่อนฤทธิ์)	• วัคซีน HPV 2 หรือ 4 สายพันธุ์ ให้ฉีด 2 ครั้ง ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน หรือ วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ฉีด 1 ครั้ง		HPV	(วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกจากเชื้อเอชพีวี)
1 ปี		• วัคซีน HBV 2 หรือ 4 สายพันธุ์ ให้ฉีด 2 ครั้ง ระยะห่างระหว่างเข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน หรือ วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ฉีด 1 ครั้ง	ประถมศึกษาปีที่ 6	dT	(วัคซีนรวมป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก)

กำหนดการให้วัคซีนแก่เด็กที่มารับวัคซีน ไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า



ครั้งที่	ช่วงอายุ 1-6 ปี		ตั้งแต่อายุ 7 ปี ขึ้นไป		ข้อแนะนำ
	เดือนที่	วัคซีน	เดือนที่	วัคซีน	
1	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	DTP-HB-Hib1	0 (เมื่อพบเด็กครั้งแรก)	dT1	
		IPV1		IPV1	ให้วัคซีน IPV 2 ครั้ง ก่อน OPV เมื่อ เพื่อป้องกันการเกิด VAPP และ VDPV Type 2
		MMR1		MMR1	
		BCG		BCG	• ให้ในกรณีที่ไม่มีหลักฐานว่าเคยได้รับเมื่อแรกเกิด และไม่มีผลเป็นไม่ใช้ในเด็กติดเชื้อไวรัสที่มีอาการของโรคเอดส์
2	1	DTP-HB-Hib2	1	HB1	
		IPV2		IPV2	
		LAJE1		LAJE1	
3	2	MMR2*	2	dT2	*กรณีที่เด็กอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ที่ได้รับ MMR2 ให้วัคซีนตามเกณฑ์ปกติ
				MMR2	
				HB2	
4	4	DTP-HB-Hib3	7	HB3	
		OPV3			
5	12	DTP4	12	dt3	
		OPV4		OPV3	
		LAJE2		LAJE2	
		DTP5			หากได้รับวัคซีน DTP4 หรือ OPV4 เมื่ออายุ 4 ปีขึ้นไป ไม่มีความจำเป็นต้องได้รับครั้งที่ 5 (DTP5 หรือ OPV5)
6*	*กรณีเด็กอายุ 4 ปี ขึ้นไป	OPV5			

หมายเหตุ

- กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2568 อ้างอิงตามมติการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 1/2568
- วัคซีนทุกชนิด ถ้าไม่ได้รับตามกำหนด สามารถให้ทันทีเมื่อพบเด็ก
- สำหรับวัคซีนที่ต้องให้มากกว่า 1 ครั้ง หากเกิดมารับวัคซีนรึ่งต่อไปแล้วล้า สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่
- กรณีพบเด็กที่ได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนหรือล่าช้า ให้ติดตามเก็บมารับวัคซีนที่ครบตามกำหนด การให้วัคซีนปกติ ห้ามรีบประท้วงเวลา 1 ปี จนกันให้วัคซีนต่อไปเพื่อความปลอดภัย
- วัคซีนที่ใช้หลอดรีดเพื่อให้เด็กน้ำนมวันนี้ยังคงอยู่ของเด็ก คือ วัคซีน DTP (3 - 5 ครั้ง ขึ้นกับอายุ), MMR (2 ครั้ง), HB (3 ครั้ง), LAJE (2 ครั้ง) และ Hib (3 ครั้ง ในเด็ก < 2 ปี) ควรให้วัคซีนรวม เช่น DTP-HB-Hib แทนการฉีดแยกเสมอ ห้ามกรณีนี้ในประวัติการเคยได้รับก่อน ให้พัจารณ์ให้วัคซีนโดยมีหลักการว่าการให้วัคซีนทุกชนิดมากเกินจำนวนครั้งที่แนะนำไม่มีข้อเสีย และตีกว่าการให้ห้องว่างที่แนะนำ
- การให้วัคซีนเริ่มต้นในกรณีที่เด็กน้ำนมวันนี้ยังคงอยู่ของเด็ก สามารถพิจารณาให้ห้องวัคซีนในเดือนที่ 1 ที่ช่วงอายุระหว่าง 9 - 12 เดือน ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์หรือพยาบาลที่ดูแลเด็ก
- สำหรับเด็กที่ไม่ได้รับวัคซีน MMR เมื่ออายุ 9-12 เดือน ให้ห้องวัคซีนในเดือนที่ 1 ที่ช่วงอายุระหว่าง 9 - 12 เดือน ได้ โดยขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์หรือพยาบาลที่ดูแลเด็ก
- การบริหารจัดการวัคซีน เป็นไปตามจำนวนวัคซีนที่จัดหาได้และจำนวนวัคซีนคงคลังในแต่ละช่วงเวลา

สามารถดาวน์โหลด

กำหนดการให้วัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
ของกระทรวงสาธารณสุข ปี 2568 และข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง
<https://shorturl-ddc.moph.go.th/PluqQO> หรือทาง QR Code

