

ข่าวเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง



กรมควบคุมโรค
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

๒๔/๕๖ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๒๐

โทร. ๐-๒๕๒๑-๐๙๔๓-๕ website : iudc.ddc.moph.go.th

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
แนะนำ 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผู้เลี้ยงนำ
สุนัข แมวไปรับการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



จากสถานการณ์ป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กรม
ควบคุมโรค ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ส.ค. 62 พบ
ผู้เสียชีวิต 2 ราย ในจังหวัด สุรินทร์ และ
นครศรีธรรมราช เนื่องจากไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าอย่างถูกต้อง และจำนวนผู้สัมผัสโรคที่เข้ารับ
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่มขึ้นจาก 294 ราย
ในปี 2561 เป็น 550,481 ราย ในปี 2562 ในขณะที่
กรมปศุสัตว์ รายงานสถานการณ์ปี 2561 มีตัวอย่างส่ง
ตรวจทั้งหมด 9,275 ตัวอย่าง พบผลบวกทั้งหมด 1,469
ตัวอย่าง สัตว์ที่พบได้แก่ สุนัข 1,281 ตัว โค 117 ตัว
แมว 51 ตัว กระบือ 15 ตัว แพะ 2 ตัว ม้า กวาง และ
สุกร ชนิดละ 1 ตัว ส่วนสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าใน
สัตว์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 4 ตุลาคม 2562 มี
48 จังหวัด ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ 27 จุด 13
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สระบุรี นนทบุรี
ฉะเชิงเทรา ระยอง สระแก้ว สุรินทร์ หนองคาย
เพชรบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง และสงขลา

พื้นที่ควบคุมโรค ต้องควบคุมจุดเกิดโรค โดยฉีดวัคซีนให้
สัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัวในรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค
(ข้อมูลจากสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์
กรมปศุสัตว์ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2562)

แพทย์เอก มุ่งอ้อมกลาง ผู้อำนวยการสถาบัน
ป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กล่าวว่า โรคพิษสุนัขบ้าเกิด
จากเชื้อไวรัส คนติดเชื้อจากการถูกสัตว์เลียลูกด้วยนม
กัด ข่วน เลีย หรือน้ำลายเข้าสู่บาดแผล โรคนี้สามารถ
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โดยเมื่อสัมผัสโรคแล้ว ควรล้างแผล
ใส่ยาฆ่าเชื้อ และรีบพบแพทย์เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรค และต้องเข้ารับอย่างต่อเนื่องครบชุด

ยึดหลักป้องกัน ที่ดีที่สุด
“คาถา 5 ย.” เพื่อลดเสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

1. อย่าเหยียบ ให้สัตว์โมโหเพราะอาจจะโดนกัดหรือข่วนได้
2. อย่าเหยียบ บริเวณลำตัว ขา หรือหางของสัตว์
3. อย่าแยก สัตว์ที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
4. อย่าหยิบ จานข้าวหรืออาหารขณะสัตว์กำลังกิน
5. อย่ายุ่ง กับสัตว์ที่ไม่รู้จักหรือคุ้นเคย เพื่อลดความ
เสี่ยงการรับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า

นอกจากนี้การป้องกันโดย เจ้าของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม
ต้องนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เมื่อมี
อายุได้ 2 - 4 เดือน ครั้งแรกฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 1 เดือน
และฉีดซ้ำทุกๆ ปี

**หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน
กรมควบคุมโรค โทร. 1422

