

# ไข้เลือดออก बाटครร้ายใกล้ตัว



หากมีอาการคล้ายไข้หวัด  
มีไข้สูงมากกว่า 2 วัน  
ควรรีบพบแพทย์



## อาการสำคัญ



### ไข้สูง

มีไข้ 39-40° C  
หน้าแดง  
ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก  
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว



### เลือดออก

เลือดกำเดาไหล  
เลือดออกตามไรฟัน  
อาเจียนเป็นเลือด  
ถ่ายดำ  
มีจุดเลือดออกตามตัว



### ภาวะช็อก

อาการต้องเฝ้าระวังหลังจากไข้ลด  
ปวดท้องรุนแรง  
กระสับกระส่าย ซึมลง  
อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด  
มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว

## ห้ามกินยาแอสไพริน หรือ ไอบูโพรเฟน

หากมีไข้สูง มากกว่า 2 วัน  
ควรรีบพบแพทย์



## ไม่ให้ กัด

## ไม่ให้ เกิด

สวมเสื้อผ้ามิดชิด

ติดมุ้งลวด

นอนในมุ้ง

ทาโลชั่นกันยุง

ใช้ไม้ช้อนตุง

ใช้สเปรย์สมุนไพรไล่ยุง

ปิดฝาภาชนะเก็บน้ำ

กำจัดน้ำขัง

ปล่อยปลาในลูกน้ำ

ใส่ทรายอะเบท

ใส่เกลือในถ้วยรอง

ขุดล้างภาชนะ

กำจัดไข่ยุง

3 เก็บ

เก็บบ้าน | เก็บขยะ | เก็บน้ำ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

