

ไขเลือดออก มาตกร้ายใกล้ตัว



ใครที่เสี่ยง

ผู้ที่มีโรคประจำตัว
คนอ้วน มีน้ำหนักตัวมาก
สตรี ช่วงมีประจำเดือน
ผู้ป่วยโรคหัวใจ เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง



อาการสำคัญ

ไข้สูง

มีไข้ 39-40 °C
หน้าแดง
ไม่ไอ ไม่มีน้ำมูก
ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว

เลือดออก

เลือดกำเดาไหล
เลือดออกตามไรฟัน
อาเจียนเป็นเลือด
ถ่ายดำ
มีจุดเลือดออกตามตัว

ภาวะช็อก

อาการต้องเฝ้าระวังหลังจากใช้สลด
ปวดท้องรุนแรง
กระสับกระส่าย ชีพจร
อาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือด
มือเท้าเย็น ชีพจรเบา เร็ว

ห้ามซื้อยากินเอง ห้ามกินยาแอสไพริน หรือ ไอบูโพรเฟน

หากมีไข้สูง มากกว่า 2 วัน
ควรรีบพบแพทย์



หยุด เริ่มต้นที่คุณ



เก็บบ้าน

เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง
เพื่อไม่ให้ยุงลายเกาะพัก

เก็บขยะ

เก็บขยะเศษภาชนะที่อาจ
เปิบแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายได้

เก็บน้ำ

เก็บน้ำให้มิดชิด ปิดฝาภาชนะ
เปลี่ยนน้ำเป็นประจำ ทุกสัปดาห์
ปล่อยปลาหมกยุงกับลูกน้ำ
ภาชนะที่ปิดฝาไม่ดี หรือไม่ได้ใช้ ให้ปล่อยน้ำทิ้ง

ร่วมกันเก็บบ้าน เก็บขยะ เก็บน้ำ และกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากยุงลายต่อเนื่องทุกสัปดาห์

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จ.ขอนแก่น

