



กรมควบคุมโรค
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี

หัดรู้จักไว้

รู้หรือไม่? “โรคหัด”

สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน

วัคซีนป้องกันโรคหัด ผลิตจากเชื้อมีชีวิตชนิดอ่อนฤทธิ์ มี 2 ชนิด คือ วัคซีนรวมป้องกันโรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR) สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี และวัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR) สำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่

บุคคลที่ควรได้รับวัคซีน

เด็กเล็ก :

เด็กทุกคนฉีดวัคซีนรวม
ป้องกันโรคหัด (MMR) 2 ครั้ง
เมื่ออายุ 9-12 เดือน และอายุ 2 ปีครึ่ง



ผู้ใหญ่ : ผู้ที่ไม่เคยป่วยเป็นโรคหัด ผู้ที่ไม่เคยฉีด
หรือไม่ทราบประวัติการฉีดป้องกันโรคหัด แนะนำให้
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัด - หัดเยอรมัน (MR)

ข้อห้าม ในการฉีดวัคซีนป้องกัน โรคหัด - คางทูม - หัดเยอรมัน (MMR)

หญิงวัยเจริญพันธุ์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน ต้องคุมกำเนิด
อย่างน้อย 28 วัน ก่อนการตั้งครรภ์



ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ได้แก่
ผู้ที่รับยาต้านมะเร็งเม็ดเลือดขาว
และยาสเตียรอยด์ ต้องได้รับ
คำแนะนำจากแพทย์ก่อนฉีดวัคซีน



ผู้ที่มีประวัติแพ้ยานีโอไมซิน
(ยาปฏิชีวนะกลุ่มหนึ่ง) และ
ผู้ที่เคยแพ้วัคซีนรุนแรง (Anaphylaxis)

หากพบว่าเด็กฉีดวัคซีนไม่ครบ ตามเกณฑ์ต้องทำอะไร?

ผู้ปกครองสามารถพาบุตรหลาน
ติดต่อขอรับการฉีดวัคซีนได้
ที่สถานบริการสาธารณสุขของรัฐ
ใกล้บ้าน

จัดทำ : พฤศจิกายน 2562