

วัคซีนโรต้า

(สำหรับป้องกันโรคอุจจาระร่วงจากเชื้อไวรัสโรต้าในเด็กเล็ก)



วัคซีนเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ชนิด 5 สายพันธุ์ (G1, G2, G3, G4 และ P1[8])

สำหรับ ?

เด็ก อายุ 2,4 และ 6 เดือน



ให้อย่างไร ?



หยอดเข้าปาก 3 โด๊ส

โดยต้องให้วัคซีนโรต้าโด๊สแรก แก่เด็กอายุไม่เกิน 15 สัปดาห์ และ ให้วัคซีนโรต้าโด๊สสุดท้ายแก่เด็กอายุไม่เกิน 32 สัปดาห์ (แต่ละโด๊สห่างกันอย่างน้อย 4 สัปดาห์)

i การให้วัคซีนโรต้าสลับชนิด

ครั้งที่ 1	ครั้งที่ 2	ครั้งที่ 3
RV5	RV5	RV5
RV1	RV5	RV5
RV1	RV5	RV1
RV5	RV5	RV1
RV5	RV1	RV5
RV5	RV1	RV1

วัคซีนโรต้า 5 สายพันธุ์ และ 1 สายพันธุ์ สามารถให้สลับกันได้ **แต่ต้องให้ครบ 3 ครั้ง**


4 ขั้นตอน การใช้วัคซีนโรต้าชนิด 5 สายพันธุ์



1 ดึงซองบรรจุยาและนำหลอดที่บรรจุยาออกมา



2 ตั้งหลอดบรรจุยาให้อยู่ในแนวตั้ง และเคาะฝาเพื่อไล่ยาที่คาอยู่ที่ปลายหลอด



3 เปิดหลอดบรรจุยาโดยการเคลื่อนไหว 2 ทิศทาง
ขั้นที่ 1 เจาะปลายหลอดยาโดยการหมุนฝาปิดยาตามเข็มนาฬิกาจนแน่น
ขั้นที่ 2 นำฝายออกโดยหมุนฝายกลับทวนเข็มนาฬิกา



4 บริหารยาโดยการบีบน้ำในหลอดยาเข้าสู่ปากทารกอย่างนุ่มนวล โดยบีบยาออกจากหลอดยาจนหมดเข้าที่แก้มด้านใน (อาจยังมียาเหลือได้บ้างที่ปลายหลอดยา)

เก็บวัคซีนโรต้าในตู้เย็นที่อุณหภูมิ +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส ห้ามเก็บในช่องแช่แข็ง ควรเก็บวัคซีนไว้ในกล่องเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกแสง

