

โรคไข้หูดับ

ติดเชื้อสเตรปโตค็อกคัส ซูอิส
(*Streptococcus suis*)




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

สาเหตุ



บริโภคเนื้อหมูที่ติดเชื้อ
ปรุงแบบดิบ หรือสุก ๆ ดิบ ๆ



สัมผัสกับหมูที่ติดเชื้อ
ผ่านทางบาดแผล
รอยขีดข่วนตามร่างกาย
หรือทางเยื่อเมือก

อาการ



ไข้สูง



ปวดศีรษะ



คอแข็งเกร็ง



อาเจียน



ปวดเมื่อย
กล้ามเนื้อ



ถ่ายเหลว




ประสาทหูอักเสบ

ในรายที่มีอาการรุนแรงอาจเสียชีวิตได้

การป้องกัน

- ➔ ไม่กินหมู สุก ๆ ดิบ ๆ
- ➔ ไม่กินหมูที่ป่วย หรือตายจากโรค
- ➔ ควรสวมรองเท้ายุกยาง สวมถุงมือ
รวมถึงสวมเสื้อที่รัดกุมระหว่างทำงาน
- ➔ ล้างมือ ล้างเท้า ล้างตัวให้สะอาด
หลังการสัมผัสหมู



8/11/64

