


11 ความเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบ ซี HCV

- 1 ใช้สารเสพติดวิธีฉีดเข้าเส้น แม้ว่าจะทดลองใช้เพียงแค่ครั้งเดียว
- 2 เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- 3 เคยได้รับเลือด หรือสารเลือด ก่อนปี 2534
- 4 เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ก่อนปี 2534
- 5 เคยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- 6 เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
- 7 เคยมีคู่สมรสเป็นผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี
- 8 เคยสักผิวหนัง เจาะหู ฝังเข็ม ในที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล
- 9 เคยได้รับการฉีดยา หรือผ่าตัดเล็ก ด้วยแพทย์พื้นบ้าน
- 10 เคยถูกเข็มหรือของมีคมตำขณะปฏิบัติหน้าที่
- 11 เคยใช้อุปกรณ์บางชนิดร่วมกับผู้อื่น เช่น แปรงสีฟัน มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ เข็มฉีดยา เป็นต้น

Stages of Liver Disease Leading to Cirrhosis



LIVER DISEASE – SYMPTOMS

