


12 ความเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบ บี HBV

- 1 เกิดก่อน ปี พ.ศ. 2535
- 2 ใช้สารเสพติดวิธีฉีดเข้าเส้น แม้ว่าจะทดลองใช้เพียงแค่ครั้งเดียว
- 3 เป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวี
- 4 เคยได้รับเลือด หรือสารเลือด ก่อนปี 2535
- 5 เคยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ก่อนปี 2535
- 6 เคยมีคนในครอบครัว เช่น คู่สมรส บิดา มารดา เป็นผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ บี
- 7 เคยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
- 8 เคยมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย
- 9 เคยสักผิวหนัง เจาะหู ฝังเข็ม ในที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาล
- 10 เคยได้รับการฉีดยา หรือผ่าตัดเล็ก ด้วยแพทย์พื้นบ้าน
- 11 เคยถูกเข็มหรือของมีคมตำขณะปฏิบัติหน้าที่
- 12 เคยใช้อุปกรณ์บางชนิดร่วมกับผู้อื่น เช่น แปรงสีฟัน มีดโกน กรรไกรตัดเล็บ เข็มฉีดยา เป็นต้น

Stages of Liver Disease Leading to Cirrhosis



LIVER DISEASE – SYMPTOMS

