

กินหมูดิบ

เสียง

ใช้หูดับ



สาเหตุ

1 เกิดจากการกินเนื้อหมู เลือดหมู เครื่องในหมู ผลิตภัณฑ์จากหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ

2 ร่างกายมีบาดแผล และไปสัมผัส หมูที่มีเชื้อ **สเตริฟโตค็อกคัส ซูอิส**



อาการ



มีไข้



ปวดกล้ามเนื้อ



อาเจียน



ประสาทหูอักเสบ
จนหูหนวกถาวร



ในรายที่มีอาการรุนแรง
อาจเสียชีวิต

การป้องกัน



ไม่รับประทานอาหารจากเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์ จากหมูดิบหรือสุกๆ ดิบๆ



เลือกซื้อเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์หมู จากแหล่งที่เชื่อถือได้



หลังสัมผัสเนื้อหมูให้ล้างมือ ด้วยน้ำสบู่ และน้ำสะอาดทุกครั้ง



เมื่อมีแผลที่มือห้ามสัมผัสเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์ จากหมูโดยตรง



ไม่ใช้ชียงและมิดกับเนื้อหมูดิบ และอาหารปรุงสุกร่วมกัน



ในการปรุงเนื้อหมูให้ใช้น้ำต้มเดือด หรือใช้ความร้อนอย่างน้อย ที่ 70 องศาเซลเซียส 10 นาที หรือสังเกตเนื้อหมูที่ปรุงว่า ปราศจากสีแดง

การแนะนำผู้ป่วย

หากมีอาการมีไข้สูง ปวดเมื่อย กล้ามเนื้อร่วมกับประวัติเลี้ยงหมู ช่างหละหมู หรือสัมผัสเนื้อหมู มือเปล่า หรือรับประทานเนื้อ เลือด เครื่องใน หรือผลิตภัณฑ์จาก หมูดิบหรือสุกๆ ดิบๆ ให้รีบไป พบแพทย์ภายใน 3 วัน



Available on the Google play App Store