

แนวทางการดำเนินงานให้บริการ

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565



สำหรับบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุขในหน่วยบริการที่ให้บริการวัคซีน



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



สปสช.

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

คำนำ

ตามที่กรมควบคุมโรค ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้จัดให้มีการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 โดยมีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อลดการป่วย/การตายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนั้นการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่จึงเป็นการลดภาระโรคที่จะเกิดขึ้น ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากจะช่วยลดความรุนแรงของการการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง 2 โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด 19 และยังเป็นการป้องกันและรักษากำลังบุคลากรในการดูแลผู้ป่วย และยังช่วยลดความสับสนในการตรวจคัดกรองภาวะติดเชื้อร่วมระหว่างโรคไข้หวัดใหญ่กับโรคโควิด 19 นั้น

กรมควบคุมโรค จึงได้จัดทำแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 ประกอบด้วย การให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้ในการสื่อสารกับหน่วยบริการในพื้นที่ และเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ปฏิบัติงานในการจัดระบบบริการ กำหนดประชากรกลุ่มเป้าหมายและให้บริการวัคซีนสอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ต่อไป

24 มีนาคม 2565

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

สารบัญ

แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565	หน้า
ที่มาและความสำคัญ	4
1. วัตถุประสงค์	5
2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย	5
3. กำหนดช่วงเวลาการรณรงค์	6
4. เป้าหมายการดำเนินงาน	6
5. การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2564	7
5.1 การเตรียมการก่อนรณรงค์ให้วัคซีน	7
5.2 การปฏิบัติงานในวันรณรงค์	11
5.3 การปฏิบัติงานหลังรณรงค์	15
ภาคผนวก	18
ภาคผนวกที่ 1 ข้อคำถามในการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล	19
ภาคผนวกที่ 2 เอกสารและแบบฟอร์มการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565	23
ภาคผนวกที่ 4 รายชื่อและเบอร์ติดต่อประสานการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	28
ภาคผนวกที่ 5 เอกสารแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565	30

ที่มาและความสำคัญ

ไวรัสไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุที่สำคัญของการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน พบได้บ่อยในประชากรทุกกลุ่มอายุ อาการแสดงมีตั้งแต่อาการใช้น้ำมูกไหลจนถึงภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง เช่น ปอดบวม สมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ตับอักเสบ ฯลฯ พบอัตราป่วยประมาณร้อยละ 10-20 ของประชากรกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง และผู้ที่เป็นโรคอ้วน มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง ซึ่งหากไม่สามารถป้องกันการแพร่ระบาดได้จะทำให้โรงพยาบาลต้องรับภาระในการดูแลผู้ป่วย มีอัตราตายสูงในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และก่อให้เกิดความสูญเสียในด้านเศรษฐกิจด้านการรักษาพยาบาลตามมา

สถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่หลังจากเริ่มให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา อัตราป่วยได้ลดลงทุกปี แต่พบว่าปี 2559 – 2563 เริ่มกลับมามีแนวโน้มที่สูงขึ้น และในปี 2563 พบแนวโน้มผู้ป่วยลดลงเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ด้วยมาตรการการป้องกันการโรคทำให้ส่งผลพบผู้ป่วยลดลง ซึ่งพบผู้ป่วย 122,299 ราย อัตราป่วย 184.15 ต่อประชากรแสนคน ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในเด็กเล็กกลุ่มอายุ 0 - 4 ปี เท่ากับ 898.27 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5 - 14 ปี (อัตราป่วย 481.20 ต่อประชากรแสนคน) และ 15-24 ปี (อัตราป่วย 144.61 ต่อประชากรแสนคน) ตามลำดับ มีรายงานผู้เสียชีวิต 4 ราย อัตราป่วยตายร้อยละ 0.004 และสำหรับปี 2564 มีรายงานผู้ป่วย 10,536 ราย อัตราป่วย 16.22 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยในเด็กเล็กกลุ่มอายุ 0-4 ปี เท่ากับ 132.81 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 5-14 ปี (22.32) และ 15-24 ปี (11.52) ตามลำดับ

ข้อมูลการเฝ้าระวังเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในผู้ป่วยกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ (ILI) และกลุ่มอาการปอดบวมจากโรงพยาบาลเครือข่ายของกรมควบคุมโรคและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 4,183 ราย พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.19 โดยเป็นเชื้อไข้หวัดใหญ่ ชนิด A/H3N2 ทั้ง 8 ราย (ร้อยละ 100) จากสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ข้างต้น พบว่าปี 2564 พบว่าจำนวนผู้ป่วยต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง และต่ำกว่าในปีที่ผ่านมา แต่ยังคงเกิดการระบาดในช่วงต้นปี และพบเหตุการณ์การระบาดในโรงเรียน เรือนจำ สถานที่ทำงาน และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกทั้งขณะนี้ ประเทศไทยประสบกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ซึ่งเกิดการระบาดทุกภูมิภาคทั่วโลกและส่งผลกระทบต่อประเทศไทย นับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่บุคลากรต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและมีภาระงานเพิ่มขึ้นในช่วงดังกล่าว โดยกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้เกิดอาการป่วยรุนแรงและมีโอกาสเสียชีวิตสูง ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เนื่องจากโรคโควิด 19 มีอาการเหมือนกันกับกลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง 2 โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด 19

เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ จึงมีการดำเนินงานตามโครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และประชาชนกลุ่มเสี่ยงลดการป่วย/การตายเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหญิงตั้งครรภ์ ผู้ป่วยเรื้อรัง และผู้สูงอายุ และลดการแพร่กระจายโรคไข้หวัดใหญ่ผ่านบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งอาจทำให้เกิดการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่

1. วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อใช้ในการสื่อสารกับหน่วยบริการในพื้นที่ และเป็นแนวทางให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขได้ปฏิบัติงานในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล และปรับระบบการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
- 2) เพื่อลดความรุนแรงจากการป่วยและการเสียชีวิตเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่ ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย และลดโอกาสแพร่กระจายเชื้อไข้หวัดใหญ่ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย

2. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ดังนี้

- **บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล** ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่
 - 1) แพทย์ พยาบาล และบุคลากรอื่นๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ทำงานในแผนกผู้ป่วยในและแผนกผู้ป่วยนอก รวมถึงนักศึกษาฝึกงานในแต่ละวิชาชีพ
 - 2) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทำหน้าที่ในการสอบสวนควบคุมโรค
 - 3) เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทำลายซากสัตว์ปีกและสัตว์อื่นที่สงสัยติดเชื้อไข้หวัดนก
 - 4) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่

- **ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่** ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่

- 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี)
- 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน (หมายถึง กลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนเต็มจนถึงอายุ 2 ปี 11 เดือน 29 วัน)
- 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
- 4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
- 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ)
- 6) โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)
- 7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

(อ้างอิงตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560)

3. กำหนดช่วงเวลาการรณรงค์

วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565

โดย 3 เดือนแรกเป็นช่วงที่มีการรณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก และ 1 เดือนหลังเป็นช่วงเก็บตก ทั้งนี้ การรณรงค์อาจมีความจำเป็นต้องดำเนินงานนอกเวลาราชการ เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยหลายกลุ่มวัย และมีกลุ่มวัยทำงานด้วย

อย่างไรก็ตาม แต่ละพื้นที่สามารถปรับระยะเวลายืดหยุ่นให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ได้ แต่ไม่ควรทอดระยะเวลาการรณรงค์ให้ยาวเกินไป เนื่องจาก จะทำให้เกิดผลกระทบกับงานสาธารณสุขอื่นๆ

4. เป้าหมายการดำเนินงาน

ผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไขหวัดใหญ่ในกลุ่มเป้าหมาย **ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80**

(เชิง Performance หรือ ผลการปฏิบัติงาน)

5. การดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565

5.1 การเตรียมการก่อนรณรงค์ให้วัคซีน

5.1.1 การเตรียมการในหน่วยงานส่วนกลาง

5.1.1.1 วิธีการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ตามฤดูกาล

1)การจัดสรรวัคซีนในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

1. การกำหนดเป้าหมาย ในระดับเขต สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดย กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคจัดทำข้อมูลเป้าหมาย (โควต้า) บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงในระดับเขต โดยจัดสรรตามสัดส่วนประชากรกลุ่มเสี่ยง เท่ากันทุกเขต และจัดส่ง Template ยอดเป้าหมายและข้อมูลการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 ส่งให้ สปสช.เขต ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

2. การกำหนดเป้าหมาย ในระดับจังหวัด/หน่วยบริการประจำ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (สปสช.เขต) สามารถปรับเปลี่ยนได้ตั้งแต่ระดับจังหวัดจนถึงหน่วยบริการประจำ ภายใต้ยอดจัดสรรรวม (โควต้า) โดยใช้ข้อมูลการให้บริการในปีงบประมาณ 2563 ประกอบการพิจารณาจัดสรร โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

ก. สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต (สปสช.เขต) ประสานงานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) เพื่อจัดสรรเป้าหมายสู่พื้นที่ระดับจังหวัด

ข. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) และหน่วยบริการประจำ กำหนดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเป็น 2 ระดับ คือ ส่วนที่ 1 สสจ.พิจารณากำหนดเป้าหมายวัคซีนให้แก่หน่วยบริการประจำ ภายในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ส่วนที่ 2 หน่วยบริการประจำ (CUP) กำหนดเป้าหมายวัคซีนให้แก่ หน่วยบริการปฐมภูมิ/เครือข่ายหน่วยบริการ (รพ.สต. หรือ ศูนย์สุขภาพชุมชน) ที่เป็นลูกข่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ เมื่อหน่วยบริการประจำ กำหนดสัดส่วนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรเรียบร้อยแล้วให้จัดส่งข้อมูลแก่ สสจ. และสสจ.รวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยบริการประจำจัดส่งแก่ สปสช.เขต ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565

ค. สปสช.เขตแจ้งยืนยันปริมาณการจัดสรรวัคซีนรายหน่วยบริการประจำตามที่ สสจ.พิจารณา (ข้อ ข.) โดยจัดทำเป็น Electronic file (.xls หรือ .xlsx) ส่งมายังกลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค, E-Mail: karistha.k@nhso.go.th ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

2) การจัดสรรวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

1. **กรมควบคุมโรค** คำนวณประมาณจำนวนวัคซีนใช้หวัดใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในแต่ละจังหวัดแยกเป็นรายหน่วยบริการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และส่งข้อมูลให้กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งสำเนาส่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรค สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร

2. **กองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข** การพิจารณาแผนจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ดำเนินการผ่านกลไกของกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข กำกับกับการพิจารณาและตรวจสอบความเหมาะสมของจำนวนวัคซีนใช้หวัดใหญ่ที่จะจัดสรรรายจังหวัด ในภาพรวมของเขตสุขภาพ ตามที่กรมควบคุมโรคได้คำนวณประมาณจำนวนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในแต่ละจังหวัดเป็นรายหน่วยบริการ

3. **สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด** รายงานยืนยันแผนจัดสรรวัคซีน หรือหากต้องการปรับจำนวนจัดสรรวัคซีน สามารถดำเนินการปรับจำนวนวัคซีนในรายหน่วยบริการได้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินจำนวนโควตาของจังหวัดที่ได้รับการจัดสรร โดยผ่านความเห็นชอบแผนจัดสรรวัคซีนจากผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขในเขตสุขภาพ และรายงานผ่านทาง Google Sheet พร้อมทั้งส่งหนังสือยืนยันแผนจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565 สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ไปยังกรมควบคุมโรค ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565

5.1.1.2 การกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

1) การกระจายวัคซีนในประชาชนกลุ่มเสี่ยง

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต ได้จัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ จำนวน 4,400,000 โดส สำหรับฉีดให้กับประชาชนคนไทยที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษา (ไม่รวมบุคลากรทางการแพทย์) โดยกำหนดจัดสรรวัคซีนแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ วัคซีนสำหรับกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีการให้บริการตลอดทั้งปี โดยกำหนดให้หน่วยบริการเบิกวัคซีนผ่านระบบ VMI เป็น Routine จำนวน 200,000 โดส และวัคซีนสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่เหลือ จำนวน 4,200,000 โดส จัดสรรแก่หน่วยบริการในช่วงรณรงค์ (วันที่ 1 พฤษภาคม.- 31 สิงหาคม 2565)

กลุ่มภารกิจสนับสนุนการเข้าถึงบริการปฐมภูมิและการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค จัดส่งเป้าหมายรายหน่วยบริการให้แก่ กองบริหารยาและเวชภัณฑ์ ฝ่ายบริหารการจัดสรรและชดเชยค่าบริการ สายงานบริหารกองทุน ภายในวันที่ 18 มีนาคม 2565 เพื่อกระจายวัคซีนสำหรับช่วงรณรงค์ จำนวน 4.2 ล้านโดส ตามจำนวนวัคซีนที่หน่วยบริการประจำได้รับจัดสรร โดยกำหนดจัดส่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยบริการประจำในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

- งวดแรก : หน่วยบริการประจำจะได้รับวัคซีน ร้อยละ 20 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ภายในเดือน เมษายน 2565 (สำหรับการจัดบริการในเดือน พฤษภาคม 2565)
- งวดที่ 2 : หน่วยบริการประจำจะได้รับวัคซีน ร้อยละ 32 ของวัคซีนที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ภายในเดือนพฤษภาคม 2565 (สำหรับการจัดบริการในเดือน มิถุนายน 2565)
- งวดที่ 3 : หน่วยบริการจะได้รับวัคซีนใช้ขวดใหญ่ที่เหลือจากจำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร (เป้าหมาย) ภายในเดือนมิถุนายน 2565 โดย สปสช.เขต พิจารณาปรับเปลี่ยน ภายในเขต โดยใช้ข้อมูลการเข้ารับบริการของประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ ผลงานการให้บริการจริงประกอบการพิจารณา

หมายเหตุ : กรณีที่หน่วยบริการมีวัคซีนเหลือจากการให้บริการเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 หน่วยบริการ สามารถนำมาให้บริการแก่ประชาชน ในเดือนสิงหาคม 2565

2) การกระจายวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ จำนวน 4 แอสโดส ซึ่งการพิจารณาขอการจัดสรร โดยกรมควบคุมโรค ผ่านกองตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข และดำเนินการจัดหาและกระจาย โดยกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ซึ่งกำหนด จัดส่งวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้หน่วยบริการ 1 รอบ ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2565 ซึ่งจะได้มีการแจ้ง รายละเอียดต่อไป

5.1.2 การเตรียมการในสถานบริการ

5.1.2.1 สํารวจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ข่าย

โรงพยาบาลต้องสำรวจกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อวางแผน ให้วัคซีนตามจำนวนที่ได้รับจัดสรรการมารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ของกลุ่มเป้าหมาย โดยประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อกระตุ้นเชิญชวนประชาชนให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ วัคซีน รวมถึงประโยชน์และภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้จากการฉีดวัคซีน การให้บริการวัคซีนต้องยึดหลัก ความปลอดภัยของประชาชนผู้รับวัคซีนเป็นสำคัญ โดยปรับรูปแบบการให้บริการเข้ากับสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด 19 ขอให้โรงพยาบาลพิจารณาจัดบริการด้วยความยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับสถานะด้านระบบบริการ สาธารณสุข ประชาชนและสถานะแวดล้อมเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ขึ้นกับการบูรณาการในการจัดบริการให้วัคซีนภายใต้ระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System) และ/หรือ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอ (District Health Board: DHB) โดยขอให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการให้บริการวัคซีนอย่างเคร่งครัด

5.1.2.2 วิธีการบริหารจัดการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้ Krungthai Digital Health Platform ผ่าน Application เป๋าตัง (Health Wallet)/Hospital Portal) มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

1) หน่วยบริการประจำ หน่วยบริการปฐมภูมิ และเครือข่ายหน่วยบริการ (รพ.สต.) กำหนดแผนการฉีดวัคซีน ตามกำหนดวันรณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 สิงหาคม 2565 โดยรายชื่อหน่วยบริการที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนจะปรากฏรายชื่อหน่วยบริการใน Application เป๋าตัง ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถโทรติดต่อเพื่อสอบถาม และประสานวันเข้ารับบริการจากหน่วยบริการได้ โดยหน่วยบริการที่ตั้งค่าข้อมูล วัน เวลาและจำนวนที่ให้บริการไว้จะแสดงใน Application เป๋าตัง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการลงทะเบียนจองสิทธิเข้ารับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง สำหรับหน่วยบริการที่ไม่ได้ตั้งค่าข้อมูลดังกล่าว Application เป๋าตัง จะแสดงรายชื่อหน่วยบริการให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงทราบพร้อมเบอร์โทรศัพท์ เพื่อประสานการเข้ารับบริการ

2) การเข้ารับบริการ ประชาชนกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายทุกสิทธิสามารถเข้ารับบริการ (walk-in) ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565 ซึ่งผู้ที่มาขอรับบริการก่อนจะได้สิทธิฉีดวัคซีนก่อน (First Come First Serve) จนกว่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรหมด ทั้งนี้ ประชาชนอาจมีการประสานกับหน่วยบริการก่อนการเข้ารับบริการ เพื่อความสะดวกของการจัดบริการ

5.1.2.3 การจัดเตรียมอุปกรณ์วัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น

1) การเบิกและการรับวัคซีน การเตรียมอุปกรณ์ระบบลูกโซ่ความเย็นให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติปกติ ตามมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

2) การเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการให้บริการวัคซีนในและนอกสถานบริการ ได้แก่ เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยา พลาสเตอร์ กระติกสำหรับใส่วัคซีน สำลี แอลกอฮอล์ ยาแก้ปวดลดไข้ และควรจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Emergency Kits) และส่งต่อได้ภายใน 15 นาที ตามมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

5.1.2.4 การจัดทำแผนปฏิบัติการ

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ขอให้เจ้าหน้าที่จัดทำแผนการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมายโดยกำหนดวัน เวลา สถานที่ให้วัคซีน ระยะเวลาดำเนินการ **ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึง สิงหาคม 2565** โดยขอให้หน่วยบริการจัดทำแผนการรณรงค์แบบเร่งรัดเชิงรุกใน 3 เดือนแรก (1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2565) เป็นช่วงที่มีการรณรงค์แบบเข้มข้นในเชิงรุก และเก็บตกใน 1 เดือนหลัง (1 – 31 สิงหาคม 2565)

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขดำเนินการโดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม และตามแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุข เพื่อการจัดการภาวะโรคระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งจัดทำโดยกระทรวงสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แก่กลุ่มเป้าหมาย

5.2 การปฏิบัติงานในวันรณรงค์

5.2.1 การเตรียมการก่อนให้วัคซีน

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้เพียงพอและพร้อมใช้งาน ได้แก่ วัคซีน อุปกรณ์ฉีดยา อุปกรณ์กักกันเชื้อเบื้องต้น แบบบันทึกข้อมูล แบบคัดกรอง เอกสารแนะนำความรู้ และอื่นๆ

2. จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ขอให้สถานบริการบริหารจัดการช่วงเวลาการให้บริการ จำนวนผู้มารับบริการ การจัดสถานที่ เพื่อลดความแออัดของการมารวมตัวของประชากรจำนวนมาก และยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลเพื่อป้องกันการติดเชื้ออย่างน้อย 1- 2 เมตร และจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่เหมาะสม อาทิ จัดให้มีการคัดกรองผู้มารับบริการ การทำความสะอาดสถานที่ก่อนการให้บริการโดยเฉพาะพื้นผิวสัมผัสที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ การป้องกันตนเอง แนะนำให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มาใช้บริการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์ และเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องการป้องกันตนเองแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอื่นๆ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมทั้งหน่วยบริการที่จัดบริการแบบเคลื่อนที่ให้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน โดยการให้บริการเชิงรุก หรือกระจายการให้บริการในพื้นที่ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการรวมตัวและความแออัดในการให้บริการ โดยจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ หรือทีมเคลื่อนที่เร็วในการให้บริการแก่ประชากรกลุ่มเสี่ยงในบางกลุ่ม หรือบางกรณี เช่น ผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ เป็นต้น

3. เจ้าหน้าที่ผู้ให้วัคซีนควรผ่านการอบรมมีประสบการณ์ในการให้วัคซีน และได้ทบทวนแนวปฏิบัติของโครงการจนเข้าใจดีแล้ว และในการปฏิบัติตัวในสถานการณ์โรคโควิด 19 สำหรับผู้ปฏิบัติงานขอให้สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ควรตรวจสอบอาการป่วยของตนเอง โดยเฉพาะอาการไข้หรือทางเดินหายใจ หากสงสัยให้งดปฏิบัติงาน เมื่อต้องออกปฏิบัติงานในที่ชุมชน ควรเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1-2 เมตร ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ หลังปฏิบัติงานทุกครั้ง และก่อนรับประทานอาหาร และหลังใช้ส้วม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอื่นๆ ที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

5.2.2 ตรวจสอบว่าผู้รับบริการอยู่ในกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ถ้าเป็นกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวแล้ว มีข้อห้ามการให้วัคซีนหรือไม่

ข้อห้ามในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ ได้แก่

- มีประวัติแพ้ไข้วัดใหญ่อย่างรุนแรง**
 - เคยแพ้วัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่รุนแรง หรือแพ้สารประกอบอื่นๆ ในวัคซีนอย่างรุนแรง**
 - กำลังมีไข้หรือกำลังเจ็บป่วยเฉียบพลัน
 - เพิ่งหายจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันมาไม่เกิน 7 วัน
 - เพิ่งมานอนรักษาตัวและออกจากโรงพยาบาลไม่เกิน 14 วัน
 - ยังมีโรคประจำตัวเรื้อรังที่มีอาการกำเริบ เช่น เจ็บแน่นหน้าอก ใจสั่น หอบเหนื่อย หรือยังควบคุมอาการของโรคไม่ได้
 - ขณะตั้งครรภ์นี้มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง เช่น มีภาวะ Toxic goiter, Pre-eclampsia, Eclampsia หรือ เคยมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
- **อาการแพ้อย่างรุนแรง** เช่น หายใจไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจเสียงดัง ลมพิษ ชีตขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะ

ข้อเสนอแนะ

- ให้ผู้รับบริการกรอกข้อมูลในแบบสอบถามผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้วัดใหญ่ ตามฤดูกาลให้ครบถ้วน และให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบซ้ำแล้วเก็บไว้ที่สถานบริการ
- หากผู้รับบริการมีไข้ มีอาการเจ็บป่วยที่อาการไม่น่าพอใจ เป็นผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังที่ไม่สามารถควบคุมอาการได้ หรือกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง/เคยมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนการฉีดวัคซีน
- ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยอื่นๆ ให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการฉีดวัคซีนทุกครั้ง

5.2.3 ชี้แจงให้ผู้รับบริการทราบถึงความจำเป็น ประโยชน์ของการให้วัคซีนและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้และให้ผู้รับบริการพิจารณาตัดสินใจในการรับบริการ

ก่อนการให้บริการต้องแจ้งให้ผู้รับบริการทราบข้อมูลตามเอกสารข้อความรู้เรื่องวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เมื่อได้รับทราบเหตุผลความจำเป็นรวมทั้งภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นแล้ว ให้เวลาผู้รับบริการตัดสินใจในการรับวัคซีนโดยสมัครใจไม่เร่งรัดเวลาในการรับวัคซีน โดยผู้รับบริการอาจมาขอรับวัคซีนภายหลังได้

5.2.4 ฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการรับวัคซีน

วิธีการฉีด

- ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ (Intramuscular route: IM) ในผู้ใหญ่ฉีดที่บริเวณต้นแขนและในเด็กเล็กฉีดที่หน้าขา
- การฉีดวัคซีนให้ปฏิบัติตามมาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคทุกประการ

ขนาดวัคซีน

- ผู้ใหญ่และเด็กอายุ 3 ปีขึ้นไป ฉีดขนาดโดสละ 0.5 ซีซี
- เด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี ฉีดขนาดโดสละ 0.25 ซีซี

จำนวนเข็มที่ฉีด

- เด็กตั้งแต่ 9 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ฉีดจำนวน 1 เข็ม
- เด็กต่ำกว่า 9 ปีที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มาก่อน ในปีแรกต้องฉีดจำนวน 2 เข็ม (ห่างกัน 4 สัปดาห์) และในปีต่อไป ให้ฉีดปีละ 1 เข็มทั้งกรณีที่เป็นวัคซีนสายพันธุ์เดียวกัน หรือเปลี่ยนสายพันธุ์ในวัคซีน (หากในปีแรกได้ฉีดไปเพียง 1 เข็ม ในปีถัดมาให้ฉีด 2 เข็ม จากนั้นจึงฉีดต่อปีละ 1 เข็มตามปกติ)

5.2.5 การดูแลรักษาวัคซีนในขณะที่ให้บริการ

- ควรให้บริการในที่ร่ม
- เก็บวัคซีนในกระติกหรือกล่องโฟมที่มีอุณหภูมิอยู่ในช่วง +2 ถึง +8 องศาเซลเซียส
- วางขวดวัคซีนให้ตั้งตรง
- ห้ามวางขวดวัคซีนสัมผัสกับ Icepack หรือน้ำแข็งโดยตรง
- ห้ามปักเข็มคาขวดวัคซีน ในระหว่างรอบริการ
- กรณีวัคซีนชนิด Multiple Dose หลังเปิดใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 8 ชั่วโมง และกรณีวัคซีนชนิด Single Dose ควรใช้ทันทีหลังเปิด
- เปิดกระติกเท่าที่จำเป็นเท่านั้นและปิดฝาให้สนิท

5.2.6 การเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI)

❖ **นิยามการเฝ้าระวัง “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค” (Adverse Events Following Immunization: AEFI)** หมายถึง เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาจเป็นอาการไม่สบายหรือมีผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการผิดปกติ โดยไม่จำเป็นต้องมีสาเหตุจากการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค อาการส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นภายใน 30 วัน ภายหลังจากการได้รับวัคซีน

❖ **คำแนะนำในการเฝ้าระวัง “เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค”**
ให้ผู้รับวัคซีนพักสังเกตอาการ 30 นาที ภายหลังฉีดวัคซีนในบริเวณที่จัดเตรียมไว้ให้บริการ
เพื่อสังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้ การเกิดผลข้างเคียงที่เป็นเพราะอาการแพ้ที่รุนแรง (Anaphylaxis) มักเกิดขึ้นเร็วภายใน 30 นาทีหลังฉีดวัคซีน หากพบอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีนให้นำเข้าสู่การรักษา และพิจารณาส่งต่อหากเกินศักยภาพของสถานพยาบาล

❖ **อาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่ไม่รุนแรง** หรือผลข้างเคียงที่พบบ่อยจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ พบประมาณร้อยละ 1 – 10 ได้แก่ อาการเฉพาที่ เช่น ปวด บวม แดง เจ็บบริเวณที่ฉีด อาการทั่วไป เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ปวดข้อ มีไข้ต่ำๆ คลื่นไส้ ส่วนใหญ่อาการเหล่านี้ มักหายได้เองภายใน 1 – 3 วัน และสามารถบรรเทาอาการได้ด้วยการประคบเย็นบริเวณที่ฉีด หรือรับประทานยาแก้ปวดลดไข้ (เช่น พาราเซตามอล) เพื่อบรรเทาอาการปวดและลดไข้ได้

❖ **อาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่รุนแรง** หรือผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายจากการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เป็นอาการที่พบได้ยากและพบได้น้อยมาก ได้แก่

- **อาการแพ้อย่างรุนแรง (Anaphylaxis)** มักจะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาทีถึง 2 – 3 ชั่วโมงหลังจากได้รับวัคซีน อาการที่สังเกต ได้แก่ มีผื่นลมพิษขึ้นตามตัว คันที่ผิวหนัง บวมรอบดวงตาหรือริมฝีปากหรือตามหน้าและลำคอ หายใจลำบากหรือหายใจไม่ออก วิงเวียน ใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เป็นลม เหงื่อออกมาก ชีพจรเบา ช็อก เป็นต้น
- **อาการทางระบบประสาทและสมอง** มีรายงานแต่เกิดได้น้อยมาก ประมาณ 1 ในล้าน ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรง (Guillain - Barré syndrome : GBS) ปากเบี้ยวหน้าเบี้ยว (Bell's palsy) อาการตัวอ่อน (Hypotonic hyporesponsive episode: HHE) เป็นต้น

หากเกิดอาการดังต่อไปนี้ ควรพบแพทย์หรือผู้ให้บริการทราบ เพื่อประเมินอาการทันที

❖ การแจ้งให้ผู้รับวัคซีนทราบสถานที่และวิธีติดต่อสถานบริการ

ผู้ให้บริการควรแจ้งสถานที่และวิธีการติดต่อสถานบริการในกรณีที่ผู้รับบริการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ภายหลังได้รับวัคซีนใน 30 วัน และในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานผ่านระบบ AEFI System DDC (<https://eventbased-doe.moph.go.th/aeifi/>) และสอบสวนเหตุการณ์ตามแนวทางที่กองระบาดวิทยากำหนด รวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นตามสมควรและทันที่

5.2.7 การให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด 19

เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 ในระหว่างการรณรงค์ให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อาจจะมีการให้บริการวัคซีนโควิด 19 ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยคณะกรรมการส่งเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้มีคำแนะนำให้สามารถให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้ (ที่แขนคนละข้าง)

ทั้งนี้การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในช่วงการระบาดของโรคโควิด 19 นอกจากจะช่วยลดความรุนแรงของการป่วยและการเสียชีวิตจากโรคแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นจากการติดเชื้อของทั้ง 2 โรค และลดอัตราการนอนโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรคโควิด 19

5.3 การปฏิบัติงานหลังรณรงค์

5.3.1 ติดตามผลการรณรงค์

5.3.1.1 หน่วยบริการบันทึกผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ดังนี้

1) สถานบริการภาครัฐแต่ละแห่งในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้รายงานผลการให้บริการวัคซีนรายบุคคลผ่านฐานข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) ในแฟ้มงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (EPI) ทุกราย โดยควรตรวจสอบรหัสวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ใช้ในการบันทึกและการส่งออกข้อมูลให้ตรงกับรหัสวัคซีนในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

- รหัสวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ที่จัดสรรโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ใช้เลขรหัสวัคซีน 815 และใช้รหัส ICD-10-TM ให้ใช้ Z25.1
- รหัสวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่จัดสรรโดยสำนักงานประกันสังคม ใช้รหัสวัคซีน 817 ใช้รหัส ICD-10-TM CODE Z25.1
- รหัสวัคซีนกรณีอื่นๆ ได้แก่ วัคซีนที่หน่วยบริการจัดซื้อและบริหารจัดการเองทั้งในภาครัฐหรือเอกชน ใช้รหัสวัคซีน 818 ใช้รหัส ICD-10-TM CODE Z25.1

สำหรับรหัสวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จัดสรรโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดำเนินการปรับรหัสข้อมูลวัคซีน และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

และอาจพิจารณابันทึกเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action> และหากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบไปรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ณ สถานบริการอื่น ขอให้ติดตามวันที่ได้รับวัคซีนมาบันทึกในฐานข้อมูลที่เป็นารได้รับวัคซีนจากสถานบริการอื่น เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและติดตามการได้รับวัคซีนภายในเดือนกันยายน 2565

2) หน่วยบริการ/สถานบริการ ภาครัฐ นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการเอกชน
ในระบบ UC ขอให้รายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2564 รายบุคคล ผ่านโปรแกรม OP/PP Individual Records (<http://op.nhso.go.th/op/>) ดังนี้

- รหัสวัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง ใช้เลขรหัสวัคซีน 815 และใช้รหัส ICD-10-TM ให้ใช้ Z25.1
- รหัสวัคซีนสำหรับผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่จัดสรรโดยสำนักงานประกันสังคม ใช้รหัสวัคซีน 817 ใช้รหัส ICD-10-TM CODE Z25.1
- รหัสวัคซีนกรณีอื่นๆ ได้แก่ วัคซีนที่หน่วยบริการจัดซื้อและบริหารจัดการเองทั้งในภาครัฐหรือเอกชน ใช้รหัสวัคซีน 818 ใช้รหัส ICD-10-TM CODE Z25.1

สำหรับรหัสวัคซีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จัดสรรโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อยู่ระหว่างดำเนินการปรับรหัสข้อมูลวัคซีน และจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูลด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (43 แฟ้ม) หรือในโปรแกรมโครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ <http://ucapps2.nhso.go.th/influenzaibatis/FrmLogin.action> ภายในเดือนกันยายน 2565

3) หน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร ได้แก่ หน่วยบริการ/สถานบริการ/ศูนย์บริการ ภาครัฐและเอกชน ในระบบ UC ทุกแห่ง ในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 13 กรุงเทพฯ ทุกแห่ง ขอให้รายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 รายบุคคล ในโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค BPPDS (Bangkok Promotion & Prevention Data System) ภายในเดือนกันยายน 2565

5.3.1.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/กรุงเทพมหานคร รายงานการให้บริการในภาพรวมผ่านระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU)

การให้บริการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง และบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหน่วยบริการรายงานผลการให้บริการภายใต้การกำกับของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เขตสุขภาพ และกองตรวจราชการเขตสุขภาพ และภายหลังให้วัคซีนเสร็จสิ้น ขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวบรวมข้อมูลผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 แบบสรุปผลรวม (Summary Records) รายละเอียดตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 2 ของหน่วยบริการ/สถานบริการทุกแห่งภาครัฐ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยบริการเอกชนในระบบ UC และกรณีพื้นที่กรุงเทพมหานคร ขอให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง รวบรวมข้อมูลผลการให้บริการของสำนักอนามัย สำนักการแพทย์ และหน่วยบริการในกรุงเทพมหานครที่อยู่ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งรายงานผ่านระบบรายงานการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (DDC FLU) ของกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน กรมควบคุมโรค <http://ddc.moph.go.th/dvp/> หรือ <http://vflu.ddc.moph.go.th/index.php> ภายในเดือนกันยายน 2564

2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองกำกับติดตามรายงานผลในระบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบผ่านทางเว็บไซต์กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน <http://ddc.moph.go.th/dvp/> หรือ <http://vflu.ddc.moph.go.th/index.php> รวมทั้งสรุปรายงานดังกล่าวส่งไปยังกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ตามแบบฟอร์มในภาคผนวกที่ 2 แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข และในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ภายในเดือนกันยายน 2564

3) กรมควบคุมโรค สรุปผลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี และแจ้งกลับไปยังกองตรวจราชการเขตสุขภาพ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

5.3.2 การติดตามให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่ให้บริการควรตรวจสอบประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีรายชื่อตามทะเบียนกลุ่มเป้าหมายที่สำรวจในพื้นที่และยังไม่ได้รับบริการ วางแผนติดตามและดำเนินการเก็บตกให้วัคซีนภายใน 1 เดือน หลังช่วงที่มีการให้บริการแบบเข้มข้น หรือตามแผนปฏิบัติการของแต่ละพื้นที่

5.3.4 การสนับสนุนค่าการจัดบริการวัคซีน

การสนับสนุนค่าการจัดบริการวัคซีน ปี 2565 มีหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายตามแนวทางการบริหารการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ปี 2565 ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยการบริหารงบค่าการจัดการและค่าชดเชยบริการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เหมารวมอยู่ในงบบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับบริการพื้นฐานที่จัดสรรให้หน่วยบริการ ส่วนหน่วยบริการในความรับผิดชอบของ สปสช.เขต 13 กทม. การจ่ายงบค่าการจัดการและค่าชดเชยบริการให้เป็นไปตามที่ สปสช.เขต 13 กำหนด

ภาคผนวก

ภาคผนวกที่ 1 ข้อคำถามในการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

Q: เป้าหมายกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

A: กลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกอบด้วย

- บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ควรได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้รับการจัดสรรวัคซีนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) และโรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กิโลกรัม หรือ BMI >35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร)

และในปี 2565 มีการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเพิ่มเติม โดยสำนักงานประกันสังคมได้จัดให้มีการบริการในกลุ่มผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป (ทั้งที่มีโรคประจำตัวและไม่มีโรคประจำตัว) โดยสำนักงานประกันสังคมเป็นผู้รับผิดชอบ จะจ่ายค่าบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้แก่สถานพยาบาล/หน่วยบริการ เป็นผู้จัดซื้อวัคซีน เพื่อให้บริการกลุ่มเป้าหมาย

Q: สายพันธุ์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

A: เชื้อสายพันธุ์วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่จะมีความแตกต่างกันในแต่ละปี โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) จะเป็นผู้กำหนดสายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่จะนำมาผลิตวัคซีน โดยวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในช่วงรณรงค์สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงปี 2565 ใช้วัคซีน 3 สายพันธุ์ ดังนี้

Egg-based Vaccines

- an A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
- an A/Darwin/9/2021 (H3N2)-like virus; and
- a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus.

หรือ Cell- or recombinant-based Vaccines

- an A/Wisconsin/588/2019 (H1N1)pdm09-like virus;
- an A/Darwin/6/2021 (H3N2)-like virus; and
- a B/Austria/1359417/2021 (B/Victoria lineage)-like virus

และสำหรับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข แบบ 4 สายพันธุ์ จะมีสายพันธุ์เพิ่มเติม 1 สายพันธุ์ ได้แก่ a B/Phuket/3073/2013 (B/Yamagata lineage)-like virus. โดยสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลก <https://www.who.int/> หรือ <https://www.who.int/publications/m/item/recommended-composition-of-influenza-virus-vaccines-for-use-in-the-2022-southern-hemisphere-influenza-season>

Q: วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยเพียงใด โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์

A: มีการใช้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มานานหลายทศวรรษ และมีการศึกษาหลายการศึกษาที่แสดงว่าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยสูง เช่น ข้อมูลในสหรัฐอเมริกา ภายหลังจากการติดตามผู้ที่ได้รับวัคซีนภายหลังวัคซีนขึ้นทะเบียนเป็นเวลา 15 ปี พบว่ามีการใช้วัคซีนในประชาชนมากกว่า 750 ล้านโดส และผลการติดตามด้านความปลอดภัยยังคงยืนยันยืนยันความปลอดภัยของวัคซีนได้ดี และในหลายประเทศ มีการฉีดวัคซีนอย่างแพร่หลายตามห้างสรรพสินค้าทั่วไป

สำหรับข้อมูลความปลอดภัยในหญิงตั้งครรภ์เช่นเดียวกัน ถือว่ามีความปลอดภัยสูง จากการศึกษาในสหรัฐอเมริกา บังคลาเทศ และอีกหลายประเทศ ให้ผลการศึกษาสอดคล้องกันว่าสามารถให้วัคซีนชนิดนี้แก่หญิงตั้งครรภ์ได้อย่างปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อทารกในครรภ์ (วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่มีความปลอดภัยสูงใกล้เคียงกับวัคซีน dT หรือ TT ที่ให้บริการปกติในหญิงตั้งครรภ์) และข้อมูลในประเทศไทย ยังไม่มีรายงานอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนที่รุนแรง ทั้งนี้ สอดคล้องกับข้อมูลขององค์การอนามัยโลกที่แนะนำให้หญิงตั้งครรภ์เป็นกลุ่มที่อยู่ในลำดับความสำคัญสูงสุดที่ควรได้รับวัคซีนและรับรองว่าวัคซีนชนิดนี้มีความปลอดภัยสูง โดยองค์การอนามัยโลกได้แนะนำให้บริการแก่หญิงตั้งครรภ์ได้ทุกอายุครรภ์ รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง หรือเคยมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์

Q: การให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์จะได้รับประโยชน์ในด้านใดบ้าง

A: หญิงตั้งครรภ์

- ช่วยป้องกันโรคในหญิงตั้งครรภ์ (ประสิทธิภาพร้อยละ 70 ถึง 90) และป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากการติดเชื้อและเสียชีวิตซึ่งสูงกว่าคนปกติถึง 4-16 เท่า
- ภูมิคุ้มกันจากแม่สามารถถ่ายทอดไปยังทารก ทำให้ทารกหลังคลอดที่มีอายุต่ำกว่า 6 เดือน มีภูมิคุ้มกันและมีโอกาสป่วยน้อยลง

Q: หากฉีดวัคซีนไปแล้ว มารู้อีกภายหลังว่าตั้งครรภ์ จะเกิดผลเสียอย่างไร

A: การตั้งครรภ์ไม่เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนสามารถให้ได้ในหญิงตั้งครรภ์ทุกอายุครรภ์ แต่ในประเทศไทยแนะนำให้วัคซีนแก่หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป เพราะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรครุนแรงหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ช่วงครรภ์แรก (ยกเว้นกรณีมีการระบาดสามารถฉีดได้ทุกอายุครรภ์)

Q: ฉีดวัคซีนไปแล้ว สามารถให้นมบุตรได้หรือไม่

A: สามารถให้นมบุตรได้

Q: เด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ยังไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ หากมีโรคประจำตัวที่ทำให้เสี่ยงต่อการป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่อย่างรุนแรง เช่น เป็นโรคปอด โรคหัวใจ จะทำอย่างไร

A: เด็กเล็กมีโอกาสเป็นโรคไข้หวัดใหญ่ที่รุนแรงมากได้ แต่วัคซีนยังไม่มี การรับรองให้ใช้ในเด็กอายุต่ำกว่า 6 เดือน ดังนั้นการป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่สำคัญในกลุ่มนี้ คือ การตัดโอกาสที่เด็กจะได้รับเชื้อ เช่น การแยกเลี้ยงเด็ก ไม่พาไปคลุกคลีกับคนหมู่มาก ระวังรักษาสุขอนามัยของผู้เลี้ยงดู การฉีดวัคซีนในผู้เลี้ยงดู และผู้ใหญ่ทุกคนในบ้าน นอกจากนี้พบว่าหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับวัคซีน (ตั้งแต่อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป) ภูมิคุ้มกันจากแม่สามารถถ่ายทอดสู่ทารกในครรภ์และปกป้องลูกหลังคลอดประมาณ 6 เดือน

Q: เด็กที่แข็งแรงดี และอายุมากกว่า 2 ปี ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่กระทรวงฯ จัดหาวัคซีนให้ ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่หรือไม่

A: การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมา มักเริ่มมาจากการระบาดในโรงเรียน แล้วนำเชื้อไปแพร่ต่อในครอบครัวและชุมชน ดังนั้น การป้องกันเด็กวัยเรียนทุกคนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ จะช่วยลดการระบาดในชุมชนได้ด้วย แต่เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีงบประมาณจำกัดเพื่อจัดหาวัคซีนนี้ให้กับประชาชนทุกกลุ่มอายุ จึงกำหนดให้กลุ่มที่มีโอกาสเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อไข้หวัดใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

สำหรับเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ซึ่งไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงฯ จัดหาวัคซีนให้หากผู้ปกครองสามารถซื้อวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้แก่บุตรหลานได้ก็จะเป็นผลดีทั้งกับตัวเด็กเองและบุคคลในครอบครัวตลอดจนชุมชนที่อยู่อาศัย วัคซีนนี้มีประสิทธิภาพดี และมีความปลอดภัย ในเด็กที่แข็งแรงดี สามารถฉีดวัคซีนได้ตลอดปี แต่ช่วงที่ได้ประโยชน์ดีที่สุดคือช่วงก่อนเข้าหน้าฝน หรือก่อนเข้าหน้าหนาว โดยควรฉีดก่อนที่จะเปิดภาคเรียน

Q: ถ้าเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีที่ผ่านมาแล้ว จำเป็นต้องฉีดวัคซีนนี้ซ้ำในปีนี้อีกหรือไม่ เพราะอะไร

A: ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีที่ผ่านมาแล้ว ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีนนี้ซ้ำ เนื่องจาก

- ภูมิคุ้มกันโรคจากการฉีดวัคซีน จะลดต่ำลงตามธรรมชาติหลังจาก 1 ปี ไปแล้ว ซึ่งอาจจะทำให้ปกป้องร่างกายจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ไม่ได้
- กลุ่มเป้าหมายที่กำหนด เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ จึงควรได้รับการฉีดวัคซีนซ้ำ
- จากผลการศึกษาเมื่อปี 2556 พบว่า กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มี Seroconversion rate ต่อโรคไข้หวัดใหญ่ 2009 ชนิด A (H1N1) ประมาณร้อยละ 60 - 70 การให้วัคซีนซ้ำในกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับวัคซีนจะช่วยกระตุ้นระดับภูมิคุ้มกันให้สูงขึ้น

Q: ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปีที่ผ่านมา และเคยมีอาการไข้ ปวดบริเวณที่ฉีด หรือผื่นคันเป็นลมพิษหลังฉีด จะสามารถฉีดซ้ำในปีนี้ได้หรือไม่ ถ้าฉีดวัคซีนซ้ำจะมีอาการดังกล่าวรุนแรงมากขึ้นหรือไม่

A: สามารถฉีดซ้ำได้ เพราะอาการไข้และปวดบวมบริเวณที่ฉีดเป็นอาการไม่รุนแรงที่พบได้ และไม่ได้เป็นข้อห้ามในการฉีดวัคซีนดังกล่าว นอกจากนี้ความรุนแรงของอาการที่พบไม่มีความสัมพันธ์กับจำนวนครั้งที่ฉีด การฉีดซ้ำในปีต่อมาไม่ได้ทำให้ผลข้างเคียงมีมากขึ้น อาการไม่พึงประสงค์ดังกล่าวสามารถป้องกันได้โดยการรับประทานยาพาราเซตามอลหลังได้รับวัคซีน

ส่วนอาการลมพิษ หรืออาการรุนแรงหายใจไม่ออก ที่เกิดขึ้นรวดเร็วภายใน 1 ชั่วโมงหลังฉีดเข็มก่อน ถือเป็นอาการที่เข้าข่ายแพ้รุนแรง และไม่ควรฉีดวัคซีนซ้ำ แต่หากเป็นผื่นหรือลมพิษที่เกิดภายหลังฉีดเป็นเวลานานหลายชั่วโมงหรือเป็นวันมักไม่รุนแรง สามารถให้ฉีดวัคซีนซ้ำได้ อย่างไรก็ตามต้องเฝ้าสังเกตอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที และเมื่อกลับบ้านจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างน้อย 2 วัน เจ้าหน้าที่ควรสอบถามอาการเหล่านี้ก่อนฉีดวัคซีน เพื่อจะได้เฝ้าสังเกตอาการใกล้ชิด

ภาคผนวกที่ 2 เอกสารและแบบฟอร์มการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาล ปี 2564

1. เอกสารในการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับบุคลากรและประชาชนกลุ่มเสี่ยง

1.1 เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่



เอกสารแนะนำความรู้เกี่ยวกับวัคซีนสำหรับประชาชน ไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ด้วย “วัคซีน”

โรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร
ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
อินฟลูเอนซ่า ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆ ในหน้าฝน
และหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็น
สายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรงได้

การติดต่อ
โรคไข้หวัดใหญ่สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ทางการหายใจ ไอ จาม

อาการของโรคไข้หวัดใหญ่
อาการโดยทั่วไปจะคล้ายไข้หวัดจากเชื้ออื่น ๆ ทั่วไป แต่มี
โอกาสที่จะมีอาการรุนแรง มีไข้ และเกิดโรคแทรกซ้อนได้มากกว่า ผู้ป่วย
จะมีน้ำมูกไหล ไอ เจ็บคอ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดเมื่อยตามตัว
โดยทั่วไปจะมีอาการ 2-3 วัน แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรง เช่น
ปอดบวม และจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล หลังจากหาย
อาจมีอาการอ่อนเพลียมีนงงไปอีกหลายสัปดาห์

วัคซีนไข้หวัดใหญ่...กับเรื่องที่เราควรรู้
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่คืออะไร
วัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นวัคซีนชนิดฉีด ผลผลิตจากเชื้อที่ตายแล้ว
โดยผ่านกระบวนการผลิตที่มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูง
ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ แต่ผู้ฉีดวัคซีนแล้วยังอาจเป็นไข้หวัดใหญ่ได้
แต่อาการจะน้อยลง วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ไม่ป้องกันไข้หวัดทั่วไปที่เกิด
จากเชื้ออื่น ๆ

ใครควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
กลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการฉีดวัคซีน
ประกอบด้วย

- บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
- หญิงมีครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป
- เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง คือ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ
หลอดเลือดสมอง ไตวาย มะเร็งที่กำลังให้เคมีบำบัด
เบาหวาน
- บุคคลที่มีอายุ 65 ปี ขึ้นไป
- ผู้พิการทางสมองช่วยตัวเองไม่ได้
- โรคธาลัสซีเมีย ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมถึงผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ที่มีอาการ)
- ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือ BMI ตั้งแต่ 35 kg/m²

ควรฉีดวัคซีนเมื่อไร
วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดได้ตลอดปี แต่ช่วงเวลาที่เหมาะสม
คือ ก่อนฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) และก่อนฤดูหนาว (เดือนตุลาคม)
เนื่องจากเป็นช่วงที่เริ่มมีการระบาด

“วัคซีน” ต้องฉีดซ้ำหรือไม่
วัคซีนนี้ต้องฉีดซ้ำทุก 1 ปี ถ้าต้องการป้องกันอย่างต่อเนื่อง
สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 9 ปี ที่รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นปีแรก
ควรได้รับ 2 เข็ม โดยเข็มที่ 2 ห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์

สังเกตอาการข้างเคียง
วัคซีนทุกชนิดสามารถทำให้เกิดอาการข้างเคียงได้ สำหรับ
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่อาจมีอาการบวมแดงบริเวณที่ฉีด มีไข้
ปวดเมื่อย มักจะเริ่มไม่นานหลังฉีด อาการดังกล่าวควรหายภายใน 1-2 วัน
การแพ้ถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิตมีน้อยมาก ถ้าหากเกิดขึ้นจะปรากฏ
ภายใน 2 -3 นาที ถึง 2-3 ชั่วโมงหลังฉีด โดยอาจมีอาการหายใจ
ไม่สะดวก เสียงแหบ หรือหายใจมีเสียงดัง ลมพิษ ชีตขาว อ่อนเพลีย หัวใจ
เต้นเร็ว วิงเวียนศีรษะ หน้ามืด เป็นลม หหมดสติ

การดูแลรักษาอาการข้างเคียง หากปวด บวมบริเวณที่ฉีด
ให้ประคบด้วยผ้าเย็น หากมีไข้ให้รับประทานยาลดไข้ในขนาดที่เหมาะสม
หากมีอาการรุนแรง หรือเป็นมาก ควรปรึกษาแพทย์ทันที และแจ้งอาการ
ให้ทราบโดยละเอียด

ฉีดวัคซีนแล้วเกิดอาการข้างเคียงอย่างไร
หลังรับการฉีดวัคซีนควรเฝ้าระวังสังเกตอาการข้างเคียงในสถาน
พยาบาลอย่างน้อย 30 นาที เมื่อกลับบ้าน ควรเฝ้าดูต่อไปอีก 2 วัน
หากมีอาการข้างเคียง ควรแจ้งให้แพทย์ทราบทุกครั้งก่อนรับการฉีดวัคซีน
ครั้งต่อไป

**ใครไม่ควรฉีดวัคซีนหรือควรเลื่อนการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่**

- เด็กอายุน้อยกว่า 6 เดือน
- คนที่มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง เพราะวัคซีนผลิตในไข่ไก่
- ผู้ที่เคยฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วมีอาการแพ้อย่างรุนแรง
- หากมีไข้หรือเจ็บป่วยเฉียบพลัน หรือโรคประจำตัวมี
อาการกำเริบ ควบคุมไม่ได้ ควรเลื่อนการรับวัคซีนไปก่อน

กรณีเป็นหวัดเล็กน้อย ไม่มีไข้ สามารถรับการฉีดวัคซีนได้

โรคไข้หวัดใหญ่ ป้องกันได้ ด้วยตัวเอง
โรคไข้หวัดใหญ่สามารถป้องกันได้ด้วย

- รักษาร่างกายให้แข็งแรง และอบอุ่น
- ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำและสบู่ เป็นประจำ
- เครื่องใช้ส่วนตัวไม่ควรใช้ปะปนกับผู้อื่น
- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนแออัด
- ไม่คลุกคลี หรือนอนร่วมกับผู้ป่วยในะยะที่มีอาการ
ของโรค
- ในกลุ่มเสี่ยงสูงควรรับการฉีดวัคซีนตามกำหนดเวลาที่แพทย์
แนะนำเสมอ ในกรณีที่ไม่สามารถมารับการฉีดวัคซีนได้
ตามที่กำหนด ควรรับมารับการฉีดทันทีที่ทำได้



สปสข.
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ



กระทรวงสาธารณสุข
Ministry of Public Health

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ด้วยความห่วงใยในสุขภาพประชาชน จากกระทรวงสาธารณสุข

1.2 แบบสอบถามผู้มารับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่



แบบสอบถามผู้มารับบริการ วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล



(สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้คัดกรองผู้มารับบริการก่อนให้วัคซีน
และโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ)

ชื่อผู้มารับวัคซีน.....

นามสกุล.....

เลขประจำตัว 13 หลัก.....

โรคประจำตัว.....

ที่อยู่.....

.....

.....

.....

เบอร์โทรศัพท์.....

วันที่รับวัคซีน.....

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล

เป็นวัคซีนเชื้อตาย ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่
ตามฤดูกาล ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ฉีดใน
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย
รุนแรงหรือมีภาวะแทรกซ้อนหากติดเชื้อ

การฉีดวัคซีนนี้เป็นไปตามความสมัครใจของท่าน

โดยมีบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ดูแลตรวจสภาพร่างกาย
ก่อนฉีด และให้รอเฝ้าดูอาการแพ้ภายหลังการฉีดเป็นเวลา
30 นาที เมื่อกลับบ้านแล้วควรมีผู้ดูแลหลังฉีดวัคซีนต่อ
อีก 2 วัน

**หากท่านเคยแพ้วัคซีนอื่นๆ หรือยาอื่นๆ อย่างรุนแรง
ขอให้ท่านแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อประเมินความเสี่ยง
อีกครั้งก่อนให้วัคซีน**

กรุณากำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง []

ตามความเป็นจริงเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้พิจารณาว่า
ท่านสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่

- มีประวัติแพ้ไข่ไก่อย่างรุนแรง* [] ใช่ [] ไม่ใช่
- เคยแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ หรือ [] ใช่ [] ไม่ใช่
แพ้สารประกอบอื่นๆ ในวัคซีน
อย่างรุนแรง*
- กำลังมีไข้ หรือกำลังเจ็บป่วย [] ใช่ [] ไม่ใช่
เฉียบพลัน
- เพิ่งหายจากการเจ็บป่วย [] ใช่ [] ไม่ใช่
เฉียบพลันมาไม่เกิน 7 วัน
- เพิ่งมานอนรักษาตัวและออกจาก [] ใช่ [] ไม่ใช่
โรงพยาบาล ไม่เกิน 14 วัน
- ยังมีโรคประจำตัวที่อาการกำเริบ [] ใช่ [] ไม่ใช่
เช่น ใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก หอบ
เหนื่อย หรือยังควบคุมอาการ
ของโรคไม่ได้
- ขณะตั้งครรภ์นี้มีภาวะครรภ์เสี่ยงสูง [] ใช่ [] ไม่ใช่
เช่น มีภาวะ Toxic goiter,
pre-eclampsia, eclampsia หรือ
เคยมีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์
(หากมีความประสงค์จะรับวัคซีน
ให้ปรึกษาแพทย์ที่ดูแล)

[] ท่านได้รับข้อมูลเกี่ยวกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และได้ทำความเข้าใจแล้ว

ลงชื่อ.....

()



* อาการแพ้อย่างรุนแรง เช่น หายใจไม่สะดวก ผื่นขึ้น หายใจลำบาก หรือมีอาการแพ้รุนแรง
ลมพิษ ชีตขาว อ่อนเพลีย หัวใจเต้นเร็ว หรือเวียนศีรษะ



2. แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2565

2.1 แบบฟอร์มตัวอย่างของทะเบียนผู้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

บัญชีรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2565

หน่วยงานอำเภอ.....จังหวัด.....

[illegible]

หมายเหตุ เป็นแบบฟอร์มตัวอย่างของทะเบียนผู้รับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่แต่ละหน่วยงานสามารถนำไปใช้
ลงทะเบียนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

2.2 แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2565

แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปี 2565

จังหวัด.....

จังหวัด	หน่วยงาน	ประเภท	จำนวน บุคลากรทาง การแพทย์และ สาธารณสุขทั้งหมด (ราย)	จำนวนวัคซีนป้องกัน โรคไข้หวัดใหญ่ที่ ได้รับการจัดสรร (โดส)*	จำนวนผู้ที่ได้รับ วัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัด ใหญ่ (ราย)	ร้อยละ (จำนวนที่ได้รับวัคซีน/ จำนวนที่ได้รับการ จัดสรร*100)	หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามยอดการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2565 เช่น โรงพยาบาล สสจ. สคร. ศูนย์อนามัย ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานปศุสัตว์ เป็นต้น
2. ประเภท หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามยอดการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2564 ดังนี้ 1) ประเภทหน่วยบริการ ได้แก่ รพศ. รพท. รพช.
2) สังกัด/กรม ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์/สธ กรมอนามัย/สธ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์/สธ กรมปศุสัตว์/เกษตร กรมแพทย์ทหาร/กลาโหม เป็นต้น
- 3.* หากหน่วยบริการไม่ได้รับจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้ใส่ "0" ในช่องจำนวนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ที่ได้รับการจัดสรร พร้อมระบุสาเหตุในช่องหมายเหตุ

3. แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2565

แบบรายงานผลการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2565

เขต.....จังหวัด.....

จังหวัด	อำเภอ	จำนวน วัคซีน ป้องกันโรค ไข้หวัดใหญ่ ที่ได้รับการ จัดสรรใน กลุ่มเป้าหมาย (โดส)	จำนวนผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (ราย)										ผลการได้รับวัคซีน (ร้อยละ)**			ปัญหา/ อุปสรรค
			กลุ่มเป้าหมาย 7 กลุ่มเสี่ยง							รวม (1)- (7)	(8) นอก กลุ่ม เสี่ยง	รวม ทั้งหมด (1-8)	7 กลุ่ม เสี่ยง (กลุ่ม(1)- (7)/ จำนวน จัดสรร× 100)	นอก กลุ่ม เสี่ยง (กลุ่ม (8)/ จำนวน จัดสรร× 100)	รวมทุก กลุ่ม ทั้งหมด (กลุ่ม (1)- (8)/ จำนวน จัดสรร× 100)	
			(1) หญิง ตั้งครรภ์ 4 เดือน ขึ้นไป	(2) เด็ก อายุ 6 เดือน ถึง 2 ปี	(3) ผู้สูง อายุ 65 ปี ขึ้นไป	(4) ผู้ป่วย โรค เรื้อรัง 7 โรค*	(5) ผู้พิการทาง สมองที่ ช่วยเหลือ ตนเองไม่ได้	(6) โรคธาลัสซีเมีย และผู้ที่มี ภูมิคุ้มกัน บกพร่อง (รวมผู้ ติดเชื้อ HIV ที่มี อาการ)	(7) โรคอ้วน (น้ำหนัก>100 กก. หรือ BMI >35 กก./ ตรม.)							

หมายเหตุ

1. ให้รายงานผลการได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ที่ให้บริการจริงทั้งหมด
2. *ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค ประกอบด้วย ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน
3. **ผลการการได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (ร้อยละ) จำแนกเป็น
 - ร้อยละ ของ 7 กลุ่มเสี่ยง = จำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนรวม (1) ถึง (7)/จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร × 100
 - ร้อยละ ของนอกกลุ่มเสี่ยง = จำนวนประชาชนนอกกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีน (8) /จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร × 100
 - ร้อยละ ของ 7 กลุ่มเสี่ยงและนอกกลุ่มเสี่ยง = จำนวนประชาชนกลุ่มเสี่ยงและนอกกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับวัคซีนรวม (1) ถึง (8)/จำนวนวัคซีนที่ได้รับจัดสรร × 100

ภาคผนวกที่ 3 รายชื่อและเบอร์ติดต่อประสานการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

วัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง	วัคซีนสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1) การบริหารจัดการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ การกำกับติดตาม ประเมินผลการดำเนินการให้วัคซีน ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ - นางสาวกฤษณา จงสงเสริม โทรศัพท์ 084 751 1627 E-mail : kritsana.j@nhso.go.th - นางกฤษฐา เกิดอุดม โทรศัพท์ 085 480 3919 E-mail : Karistha.k@nhso.go.th 2) การจัดหาและการกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ - นางสาวจาวรี รัตนยศ โทรศัพท์ 084 438 1824 E-mail : jarawee.r@nhso.go.th 3) การกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (องค์การเภสัชกรรม) ■ ภาคเหนือ/ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/ ภาคใต้ โทรศัพท์ 02-203-8996 ■ ภาคกลาง / ภาคตะวันออก โทรศัพท์ 02-203-8929 ■ กรุงเทพมหานคร / นนทบุรี / สมุทรปราการ โทรศัพท์ 02-203-8989 ■ ภญ.เจริญสถิตย์ ดิยีน โทรศัพท์มือถือ 09-9656-4486 E-mail: d_scmdiv@gpo.or.th ■ ภญ.เกสินี จุฑะสวัสดิ์ โทรศัพท์ 02-203-8908, 02-203-8909 โทรศัพท์มือถือ 09-9197-9539 E-mail: vmi@gpo.or.th	กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 1) การบริหารจัดการและการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนิน โครงการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ - นายแพทย์ชนินันท์ สนธิไชย โทรศัพท์ 02-590-3196-99 E-mail : chaninan33@yahoo.com - นายเผด็จศักดิ์ ขอบธรรม โทรศัพท์ 02-590-3196-99 E-mail : OU056@yahoo.com - นางสาวพรนภา มั๊กกะสัน โทรศัพท์ 02-590-3196-99 E-mail : r506_2012@hotmail.co.th - นางสาววิสรา ชัยวาลย์ โทรศัพท์ 02-590-3196-99 E-mail : rawischai@gmail.com กลุ่มโรคป้องกันด้วยวัคซีน กองโรคติดต่อทั่วไป 2) การจัดหาและการกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ - ภก.อภิชัย พจน์เลิศอรุณ โทรศัพท์ 02-590-3222 E-mail : idol_99_2000@yahoo.com - ภก.ชัตติยะ อุดมอ่าง โทรศัพท์ 02-590-3222 E-mail : kub-2007@hotmail.com - ภญ. ปิยะนาถ เชื้อนาค โทรศัพท์ 02-590-3222 E-mail : indee_indy@msn.com กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์ กองโรคติดต่อทั่วไป 3) สถานการณ์และการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ - นางสาวอ้อยทิพย์ ยาโสภา กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา โทรศัพท์ 02 590 3900 E-mail : o.thippp@gmail.com

วัคซีนสำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยง	วัคซีนสำหรับบุคลากรกลุ่มเสี่ยง
4) ผู้ดูแลระบบ Application - สำนักบริหารสารสนเทศการประกัน - IT helpdesk โทรศัพท์ 02-141-4200	4) อาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน - แพทย์หญิงภาวิณี ด่วงเงิน - กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ - กองระบาดวิทยา โทรศัพท์ 02 590 3900 - E-mail : pawind@gmail.com - นางสาวอภิญญา ปัญจามพัฒนา - กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ - กองระบาดวิทยา โทรศัพท์ 02 590 3900 - E-mail : ap_panja@hotmail.com
การสนับสนุน กรณีเกิดปัญหาการใช้งาน Krungthai Health Platform 1) การใช้งานผ่าน Hospital Portal ติดต่อได้ที่ Krungthai Corporate Call Center 0-2111-9999 E-mail: cash.management@krungthai.com เวลาทำการ 8:00-19:00 (จ-ศ) สำหรับการส่งอีเมลให้ระบุข้อมูลดังนี้ 1. subject: Health Platform Admin setting 2. ชื่อหน่วยงาน: 3. ชื่อ- เบอร์โทรติดต่อกลับ 4. แจ้งปัญหาและหน้าจอ error ที่เกิดขึ้น 2) การใช้งานผ่าน Application เป้าตัง ติดต่อได้ที่ Krungthai Contact Center 0-2111-1111 เวลาทำการ 24 ชม. ทุกวัน	
วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ประกันตนอายุตั้งแต่ 50 ขึ้นไป	
ขอให้ประสานสำนักงานประกันสังคม ในการบริหารจัดการ การช่วยเหลือผู้ประกันตนในการเข้ารับบริการวัคซีน และการกำกับติดตามประเมินผลการดำเนินการให้วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม โทรศัพท์ 02- 956 2500-2510	

ภาคผนวกที่ 4 เอกสารแนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ตามฤดูกาลปี 2565

1. แนวทางการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565
2. แบบฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้บริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2565
โดยสามารถ Download เอกสารได้ที่เว็บไซต์ กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค
https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=12399 และผ่านทางการสแกน QR Code





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

