



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

โรคไข้เลือดออก

สถานการณ์

ปี 2565

อัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกสูงสุด

อัตราการป่วยตามกลุ่มอายุ

5-14 ปี

15-24 ปี

0-4 ปี

อัตราป่วยสูง

อัตราป่วยปานกลาง

อัตราป่วยต่ำ

เริ่มมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น
ตั้งแต่เดือนเมษายนเป็นต้นมา

ผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย

เป็นนักศึกษา เพศชาย
อายุ 20 ปี มีประวัติรับประทานยา
Ibuprofen ขณะป่วย

โดยใน 4 สัปดาห์ล่าสุด
มีรายงานผู้ป่วยจำนวนมากในพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส สงขลา และสตูล

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

- ภาวะอ้วน/น้ำหนักเกิน
- ในผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มีโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ โรคไต
- รับประทาน ยาชุด ยาลดไขกลุ่มสเตียรอยด์ และยาต้านการอักเสบกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) เช่น ยาแอสไพริน (Aspirin) ยาไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ยาไดโคลฟีแนค (Diclofenac)

01/07/65



Google play



App Store