

ลักษณะทางระบาดวิทยา


ของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ประเทศไทย



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control


ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–30 มิถุนายน 2565

ผู้เสียชีวิต จำนวน 8,950 ราย



อายุเฉลี่ย 71 ปี

- ต่ำสุด 1 เดือน
- สูงสุด 109 ปี



อัตราส่วน

เพศชายต่อเพศหญิง


เท่ากับ 1.2 : 1



ประวัติการรับวัคซีน

• ไม่ได้รับวัคซีน	4,568 ราย
• รับวัคซีน 1 เข็ม	641 ราย
• รับวัคซีน 2 เข็ม	2,706 ราย
• รับวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป	657 ราย
• ไม่มีข้อมูล	378 ราย

ประวัติทางสุขภาพ




มีโรคประจำตัว
7,909 ราย




ปฏิเสธโรคประจำตัว
489 ราย



ไม่ระบุ
552 ราย



มีโรคประจำตัว 7,909 ราย (ร้อยละ 88.37)



การป้องกัน

ประชาชนโดยเฉพาะ 7 กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รวมถึงหญิงตั้งครรภ์ ยังจำเป็นต้องฉีดวัคซีน 2 เข็มแรก หรือหากฉีดครบแล้วนาน 3-6 เดือน ควรได้รับเข็มกระตุ้น

ข้อมูลจาก : ทะเบียนผู้เสียชีวิต กรมควบคุมโรค

จัดทำ : 8 ก.ค. 2565

