

Checklist



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ฝีดาษวานร (Monkeypox) สำหรับร้านขายยา

หากมีประวัติสัมผัสใกล้ชิด หรือมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยันฝีดาษวานร

- สัมผัสโดยตรงกับตุ่ม ผื่น แผล สารคัดหลั่ง หรือสัมผัสสิ่งของที่ผู้ป่วยใช้ เช่น เสื้อผ้า ที่นอน
- สัมผัสร่วมบ้าน ใช้ห้องน้ำร่วมกัน หรือพักค้างคืนร่วมกับผู้ป่วยอย่างน้อย 1 คืน
- นั่งรถคันเดียวกัน
- พุดคุย หรืออยู่ใกล้ผู้ป่วยในระยะ 1 เมตร โดยไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือกิจกรรมที่ทำให้เกิดละอองฟุ้ง เช่น การสะบัดผ้าปูที่นอนหรือเสื้อผ้า

✓ สังเกตอาการ

ภายหลังสัมผัสผู้ป่วยภายใน 21 วัน

- ไข้
- ปวดศีรษะ
- ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
- ต่อม้ำเหลืองโต บริเวณหลังหู คอ ขาหนีบ
- เจ็บคอ คัดจมูก หรือ ไอ
- มีผื่น ตุ่มน้ำ ตุ่มหนองขึ้น บริเวณอวัยวะเพศ ทวารหนัก ตามมือ เท้า หน้าอก ใบหน้า หรือบริเวณปาก

ตัวอย่างผื่น ตุ่มฝีดาษวานร



a) early vesicle, 3mm diameter



b) small pustule, 2mm diameter



c) umbilicated pustule, 3-4mm diameter



d) ulcerated lesion, 5mm diameter



e) crusting of a mature lesion



f) partially removed scab

<http://www.bccdc.ca/health-professionals/clinical-resources/monkeypox#clinical>

หากมีอาการให้รีบไปพบแพทย์

ณ ศูนย์แพทย์บางรักด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือ สปคม.

จัดทำ : 5 ส.ค. 2565

