

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ฉบับที่ 32 วันที่ 15 - 21 กันยายน 2565

เหตุการณ์อื่น ๆ

ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 13 กันยายน 2565 สำนักพิมพ์ The Laoian Times นำเสนอข่าวการปรับปรุงระบบรายงานการติดตาม และพยากรณ์อุทกภัยของคณะกรรมการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) เพื่อช่วยให้ผู้อาศัยแถบลุ่มแม่น้ำโขงสามารถรับมือกับเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้สร้างผลกระทบร้ายแรงต่อชุมชนและระบบนิเวศทางการเกษตร และทางธรรมชาติต่อผู้ที่อยู่อาศัย แถบลุ่มแม่น้ำสายหลักอย่างเชียงแสนในประเทศไทย เวียงจันทน์ในลาว พนมเปญ ในกัมพูชา หรือ Chau Doc ในเวียดนาม ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าไปดูสภาพระดับน้ำ และภูมิอากาศ แถบลุ่มแม่น้ำโขงได้อย่างรวดเร็วทันการเปลี่ยนแปลง ในหน้าแรกของ เว็บไซต์ MRC ที่ www.mrcmekong.org
- 15 กันยายน 2565 สำนักกิจการต่างประเทศ เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน ได้เปิดท่าเรือขนถ่ายสินค้า ซึ่งเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่สำคัญ โดยอนุญาตให้เฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้น โดยยังไม่อนุญาตให้ประชาชนใช้สัญจร ขณะเดียวกันท่าเรือสบรวกซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญในลุ่มน้ำโขงของประเทศเมียนมา และมีความเกี่ยวข้องทางการค้าระหว่างไทย - เมียนมา - จีน ได้เปิดดำเนินการเช่นกัน หลังจากปิดมานานกว่า 2 ปี การที่ท่าเรือทั้งสองแห่ง กลับมาเปิดพร้อมกันนับเป็นการฟื้นฟู การค้าทางเรือในลุ่มแม่น้ำโขงทำให้เศรษฐกิจกลับมาขับเคลื่อนอีกครั้ง

“โรคฉี่หนู” ภัยร้ายช่วงฤดูฝน

ฤดูฝน.... เชื่อว่าทุกท่านคงเคยได้ยินชื่อโรคฉี่หนู หรือ เลปโตสไปโรซิส แต่แท้จริงแล้วตัวพาหะไม่ใช่แค่หนูตามชื่อ แต่ยังรวมไปถึง หมา แมว วัว ควาย หนู ฯลฯ เริ่มแรกที่มีการค้นพบโรคนี้ พบว่าเชื้ออยู่ในปัสสาวะของหนู จึงเรียกว่าโรคฉี่หนู แต่ภายหลังพบว่าสัตว์อื่นเป็นพาหะนำโรคได้ แต่ยังคงเรียกโรคฉี่หนูเรื่อยมาด้วยความเคยชิน ข้อมูลจากกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 1 ม.ค. - 12 ก.ย. 65 พบผู้ป่วย 1,545 ราย เสียชีวิต 10 ราย อายุที่พบมากที่สุด 45 - 64 ปี อาชีพที่พบมากที่สุดคือ เกษตรกร และรับจ้าง จังหวัดที่พบผู้ป่วย สูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ระนอง พังงา พัทลุง และน่าน ตามลำดับ ที่ผ่านมามีจังหวัดน่านประสบปัญหาอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนัก ในหลายพื้นที่ ภาวะเช่นนี้สอดคล้องกับรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของเครือข่ายเฝ้าระวังโรคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Basin Disease Surveillance: MBDS) ซึ่งพบว่า เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจังหวัดน่านพบผู้ป่วยโรคฉี่หนูมากถึง 10 ราย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับเชื้ออาจมีหรือไม่มีอาการ ในผู้ที่มีอาการมักแสดงหลังจากได้รับเชื้อ 2-3 วัน จนถึง 2-3 สัปดาห์ อาการที่สำคัญ คือ มีไข้ ปวดศีรษะ ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่น่อง ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ผู้ป่วยบางราย อาจมีอาการแทรกซ้อน คือ ตัวเหลือง ตาเหลือง ไตวาย หรืออาการทางสมอง และระบบประสาท เป็นต้น ซึ่งกลุ่มนี้ต้องได้รับการรักษาอย่างทันถ่วงทีไม่เช่นนั้น อาจเสียชีวิตได้



ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ แจ่ง อสต. ประสานกับ จนท.สาธารณสุข ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคฉี่หนูแก่ลูกบ้าน โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินลุยน้ำ แขน้ำ ถึงช่องทางการที่เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย พฤติกรรมเสี่ยง การป้องกัน อาการที่สำคัญ และโรคแทรกซ้อนซึ่งต้องระวังเป็นพิเศษ การแนะนำเบื้องต้นในการป้องกันตนเองเพื่อลดความเสี่ยงโรคฉี่หนู คือการหลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือเดินลุยน้ำย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่า โดยเฉพาะผู้ที่มีบาดแผลหรือรอยขีดข่วนที่เท้าต้องระวังเป็นพิเศษ ควรสวมรองเท้าบูทกรณีมีบาดแผลควรปิดด้วยพลาสติกกันน้ำ และรีบชำระล้างร่างกายทันทีหลังจากเสร็จจากการทำงานหรือลุยน้ำ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดน
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ
oic.ddc@gmail.com
02-5903832
www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

- <https://www.tropmedhospital.com/uncategorized-th/leptospirosis-3.html>
<https://transbordernews.in.th/home/?p=32398&fbclid=IwAR3Zl3grpKkW48m7mm55sdzn-G4FtN3ft1Z3aAzicmpSCa8GOgpy02irtxg>
- <https://laotiantimes.com/2022/09/13/mekong-river-commission-improves-monitoring-and-flood-forecasting/>
- http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y65/d43_3665.pdf
- ข้อมูลรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลของเครือข่ายเฝ้าระวังโรคลุ่มแม่น้ำโขง (Mekong Basin Disease Surveillance: MBDS) ประจำเดือนสิงหาคม 2565
- ขอบคุณภาพ : <https://www.tropmedhospital.com/knowledge/leptospirosis-2.html>