

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 10 - 16 กุมภาพันธ์ 2565

## เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- ไล้กรอกพิษไทยแพร่กระจายสู่ประเทศเพื่อนบ้าน ในเขตรัฐเกร์เรียญ ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งมีชายแดนติดต่อกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนของประเทศไทย พบว่าชาวเกร์เรียญบริโภคไล้กรอกดังกล่าวและมีอาการผิดปกติต้องนำส่งโรงพยาบาลจำนวน 16 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย
- อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวรัฐบาลลาวเปิดแคมเปญ "ลาวเยือนลาว" เพื่อฟื้นฟูการท่องเที่ยวในประเทศ โดยผ่อนคลายนโยบายต่าง ๆ และอนุญาตให้กิจกรรมต่าง ๆ ในประเทศกลับคืนสู่ภาวะปกติ เนื่องจากจำนวนผู้ป่วย COVID-19 ลดลงอย่างมาก โดยวันที่ 16 กพ 65 พบผู้ป่วยเพียง 345 ราย
- โรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส หรือ ไข้หูดับพบว่ามีอัตราป่วยในปี 2564 สูงขึ้นกว่าปี 2563 ถึง ร้อยละ 67 จังหวัดที่พบมากที่สุดยังคงอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย และพบผู้ป่วยในจังหวัดเดิม ๆ ได้แก่ ลำปาง พะเยา น่าน อุตรดิตถ์ และสุโขทัย ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคคือการรับประทานอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ โดยเฉพาะเนื้อหมู

## จับตาไข้เลือดออกจากระบาด บริเวณชายแดน ไทย - เมียนมาร์

ตั้งแต่ต้นเดือนมกราคม 2565 ประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 305 ราย ในจำนวนนี้เสียชีวิต 1 ราย และจากการพยากรณ์โรคพบว่า การระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในปีนี้จากข้อมูลอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกในปีที่ผ่านมา จังหวัดที่พบอัตราผู้ป่วยสูงสุด คือ แม่ฮ่องสอน รองลงมาได้แก่ ตาก หนอง และชุมพร ตามลำดับ โดยจังหวัดดังกล่าวล้วนมีพื้นที่ชายแดนบางส่วนติดต่อกับประเทศเมียนมาร์ทั้งสิ้น จากข้อมูลยังพบว่าต้นเดือนธันวาคม 2564 มีการเคลื่อนย้ายประชากรชายแดนไทย - เมียนมาร์ ประมาณ 10,000 คน ซึ่งลักษณะประชากรที่เคลื่อนย้าย มีการอยู่อาศัยรวมกันชั่วคราวอย่างหนาแน่น ขาดสุขอนามัยที่ดี อีกทั้งสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเป็นที่เพาะพันธุ์ยุงลาย ทำให้อาจะเป็นแหล่งโรคได้มากที่สุด ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบบริเวณพื้นที่ชายแดน เพิ่มประสิทธิภาพและความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกต่อไป



## ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

- เจ้าหน้าที่แจ้งเตือน อาสาสมัครแรงงานต่างด้าวด้านสาธารณสุข (อสต.) เฝ้าระวังโรคในชุมชนหากพบความผิดปกติให้แจ้งเจ้าหน้าที่หรือผู้นำ อสต.
- ให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยป้องกันยุงลายกัดเช่นทายากันยุง กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ภาชนะต่าง ๆ ที่มีน้ำขังควรเทน้ำออกตากให้แห้ง ส่วนภาชนะที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ควรมีฝาปิดมิดชิด อาจเลี้ยงปลาหางนกยูงเพื่อกินลูกน้ำยุงลายในภาชนะที่เหมาะสม ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ในบ้านให้สะอาด มีการถ่ายเทอากาศได้ดี
- หากพบอาการมีไข้สูง ปวดเมื่อยตัว ปวดกระบอกตา ควรพบแพทย์ไม่ควรซื้อยาแก้ปวดรับประทานเอง เพราะยาแก้ปวดบางชนิดอาจทำให้เกิดเลือดออกภายในอวัยวะต่าง ๆ ได้หากเป็นไข้เลือดออก และเป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตได้

ติดต่อ

oic.ddc@gmail.com

02-5903832

www.ddc.go.th/oic

## รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
ในพื้นที่ชายแดน

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข

## อ้างอิง

- [http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y65/d66\\_0565.pdf](http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y65/d66_0565.pdf)
- [https://transbordernews.in.th/home/?p=30572&fbclid=IwAR3kVJEGUw\\_i1E0UC0jHadAauhTdGYzGnUCYt-mGfo0ybVu2ZwAj7XBX-JA](https://transbordernews.in.th/home/?p=30572&fbclid=IwAR3kVJEGUw_i1E0UC0jHadAauhTdGYzGnUCYt-mGfo0ybVu2ZwAj7XBX-JA)
- <http://outbreaknewstoday.com/thailand-reports-67-increase-in-streptococcus-suis-infections-in-2021-2021/>
- <https://zh.vietnamplus.vn/%E4%B8%8E%E6%96%B0%E5%86%A0%E8%82%BA%E7%82%8E%E7%96%AB%E6%83%85%E5%85%B1%E5%A4%84%E8%80%81%E6%8C%9D%E6%8E%A8%E5%87%BA%E8%80%81%E6%8C%9D%E4%BA%BA%E6%B8%B8%E8%80%81%E6%8C%9D%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E6%B4%BB%E5%8A%A8/158070.vnp>