

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ

ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 19 - 25 พฤษภาคม 2565

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด รายงานว่าพบเชื้อไข้มาลาเรียสายพันธุ์ " โนวาไซ " แพร่จากลิงสู่คนโดยมีขงเป็นพาหะแล้ว 11 ราย อ. บ่อไร่ 2 ราย เกาะช้าง 9 ราย รักษาหายแล้วแต่ให้บุคคลเหล่านี้ระมัดระวัง กักตัวเอง อย่าให้ยุ่งกีดป้องกันการแพร่เชื้อให้คนอื่นได้ กรมควบคุมโรค เผยว่าระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565 มีผู้ป่วยจากเชื้อชนิดนี้แล้ว 70 ราย โดยจังหวัดที่พบสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ระนอง สงขลา และตราด
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลบ้านเปิดรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 หรือเข็มที่ 4 เข้ารับบริการได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้า วัคซีนมีจำนวนทั้งสิ้น 500 โดส
- วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ทำการเปิดด่านพรมแดนถาวรช่องเม็ก อ. สิรินคร อย่างเป็นทางการ ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าออกราชอาณาจักรได้อย่างสะดวก โดยผ่านมาตรการการคัดกรองโรคจากฝ่ายควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ที่เข้า – ออก ราชอาณาจักร จะต้องมิใช่รับรองผลของการฉีดวัคซีน 2 เข็มขึ้นไป หรือ ผลการตรวจโควิด-19 ระบบ RT-PCR (Real Time Polymerase Chain Reaction) ไม่เกิน 72 ชั่วโมงอ้างอิงด้วย หากไม่มีใบรับรองผลของการฉีดวัคซีน 2 เข็ม ขึ้นไป หรือ ผลตรวจผ่านการตรวจโควิด-19 ระบบ RT-PCR ต้องทำการกักตัวที่ศูนย์กักตัว ที่เจ้าหน้าที่จัดเตรียมไว้เป็นเวลา 5 วัน

ตระหนักแต่ไม่ตระหนก “ฝีดาษวานร”

สถานการณ์ทั่วโลกของโรคฝีดาษวานร ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ วันที่ 7 -28 พ.ค. 2565 พบผู้ป่วย 484 ราย จาก 27 ประเทศ แม้ประเทศไทยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร แต่มีการเฝ้าระวังโดยการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศที่มีการระบาด เพื่อตรวจจับกลุ่มเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศ สำหรับโรคฝีดาษวานรนั้น พบได้ในสัตว์ตระกูลลิงและสัตว์ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก กระต่าย หนูป่า เป็นต้น คนติดโรคนี้จากการสัมผัสโดยตรงกับเลือด สารคัดหลั่งหรือตุ่มหนองของสัตว์ที่ติดเชื่อ หรือถูกสัตว์ที่มีเชื้อกัด การกินเนื้อสัตว์ที่มีเชื้อที่ปรุงสุกไม่เพียงพอ โรคนี้ยังสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ หากมีการใกล้ชิดกับผู้ป่วย สัมผัสละอองฝอยทางการหายใจขนาดใหญ่ จากการอยู่ใกล้ผู้ป่วยระยะประชิด การสัมผัสสารคัดหลั่ง การสัมผัสเลือดหรือรอยโรคที่ผิวหนัง หรือของใช้ส่วนตัวที่ปนเปื้อนสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ระยะเวลาฟักตัวของโรคหลังได้รับเชื้อ ประมาณ 7-14 วัน หรืออาจนานถึง 21 วัน อาการเริ่มแรก มีไข้ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดหลัง ต่อมน้ำเหลืองโต หนาวสั่น อ่อนเพลีย ต่อมาจะมีผื่นขึ้น มักจะเริ่มจากบนใบหน้าก่อน จากนั้นจะลามไปยัง แขน ขา ฝ่ามือ ฝ่าเท้า ลำตัว ต่อมาผื่นจะกลายเป็นตุ่มหนอง ในระยะสุดท้ายตุ่มหนองจะเป็นสะเก็ดแล้วหลุดออกมา รอยโรคนี้อาจทำให้เกิดแผลเป็นตามมา อาการป่วยกินเวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคเองได้โรคฝีดาษวานรนั้นยังไม่มีการรักษาเฉพาะ ควรป้องกันการติดเชื้อเป็นวิธีที่ดีที่สุด



ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้ง อสต. ให้ทราบถึงข่าวการระบาดของโรคฝีดาษวานรรวมทั้งติดตามสถานการณ์ข่าวสารอย่างใกล้ชิด และประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการติดต่อ อาการ และการปฏิบัติตนเพื่อลดความเสี่ยง ตามคำแนะนำข้างต้น หากในชุมชนพบผู้เดินทางกลับจากประเทศที่มีการระบาดของโรคฝีดาษวานรให้แยกตัวสังเกตอาการ หากพบมีความผิดปกติ เช่น มีไข้ มีตุ่มผื่นที่ใบหน้า แขน และขา ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางโดยละเอียด

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข

ในพื้นที่ชายแดน

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

ติดต่อ

oic.ddc@gmail.com

02-5903832

www.ddc.go.th/oic

อ้างอิง

- <https://www.nationtv.tv/news/378873918>
- <https://th-th.facebook.com/nanprovince>
- <https://www.facebook.com/751223604962855/posts/pfbid06Z1dY22aLc8un822SYTJCiCpjRY3wYfhTTzZJ27jBWQAFBbGHbN4puNbWrERtWnh/>
- <https://www.bbc.com/thai/international-61522154>
- <https://www.prachachat.net/general/news-937910>
- <https://www.thansettakij.com/general-news/526052>
- <https://www.cdc.gov/poxvirus/monkeypox/symptoms.html>
- ขอบคุนตารพจรก:
<https://www.sanook.com/news/8563786/>