

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ

ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 30 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ตรวจเอชไอวีแห่งชาติ สำหรับในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “HIV ตรวจเร็ว รู้ก่อน ก้าวต่อไป” สำหรับคนไทยทุกคนที่มีบัตรประจำตัวประชาชน ทุกสิทธิ์การรักษาสารสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีได้ฟรี ปีละ 2 ครั้ง ในทุกโรงพยาบาลที่ให้บริการภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งสามารถตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี และรู้ผลภายในวันเดียว
- 1 กรกฎาคม 2565 สื่อมวลชนมีเดีย กรมอนามัย เตือนประชาชนถึงพฤติกรรมเลียนแบบกินเนื้อตุ๊กแกจากกรณีที่มียูทูปเบอร์โชว์กินตุ๊กแกทอดกระเทียม ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ยืนยันได้ว่าตุ๊กแกสามารถรักษาโรคได้จริง หรือไม่ และไม่มีการยืนยันอย่างแน่ชัดว่าการกินตุ๊กแกจะช่วยทำให้ร่างกายได้รับปริมาณของสารอาหารอื่นครบถ้วนและเพียงพอ เน้นกินเนื้อหมู ไก่ ปลา กุ้ง แทนได้ประโยชน์มากกว่า
- 1 กรกฎาคม 2565 หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ รายงานถึงภาวะขาดแคลนแรงงานข้ามชาติ แม้ขณะนี้รัฐบาลเปิดให้นำแรงงานเพื่อนบ้าน 3 สัญชาติ ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา และลาว สามารถทำงานในไทยตาม MOU โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน เหมือนก่อนหน้านี้ซึ่งถือเป็นมาตรการที่ดี แต่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดนตาก (แม่สอด-พมพระ-แม่ระมาด) พบว่ายังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหนัก

โรคติดต่อนำโดยยุงลาย "โรคไข้ชกา" เน้นเฝ้าระวังในหญิงตั้งครรภ์

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 หน่วยงานควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มงานระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ได้ออกปฏิบัติงานติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อนำโดยยุง ภายหลังพบผู้ป่วยที่มีอาการไข้ มีผื่นแดง ตาแดง ปวดข้อ เข้ารับการรักษาที่ สว.สต.หลักหมื่น ตั้งแต่วันที่ 1 - 29 มิถุนายน 2565 จำนวน 44 ราย จากการแจ้งเตือนใน Application Line กลุ่มผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบงานของโรงพยาบาลและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผลการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่ามีผู้ป่วยโรคติดต่อไวรัสชกาของจังหวัดลำปาง จำนวน 1 ราย มีประวัติเดินทางมาในพื้นที่ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2565 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเขลางค์นคร - ราม ในวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ผลตรวจ RT-PCR พบเชื้อไวรัสชกา

โรคติดต่อไวรัสชกา เป็นโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ เมื่อถูกยุงที่มีเชื้อดังกล่าวกัด เชื้อจะแพร่เข้าสู่กระแสโลหิต ระยะฟักตัว 4 - 7 วัน สำหรับอาการโดยทั่วไปอาการคล้ายไข้เลือดออกแต่ปัญหาที่สำคัญคือ หากเกิดในหญิงตั้งครรภ์ ทำให้เด็กทารกที่คลอดมา มีสมองเล็ก (Microcephaly) หรือมีภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ได้ และอาจส่งผลให้เด็กมีพัฒนาการล่าช้า รวมถึงสติปัญญาไม่ดีเท่าเด็กปกติอีกด้วย ประเทศไทยยังคงพบโรคไข้ชกาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติปี พ.ศ.2563 - 2565 พบผู้ป่วยโรคไข้ชกา จำนวน 239, 61 และ 24 ราย ตามลำดับ



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่แจ้ง อสต. ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขขององค์กรส่วนท้องถิ่นร่วมกัน ประชาสัมพันธ์ให้ ความรู้กับลูกบ้านเกี่ยวกับ สาเหตุ อาการ โรคติดต่อไวรัสชกาซึ่งมี ยุงลายเป็นพาหะ โดยเฉพาะกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในชุมชน ซึ่งควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากมีภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายหากติดเชื้อที่เป็นสาเหตุโรคนี้อย่างมาก สำหรับวิธีป้องกันตัวที่ดีที่สุด คือการป้องกันไม่ให้ยุงกัด สวมเสื้อผ้ามิดชิด ทายากันยุงนอนในมุ้ง ใช้น้ำฉีดพ่นหรือจุดยากันยุงการกำจัดยุงในสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชนและบริเวณครัวเรือนอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง ที่จะช่วยลด ความเสี่ยงจากโรคติดต่อไวรัสชกา

ติดต่อ
oic.ddc@gmail.com
02-5903832
www.ddc.go.th/oic

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดน

สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

อ้างอิง

- http://doe.moph.go.th/surdata/506wk/y63/d87_5363.pdf
- <https://www.bumrungrad.com/en/health-blog/may-2016/zika-fever-symptoms-cause-treatment>
- https://www.rama.mahidol.ac.th/rama_hospital/th/services/knowledge/04252020-0025
- <http://www.wongkarnpat.com/viewya.php?id=2197>
- ขอบคุณภาพจาก: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
- รายงานการออกติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวัง สสอบสวนและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโรคติดต่ออื่นโดยยุงอำเภอหอนาหมื่น จังหวัดน่าน เลขที่ นน 0033.004 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565
- <https://www.thecoverage.info/news/content/3696>
- <https://multimedia.anamai.moph.go.th/news/010765-2/>
- <https://www.thansettakij.com/economy/530945>