

รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 3 - 9 พ.ย. 2565

เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และกรมอุตุนิยมวิทยา จับมือ LINE ประเทศไทย เปิดตัว "LINE ALERT" บนแพลตฟอร์ม LINE เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 ซึ่งจะเปิดช่องทางให้บริการข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยที่เกิดขึ้นในประเทศ ผ่านระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงระดับพื้นที่ ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายทั่วถึง ทั้งเวลาและสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ทันที
- 4 พฤศจิกายน 2565 ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ส่งมอบวัคซีน Pfizer โควิด 19 สำหรับเด็กอายุ 5 - 11 ปี จำนวน 201,600 โดสให้กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยผ่านโครงการโคแวกซ์ (COVAX) ซึ่งเป็นโครงการเพื่อความเท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีนโควิด 19 ทั่วโลก
- 4 พฤศจิกายน 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการบริโภคปลาน้ำจืด เกล็ดข้าวแบบดิบๆสุกๆ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับ และเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี โดยเฉพาะทางภาคเหนือและภาคอีสานของประเทศไทยพบความชุกของการเกิดโรคพยาธิใบไม้ในตับสูงที่สุด

"โรคไข้กาฬหลังแอ่น" โรคที่พบไม่บ่อยแต่อันตรายถึงชีวิต

โรคไข้กาฬหลังแอ่น (MENINGOCOCCAL DISEASE) ความหมายของชื่อโรคมีความน่ากลัวและสามารถสะท้อนถึงผลกระทบที่จะเกิดกับร่างกายและชีวิตของเราได้ คือคำว่า "โรคไข้กาฬ" มีความหมายว่า โรคที่มีความรุนแรงและมีพิษร้ายเกิดขึ้นตามร่างกาย คำว่า "หลังแอ่น" บ่งบอกถึงอาการของผู้ป่วยโรคนี้ เนื่องจากผู้ป่วยจะมีอาการหลังแข็งเกร็ง และมีอาการชัก โรคนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย มักพบอยู่ในลำคอของคนปกติ ประมาณร้อยละ 5 โดยไม่ทำให้เกิดโรคพบได้ประปรายตลอดทั้งปี และมีการระบาดในบางพื้นที่เป็นครั้งคราว จากรายงานโรคระบาด สัปดาห์ที่ 44 กรมควบคุมโรค (31 ต.ค. - 6 พ.ย. 65) พบผู้ป่วยเสียชีวิต 1 ราย เป็นชายไทย อายุ 63 ปี ที่จังหวัดปัตตานี อีกหนึ่งรายเป็นผู้ป่วยสงสัยและเสียชีวิต เป็นชายชาวเมียนมา อายุ 19 ปี ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งทั้งสองรายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ดังที่กล่าวแล้วว่าเชื้อโรคนี้โดยปกติพบอยู่ในลำคอ จึงติดต่อกันทางระบบทางเดินหายใจ เช่น การไอ จาม การสัมผัสเยื่อเมือกในปาก จมูก เสมหะหรือน้ำลายผู้ป่วย ระยะฟักตัวประมาณ 3 - 4 วัน โดยเฉลี่ย 1 - 10 วัน อาการเตือนของโรคไข้กาฬหลังแอ่นที่ควรรีบพบแพทย์ ได้แก่ มีไข้สูงทันที ปวดศีรษะอย่างรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน คอแข็ง อาจมีผื่นแดง จำเริญขึ้นตามผิวหนังร่วมด้วย และอาจเกิดภาวะช็อกอย่างรวดเร็ว ทำให้เสียชีวิตได้



ข้อเสนอแนะสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ แจงอสต. ประสานกับ จนท.สาธารณสุข เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคดังกล่าวแก่ลูกบ้าน ในเรื่อง การเกิดโรค อาการเบื้องต้น และการป้องกัน ซึ่งใช้หลักการเดียวกันกับการป้องกันการติดเชื้อโรคระบบทางเดินหายใจ โดยหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับละอองน้ำ มูก น้ำ ลาย เสมหะ รวมทั้งควรสวมหน้ากากอนามัย หากต้องเข้าไปในที่ชุมชนแออัด อากาศถ่ายเทไม่สะดวก สำหรับผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วย หรือผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง ควรปรึกษาแพทย์ถึงแนวทางการป้องกันโรค โดยอาจรับประทานยาต้านจุลชีพ หรือรับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคดังกล่าว

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข
ในพื้นที่ชายแดน
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

อ้างอิง

- https://www.petcharavejhospital.com/en/Article/article_detail/detail_of_Meningococcal_Disease
- <http://dcd.ddc.moph.go.th/2016/knowledges/view/5>
- https://ddc.moph.go.th/disease_detail.php?d=19
- https://www.si.mahidol.ac.th/sidoctor/e-pl/article_detail.asp?id=703
- <https://www.thaigov.go.th/infographic/contents/details/6234>
- <https://laotiantimes.com/2022/11/07/united-states-provides-pediatric-pfizer-vaccines-to-protect-children-from-covid-19/>
- <https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=29421&deptcode=>
- ขอบคุณภาพจาก: <https://hot.muslimthai.com/news/24467>