

หากมีอาการใดอาการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1 มีไข้สูงเป็นเวลานาน

40°C



2

มีอาการไอ ไอเป็นเลือด
อาเจียนเป็นเลือด
เจ็บหน้าอก ปอดอักเสบ

3

มีอาการปวดข้อ
หรือปวดกระดูก



4

หากมีการติดเชื้อ
ฝีที่ผิวหนัง เจ็บบริเวณในช่องท้อง
ปัสสาวะขัด ควรรีบไปโรงพยาบาล
ทันที



เราสามารถป้องกัน โรคmelioidosisได้โดย



ควรสวมรองเท้าบูท

สวมกางเกงขายาว สวมถุงมือยาง
ชุดลุยน้ำเสมอ ก่อนที่จะสัมผัสดิน
หรือน้ำ เช่น ทำการเกษตร จับปลา
ลุยน้ำ ลุยโคลน

ทำความสะอาดร่างกาย
ด้วยน้ำสะอาด และฟอกสบู่ทันที
ภายหลังลุยน้ำ หรือฆ่าโคลน



ควรดื่มน้ำต้มสุก

ดื่มน้ำต้มสุกทุกครั้ง หลีกเลี่ยงการ
รับประทานอาหาร สุก ๆ ดิบ ๆ



www.ddc.moph.go.th



Melioidosis โรคmelioidosis




DDC
1422
สายด่วนกรมควบคุมโรค

เราควรรู้ว่า


โรคเมลิออยด์ หรือ โรคเมลิออยด์โดสิส หรือ โรคไข้ดิน เป็นโรคติดเชื้อแบคทีเรีย พบได้ในดิน และน้ำ นาข้าว ท้องไร่ ท้องนา แปลงผัก สวนยาง ปឹង และบ่อน้ำ ทั่วประเทศทุกภาคในประเทศไทย

ช่วงที่มีฝนตกชุก น้ำจะไหลลงที่ราบ พาเชื้อมาอยู่ที่ผิวดิน ทำให้ชาวนา ชาวสวน มีโอกาสได้รับเชื้อมากขึ้น จึงพบผู้ป่วยจำนวนมากในช่วงฤดูฝน และมีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง **40%**

นอกจากนี้ เชื้อสามารถก่อโรคในสัตว์หลายชนิด เช่น แพะ แกะ วัว ควาย สุกร กวาง



วงจรการเกิดโรค



กลุ่มเสี่ยงของโรค

- ผู้ที่ประกอบอาชีพสัมผัสกับดิน เช่น ชาวนา ชาวสวน ชาวประมง เป็นต้น
- ผู้ที่เป็น **โรคเบาหวาน**
- ผู้ที่มีโรคประจำตัวอื่น ๆ เช่น โรคธาลัสซีเมีย โรคไตวายเรื้อรัง และโรคเริม
- ผู้ที่สูบบุหรี่จัด หรือดื่มสุราเป็นประจำ
- ผู้ที่รับประทานยา หรือสารที่มีส่วนผสมของสเตอรอยด์ เช่น ยาหม้อ ยาต้ม ยาชุด ยาลูกกลอน



แบคทีเรียเข้าสู่ร่างกายได้อย่างไร

- ผ่านเข้าทางผิวหนัง ที่มีการแช่น้ำนาน ๆ ผ่านทางบาดแผล หรือรอยถลอก หรือรอยขีดข่วน
- ผ่านเข้าทางการกินอาหาร หรือดื่มน้ำที่ไม่ได้ต้มสุก ที่มีเชื้อปนเปื้อนเข้าไป หรือกินเนื้อสัตว์ เครื่องในสัตว์ ที่มีลักษณะผิดปกติ โดยไม่ปรุงสุก
- ผ่านเข้าทางปอด โดยการสำลักน้ำ หรือหายใจเอาฝุ่นดินเข้าสู่ปอด

