


อันตรายจากภาวะอับอากาศ

ขาดออกซิเจน



สูดดมก๊าซพิษ

โรคจากภาวะอับอากาศ

พื้นที่อับอากาศ (Confined Space) เป็นสถานที่ที่มีทางเข้าและออกอย่างจำกัด ไม่ได้ออกแบบให้ทำงานต่อเนื่องเป็นประจำ มีการระบายอากาศไม่เพียงพอ และมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศที่อันตราย

พื้นที่เสี่ยงภาวะอับอากาศ



ห้องเก็บปลาใต้ท้องเรือ

ไซโล

อุโมงค์ / ถ้ำ

บ่อ / หลุม / บ่อบาดาล

โรงเผาเห็ด

อาการเบื้องต้น



ปวดหัว วิงเวียนหน้ามืด



คลื่นไส้ อาเจียน



เจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก



เหนื่อยเพลีย อ่อนแรง



ชักเกร็ง ตาพร่ามัว



หมดสติ และเสียชีวิต

การป้องกัน

- ✓ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศควรได้รับการตรวจประเมินความพร้อมทางสุขภาพในการปฏิบัติงาน (fit for work) โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนเริ่มปฏิบัติงาน
- ✓ ห้ามให้บุคคลที่มีโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ โรคหัวใจ โรคอื่น ๆ ที่แพทย์แนะนำเข้าไปปฏิบัติงานในที่อับอากาศ
- ✓ ตรวจสอบวัดสภาพบรรยากาศในสถานที่อับอากาศ เช่น O₂, ก๊าซพิษ และก๊าซที่ลุกติดไฟได้
- ✓ เตรียมพร้อมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย/ อุปกรณ์ช่วยหายใจที่เหมาะสม
- ✓ จัดทำป้ายเตือน/สัญลักษณ์ที่ชัดเจนบริเวณก่อนทางเข้า
- ✓ มีแผน/ช่องทางเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน
- ✓ ผู้ปฏิบัติงานในที่อับอากาศ ได้รับการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมายกำหนด

