



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

ไอกรน

ในเด็ก อาการคล้ายไข้หวัด แต่อันตรายถึงตาย

- ไอ ต่อเนื่องตั้งแต่ 1 สัปดาห์
- มีน้ำมูก
- มีเสียงของลมหายใจดัง “วู๊ป”
- อาเจียน ในขณะที่ไอหรือหลังอาการไอ
- มีอาการหน้าเขียวหรือหน้าแดงหลังอาการไอ



ป้องกันได้ด้วยการพาเด็กไปฉีดวัคซีนไอกรนตามแพทย์นัดหมายให้ครบถ้วน

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไอกรน ในเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปี จำนวน 5 ครั้ง

- ครั้งที่ 1 เริ่มเมื่ออายุ 2 เดือน
- ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 เดือน
- ครั้งที่ 3 เมื่ออายุ 6 เดือน
- ครั้งที่ 4 เมื่ออายุ 18 เดือน
- ครั้งที่ 5 ฉีดวัคซีนกระตุ้นเมื่ออายุ 4 ปี

วันที่ 4 มกราคม 2567



DDC
กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



website



facebook

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

Office of Disease Prevention and Control Region 12, Songkhla
odpc12.ddc.moph.go.th
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422