ชัวร์ก่อนชิด รู้จักซิฟิลิสให้ทัน

รู้ทันซิฟิลิส (Syphilis)...โรคติดต่อที่ป้องกันได้

ซิฟิลิส...คืออะไร?

เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย
จากการสัมผัสถูกเชื้อจากแผล
หรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย
มักพบจากการมีเพศสัมพันธ์
ระยะแรกเริ่มสามารถรักษาหายขาดได้
ส่วนซิฟิลิสระยะแฝงผู้ป่วยจะไม่มีอาการ

ปี พ.ศ. 2568

ป่วย ผู้ป่วย 12,485 ราย
อัตราป่วย 18.90 ต่อประชากรแสนคน

เสียชีวิต ผู้เสียชีวิต 2 ราย
อัตราป่วยตาย 0.016%

กลุ่มอายุ ผู้ป่วยกลุ่มอายุ 15-24 ปี
จำนวน 4,428 ราย
อัตราป่วย 55.34 ต่อประชากรแสนคน

ปี พ.ศ. 2567 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 8.23 เท่า
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

ใช้ถุงยางทุกครั้ง ปลอดภัยไว้ก่อน

ช่องปาก | อวัยวะเพศ | ทวารหนัก

การประเมินความเสี่ยง

คาดว่าจะพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
หากยังมีพฤติกรรมเสี่ยง

- มีคู่เพศสัมพันธ์หลายคน
- เปลี่ยนคู่เพศสัมพันธ์บ่อย
- ไม่ใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์
- ถุงยางแตก รั่ว

สถานการณ์ปี พ.ศ. 2558 – 2568

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568)



ปี พ.ศ. 2567 พบผู้ป่วยกลุ่มอายุ 15-24 ปี
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 10.87 เท่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา

พยากรณ์โรคซิฟิลิส

คาดการณ์ปี พ.ศ. 2568 จะพบผู้ป่วยซิฟิลิสประมาณ 29,068 ราย

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และไวรัสตับอักเสบบี ซี กองระบาดวิทยา