

โรคซิฟิลิส (Syphilis)



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

เชื้อแบคทีเรีย
Treponema pallidum

รับรักษา...ไม่นำพาไปสู่ลูก


โรคซิฟิลิส เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย *Treponema pallidum* ติดต่อจากการสัมผัสแผลผู้ติดเชื้อ การมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ป้องกัน และจากแม่สู่ทารกในครรภ์ หากไม่ได้รับการรักษา อาจทำให้ทารกในครรภ์มีความผิดปกติของร่างกาย และเสียชีวิตได้

ภาวะซิฟิลิสแต่กำเนิด

หญิงตั้งครรภ์ ควรฝากครรภ์ ก่อนอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ ควรเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อซิฟิลิส พร้อมสามีหรือคู่นอน และตรวจเลือดอีกครั้งเมื่ออายุครรภ์ 28-32 สัปดาห์

หากติดเชื้อไม่ได้รับการรักษา

ทารกโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด



อาการ : การบวม น้ำ มีผื่น
ตัวม้ามโต หูหนวก ตามองพิการ

(ที่มารูปภาพ : แนวทางการกำจัดโรคซิฟิลิสแต่กำเนิด พ.ศ.2563 กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค)

โรคซิฟิลิส รักษาให้หายขาดได้ ✓

หากมีเพศสัมพันธ์ที่มีความเสี่ยง ควรรับมาตรวจคัดกรอง และเข้าสู่การรักษาอย่างครบถ้วน ติดตามอาการรักษาต่อเนื่องตามแพทย์สั่ง การติดเชื้อซิฟิลิส ยังเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ

การป้องกัน



มีคู่นอนคนเดียว



สวมถุงยางอนามัย
ทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์



สังเกตอาการและ
ตรวจเลือดสม่ำเสมอ



พาคู่นอนเข้ารับ
การตรวจรักษาพร้อมกัน

ที่มา : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค / กลุ่มโรคติดต่อเรื้อรัง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น



ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2568

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น
Office of Disease Prevention and Control 7 Khonkaen
www.ddc.moph.go.th/odpc7 โทร. 043-222818-9

สายด่วน
กรมควบคุมโรค
1422