โรคพิษสุนัขบ้า Rabies

ภัยเงียบใกล้ตัว ป้องกันได้!

รู้จักโรคพิษสุนัขบ้า

เป็นโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
เกิดจากเชื้อไวรัส Rabies ติดต่อจากน้ำลาย
ของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ติดเชื้อ เช่น สุนัข แมว
ผ่านการกัด ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผล
ทั้งนี้ เมื่อผู้ป่วยแสดงอาการทางระบบประสาทแล้ว
มีอัตราการเสียชีวิต ร้อยละ 100

สถานการณ์ในประเทศไทย
(1 มกราคม - 2 กรกฎาคม 2568)

ผู้ป่วย 7 ราย เสียชีวิตทั้ง 7 ราย
(เป็นผู้ป่วยเข้าข่าย 1 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 6 ราย)

สัตว์นำโรคหลัก



สุนัข **85.7%**
แมว **14.3%**

ปัจจัยเสี่ยงของผู้เสียชีวิต

- ทุกรายไม่ได้รับวัคซีนหลังถูกสัตว์กัด/ข่วน
- ส่วนใหญ่ไม่ได้ล้างแผลหรือทำความสะอาดแผลไม่ถูกวิธี
- สัมผัสสัตว์ที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือไม่ทราบประวัติการได้รับวัคซีนของสัตว์

การป้องกัน

- **ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยง**
  นำสุนัขและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปี
- **ควบคุมสัตว์เลี้ยง**
  ใส่สายจูงเมื่อนำสัตว์เลี้ยงออกนอกบ้าน
- **หลีกเลี่ยงการสัมผัส**
  อย่าเข้าใกล้หรือเล่นกับสัตว์ที่ไม่รู้จัก หรือสัตว์ที่มีอาการผิดปกติ
- **แจ้งเจ้าหน้าที่**
  หากพบสัตว์ป่า สัตว์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มา หรือสัตว์มีอาการผิดปกติในพื้นที่ชุมชน ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์/สาธารณสุข/เทศบาลในพื้นที่ทันที

"ล้างแผล ใส่ยา กักหมา หาหมอ"
เมื่อถูกกัด/ข่วน

ล้างแผลทันที : ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาดอย่างน้อย 15 นาที ให้เข้าถึงรอยลึกของแผล

ใส่ยาฆ่าเชื้อ : เช่น โพวิโดน-ไอโอดีน (เบตาดีน)

กักสัตว์ : กักสัตว์ที่กัด/ข่วนไว้สังเกตอาการ 10 วัน หากสัตว์ตายให้นำซากไปตรวจ

พบแพทย์ทันที : เพื่อประเมินความเสี่ยงและรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (และอาจต้องรับเซรุ่ม) แม้แผลจะเล็กน้อยก็ตาม ต้องฉีดให้ครบตามนัด!

อาการเริ่มต้น มักมีอาการไม่จำเพาะ ได้แก่ มีไข้ ชา/เสียว/ปวดแสบร้อน หรือรู้สึกคันผิดปกติบริเวณแผลที่ถูกกัดหรือข่วน

อาการทางระบบประสาท
แบบคลุ้มคลั่ง : กระวนกระวาย กลัวน้ำ กลัวลม กลืนลำบาก น้ำลายไหลมาก
แบบอัมพาต : กล้ามเนื้ออ่อนแรง เริ่มจากบริเวณที่ถูกกัด

ที่มา : กลุ่มพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคติดต่อ กองระบาดวิทยา ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2568