




กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control



H
P
V

แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกัน การติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)



2569



กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

- E Mail : vaccine.ddc01@gmail.com
- Tel : 02 590 3196 - 7



แนวทางการให้บริการ
วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV)
ปีงบประมาณ 2569

กรมควบคุมโรค
พฤศจิกายน 2568

ที่ปรึกษา

นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น

แพทย์หญิงจุไร วงศ์สวัสดิ์

นายแพทย์ยงเจือ เหล่าศิริถาวร

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค

ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คณะผู้จัดทำ

แพทย์หญิงปิยดา อังศุวัชรกร

นางสาวเกษสุดา ศรีจักร์

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค

คำนำ

มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบมากเป็นอันดับสองในหญิงไทยรองจากมะเร็งเต้านม สาเหตุเกิดจากการติดเชื้อไวรัส Human Papillomavirus หรือเชื้อไวรัส HPV ที่เนื้อเยื่อบริเวณปากมดลูกเจริญผิดปกติ และก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในที่สุด โดยสามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน HPV ซึ่งมีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบติดเชื้อมาก่อน และในปี 2566 กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายเสริมสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนให้มีภูมิคุ้มกันเพียงพอต่อการป้องกันมะเร็งปากมดลูก โดยที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 มีมติเห็นชอบแผนเร่งรัดการฉีดวัคซีน HPV ในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้นอุดมศึกษาปีที่ 2 (หรืออายุ 11 - 20 ปี) โดยเน้นบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ให้ครอบคลุม กลุ่มเป้าหมายก่อน ทั้งนี้หน่วยบริการในพื้นที่สามารถให้บริการวัคซีนเข็มที่ 1 แก่กลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จตามนโยบายดังกล่าวแล้ว โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV Vaccine) ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา จำนวน 2 ล้านโดส โดยสามารถฉีดวัคซีนได้ตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่าย ต่อมาปีงบประมาณ 2568 ยังคงให้บริการฉีดวัคซีนเอชพีวี (HPV) ในหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา โดยตั้งเป้าหมายให้บริการวัคซีน HPV จำนวน 1 ล้านโดส ภายในปีงบประมาณ 2568 โดยฉีดเป็นเข็มที่ 2 ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่เคยได้รับวัคซีนเข็มแรกแล้ว และในผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม) ได้แก่ นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2567 หรือหญิงอายุ 11 - 12 ปี ตามสิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพ และหญิงไทยอายุ 11 - 20 ปี ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน HPV มาก่อน แต่จากผลบริการยังพบว่า การให้บริการวัคซีน HPV ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงวัคซีนในกลุ่มเยาวชน จึงดำเนินโครงการให้บริการในกลุ่มนักเรียนระดับอุดมศึกษา และสามารถอนุโลมการให้วัคซีนแก่กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับชั้นปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี ในกรณีที่มีการให้บริการในรูปแบบบริการในมหาวิทยาลัย (university - based)

ปีงบประมาณ 2569 กรมควบคุมโรค ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายการให้วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) โดยกำหนดให้บริการเป็นลำดับแรกในกลุ่มเป้าหมายนักเรียนหญิง ชั้น ป.5 ปีการศึกษา 2568 (อายุ 11 - 12 ปี) ตามสิทธิประโยชน์ รวมทั้งเก็บตกกลุ่มเป้าหมายหญิงอายุ 11 - 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่มนักเรียนหญิง ป.5 ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เพื่อบริหารจัดการวัคซีน HPV ที่ยังคงคลังในพื้นที่ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และยกระดับภูมิคุ้มกันของประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมต่อการป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ในประเทศไทยต่อไป

กรมควบคุมโรค
พฤษภาคม 2568

สารบัญ

หน้า

แนวทางการให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ปีงบประมาณ 2569	1
1. วัตถุประสงค์.....	1
2. หลักการให้วัคซีน HPV ปีงบประมาณ 2569.....	1
3. กลุ่มเป้าหมาย	2
4. พื้นที่ดำเนินการ	2
5. ระยะเวลาดำเนินการ.....	2
6. หลักการจัดสรรวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์	3
7. รูปแบบการดำเนินงาน.....	3
8. การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV	4
9. วัคซีนที่ให้บริการ	4
10. การจัดส่งวัคซีน สนับสนุนโดย สปสช.	4
12. การบันทึกข้อมูลการให้บริการ.....	4
13. ภาคผนวก	5
- แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV (อายุเกิน 18 ปี)	6
- แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV (อายุต่ำกว่า 17 ปี)	7

แนวทางการให้บริการ

วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี (HPV) ปีงบประมาณ 2569

กรมควบคุมโรค
พฤษภาคม 2568

1. วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส HPV ในกลุ่มเป้าหมาย มุ่งหวังผลในการลดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยมะเร็งปากมดลูกในหญิงไทย

2. หลักการให้วัคซีน HPV ปีงบประมาณ 2569

คำแนะนำเชิงวิชาการ การให้วัคซีน HPV ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค จากที่ประชุม คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 4/2567 วันที่ 10 กรกฎาคม 2567 มีมติคำแนะนำการให้ วัคซีน HPV ดังนี้ ให้วัคซีน HPV เป็นจำนวน 2 เข็ม หรือจำนวน 1 เข็มเป็นทางเลือกโดยให้ครอบคลุมสายพันธุ์ ที่เหมาะสม ตามบริบทและสถานการณ์ของประเทศ โดยต้องเป็นวัคซีนที่ครอบคลุมสายพันธุ์ HPV อย่างน้อย สายพันธุ์ 16 และ 18 กรณีที่ฉีดวัคซีน HPV จำนวน 2 เข็ม ให้มีระยะห่างเข็มอย่างน้อย 6 เดือน สามารถ สับเปลี่ยนชนิดของวัคซีนได้ และกรณีกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่ม Immunocompromised host ให้พิจารณาฉีด วัคซีน HPV จำนวน 3 เข็ม และมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 5/2568 วันที่ 24 กันยายน 2568 มีมติคำแนะนำการให้วัคซีน HPV ดังนี้ เห็นชอบ คำแนะนำการฉีดวัคซีน HPV 2 สายพันธุ์ขึ้นไป ในกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 20 - 26 ปี จำนวน 2 เข็ม และระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือน โดยสามารถ สับเปลี่ยนยี่ห้อระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้

และจากมติการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8(1)/2567 วันที่ 5 สิงหาคม 2567 เรื่อง ขอเสนอการปรับแผนการจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV Vaccine ได้เห็นชอบหลักการให้ฉีด วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม สำหรับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กหญิง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หรืออายุ 11 - 12 ปี และกลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และจากประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภท และขอบเขตบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2567 ระบุให้รายการบริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก จากเชื้อไวรัส HPV เป็น 1) วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ที่มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 ในกลุ่มเป้าหมายเด็กหญิง ป.5 หรือเด็กหญิงอายุ 11 - 12 ปี จำนวน 1 เข็ม หรือ 2) วัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ ที่ มีสายพันธุ์ก่อโรคน้อยสายพันธุ์ที่ 16 และ 18 จำนวน 2 เข็ม กรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัคซีน 1) ได้

ทั้งนี้ หลักการให้วัคซีน HPV ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขได้อ้างอิงคำแนะนำจาก คณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประกาศคณะกรรมการ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุข และคำแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

3. กลุ่มเป้าหมาย

3.1 กลุ่มเป้าหมายตามสิทธิประโยชน์ พิจารณาให้วัคซีนก่อนเป็นลำดับแรก

กลุ่มหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568 หรือ อายุ 11 - 12 ปี หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์

3.2 นอกกลุ่ม ป.5 พิจารณาให้วัคซีน HPV กรณีมีวัคซีนคงคลังในพื้นที่จังหวัด

- 1) กลุ่มนอกเหนือจาก ป.5 อายุ 11 - 20 ปี ที่ไม่เคยรับการฉีดวัคซีน HPV ทั้งในและนอกระบบการศึกษา
- 2) กลุ่มนักศึกษาหญิงไทย อายุ 18 - 20 ปี ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV และอนุมัติให้บริการได้ในนักศึกษาปริญญาตรีที่อายุเกิน 20 ปี

4. พื้นที่ดำเนินการ

ดำเนินการพร้อมกัน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

5. ระยะเวลาดำเนินการ

- เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2569 ให้บริการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ กลุ่มนักเรียนหญิง ป.5 ในสถานศึกษา
- เดือนธันวาคม 2568 - เมษายน 2569 ให้บริการฉีดวัคซีน HPV ที่มีคงคลังในพื้นที่ ในกลุ่มอายุ 11 - 20 ปี ที่นอกเหนือจากนักเรียนหญิงชั้น ป.5

6. หลักการจัดสรรวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

กลุ่มเด็กหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568 (อายุ 11 - 12 ปี) หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์ อ้างอิงจำนวนความต้องการวัคซีน HPV ในปีงบประมาณ 2569 จากข้อมูลสำรวจในระบบ VMI ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและองค์การเภสัชกรรม สำรวจ ณ เดือน พฤศจิกายน 2568

7. รูปแบบการดำเนินงาน

เนื่องจากการให้ฉีดวัคซีน HPV มีกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในระบบการศึกษา และนอกระบบการศึกษา จึงสามารถพิจารณาดำเนินงานตามบริบทของพื้นที่ ดังนี้

กลุ่มเป้าหมาย	รูปแบบการดำเนินงาน
วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์	
นักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568 (อายุ 11 - 12 ปี) หรือเป็นไปตามสิทธิประโยชน์	• ดำเนินงานในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-based vaccination) ผ่านสถาบันการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย	รูปแบบการดำเนินงาน
วัคซีน HPV ชนิด 2, 4 หรือ 9 สายพันธุ์ (กรณีมีคลังในพื้นที่)	
นอกเหนือจากกลุ่ม ป.5 หญิงไทย อายุ 11 - 20 ปี ทั้งในและนอกระบบการศึกษา ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV (กรณีมีวัคซีน HPV คงคลังในพื้นที่)	- ดำเนินงานในรูปแบบวัคซีนนักเรียน (School-based vaccination) ผ่านสถาบันการศึกษา หรือ - สำนักงานสาธารณสุข/สำนักงานมัย กทม. พิจารณาจัดหาช่องทางการเข้าถึงวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวตามความเหมาะสม
หญิงไทย อายุ 18 - 20 ปี ในกลุ่มนักศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับอุดมศึกษา และสามารถอนุญาตให้วัคซีนแก่กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับชั้นปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี	สำนักงานสาธารณสุข/สำนักงานมัย กทม. ให้บริการในรูปแบบบริการในมหาวิทยาลัย (university-based)

8. การตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV

ขอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติการได้รับวัคซีน HPV ก่อนให้บริการ ดังนี้

• ได้รับวัคซีน HPV ครบตามเกณฑ์ ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนเพิ่ม

- 1) กรณีได้รับวัคซีน 3 เข็ม ตามเอกสารกำกับยา
- 2) กรณีได้รับวัคซีน 2 เข็ม (2 หรือ 4 สายพันธุ์) ระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือนขึ้นไป

• กรณีที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ขอให้รับวัคซีน ดังนี้

- 1) ไม่มีประวัติได้รับวัคซีน/ไม่ทราบ ขอให้วัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม



QR Code ตรวจสอบประวัติรับวัคซีน
<https://hpv.ddc.mo>

9. วัคซีนที่ให้บริการ

กลุ่มเป้าหมายแรกตามสิทธิประโยชน์

- ให้บริการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม สำหรับกลุ่มนักเรียนหญิงไทยชั้นป.5 ปีการศึกษา 2568 พิจารณาให้เป็นลำดับแรก

กรณีมีวัคซีน HPV คงคลังในพื้นที่

• ให้บริการวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ จำนวน 1 เข็ม

- สำหรับกลุ่มหญิงอายุ 11 - 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่ม ป.5 ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน HPV ทั้งในและนอกระบบการศึกษา

- กลุ่มนักศึกษา อายุ 18 - 20 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน และสามารถอนุญาตให้วัคซีนแก่กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับชั้นปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี

• **ให้บริการวัคซีน HPV ชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์ จำนวน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน**

- สำหรับกลุ่มหญิงอายุ 11 – 20 ปี นอกเหนือจากกลุ่ม ป.5 ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ทั้งในและนอกระบบการศึกษา และหากเคยได้รับเข็มที่ 1 มาแล้ว ให้พิจารณารับเข็มที่ 2 เป็นชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์

- กลุ่มนักศึกษา อายุ 18 – 20 ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีน และสามารถอนุโลมการให้วัคซีนแก่กลุ่มนักศึกษาหญิงระดับชั้นปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี และหากเคยได้รับเข็มที่ 1 มาแล้ว ให้พิจารณารับเข็มที่ 2 เป็นชนิด 2 หรือ 4 สายพันธุ์

• **ให้บริการวัคซีน HPV ชนิด 2, 4 สายพันธุ์ หรือ 9 สายพันธุ์ จำนวน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน**

- สำหรับกลุ่มนักศึกษาหญิงระดับชั้นปริญญาตรีที่มีอายุมากกว่า 20 ปี หรือตั้งแต่ 21 ปี แต่ไม่เกิน 26 ปี ที่อนุโลมให้วัคซีนในรูปแบบ (university-based) ให้บริการวัคซีน HPV ชนิด 2, 4 สายพันธุ์ หรือ ชนิด 9 สายพันธุ์ จำนวน 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน

ทั้งนี้ อ้างอิงตามมติการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ 5/2568 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2568 เห็นชอบ คำแนะนำการฉีดวัคซีน HPV 2 สายพันธุ์ขึ้นไป ในกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 20 - 26 ปี จำนวน 2 เข็ม และระยะห่างระหว่างเข็ม 6 เดือน โดยสามารถสับเปลี่ยนยี่ห้อระหว่างเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้

10. การจัดส่งวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ สนับสนุนโดย สปสช.

กลุ่มนักเรียนหญิงไทยชั้นป.5 ปีการศึกษา 2568 จัดสรรตามหน่วยบริการตามที่ สปสช. สำรวจ และจะทยอยจัดส่งวัคซีนให้หน่วยบริการ ตามแนวทางที่ สปสช. กำหนด ประมาณเดือนธันวาคม 2568 - มกราคม 2569

11. การเบิก-จ่ายวัคซีน HPV

หน่วยบริการสามารถเบิก - จ่ายวัคซีน HPV ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำหนด

12. การบันทึกข้อมูลการให้บริการ

12.1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ หน่วยบริการ

บันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน HPV ผ่านระบบ MOPH Claim ของกระทรวงสาธารณสุข

12.2 กรุงเทพมหานคร/ สำนักอนามัย/ หน่วยบริการในพื้นที่

บันทึกข้อมูลการให้บริการวัคซีน HPV ผ่านระบบ Krungthai Digital Health Platform ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาคผนวก

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองผู้มีบริการก่อนให้วัคซีน และโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก และวัคซีน HPV

มะเร็งปากมดลูกพบในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ (15 - 45 ปี) พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม จากข้อมูลปี 2560 พบว่า หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 8,184 คนต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตเกิน 50% โดยการฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่เด็ก จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก ควรฉีดตั้งแต่อังไม่เคยมียสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

วัคซีน HPV มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อมาก่อนประมาณร้อยละ 90 หากมีการติดเชื้อ HPV ก่อนการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง ภายหลังการฉีดวัคซีนอาจพบปฏิกิริยา ได้แก่ อาการปวดบวมบริเวณที่ฉีด ผื่นแดงคันบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ ในกรณีที่เกิดในวัยรุ่นเป็นกลุ่มใหญ่ อาจมีความกังวลเรื่องการฉีด หรือกลัวการฉีดวัคซีน จนบางรายมีอาการหน้ามืดเป็นลมหลังได้รับวัคซีน ทั้งหมดนี้อาการดีขึ้นและหายเป็นปกติในเวลาไม่นาน และไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน HPV ครบถ้วนตามกำหนด ยังคงมีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม และเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนยังไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์โดยอาจสามารถก่อโรคได้อยู่

การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน HPV ให้ปฏิบัติตามปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายตามปกติ ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดออกไปก่อน ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ สามารถรับประทานยาประจำได้ตามปกติ หากมีโรคประจำตัวที่รุนแรง หรือไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์

ข้อมูลแสดงความประสงค์การฉีดวัคซีน HPV

ชื่อผู้มีบริการ.....
นามสกุล.....
อายุ..... ปี วันเดือนปีเกิด.....
เลขประจำตัว 13 หลัก.....
ที่อยู่.....
หมู่ที่..... ถนน.....
ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....
หมายเลขโทรศัพท์.....
ชื่อสถานศึกษา.....
ชั้น/ปี..... ห้อง.....

ประวัติการได้รับวัคซีน HPV

- ☐ ไม่เคยได้รับวัคซีน
☐ เคยได้รับวัคซีน
☐ ได้รับเข็มที่ 1 เมื่อวันที่.....
☐ ได้รับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่.....



QR Code สำหรับสืบประวัติรับวัคซีน HPV
<https://hpv.ddc.moph.go.th/>

ท่านได้รับทราบข้อมูลและได้ซักถามรายละเอียดจนเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน HPV
และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า ☐ ประสงค์ฉีดวัคซีน HPV โดยสมัครใจ ☐ ไม่ประสงค์ ฉีดวัคซีน HPV และขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง

ลงชื่อ.....
(.....)
วันที่...../...../.....

หมายเหตุ : ขอให้นำเอกสารนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน



ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV (อายุเกิน 18 ปี)

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
(สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อคัดกรองผู้มารับบริการก่อนให้วัคซีน และโปรดเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยบริการ)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูก และวัคซีน HPV

มะเร็งปากมดลูกพบในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์ (15 - 45 ปี) พบมากเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม จากข้อมูลปี 2560 พบว่า หญิงไทยเป็นมะเร็งปากมดลูกสูงถึง 8,184 คนต่อปี และมีอัตราเสียชีวิตเกิน 50% โดยการฉีดวัคซีน HPV ตั้งแต่เด็ก จะช่วยลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็งปากมดลูก ควรฉีดตั้งแต่วัยยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์และร่างกายอยู่ในวัยที่สร้างภูมิคุ้มกันได้ดี

วัคซีน HPV มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกในผู้ที่ยังไม่พบการติดเชื้อมาก่อนประมาณร้อยละ 90 หากมีการติดเชื้อ HPV ก่อนการฉีดวัคซีนจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันลดลง ภายหลังการฉีดวัคซีนอาจพบปฏิกิริยา ได้แก่ อาการปวดบวมบริเวณที่ฉีด ผื่นแดงคันบริเวณที่ฉีด มีไข้ ปวดศีรษะ ในกรณีที่ฉีดในวัยรุ่นเป็นกลุ่มใหญ่ อาจมีความกังวลเรื่องการฉีด หรือกลัวการฉีดวัคซีน จนบางรายมีอาการหน้ามืดเป็นลมหลังได้รับวัคซีน ทั้งหมดมีอาการดีขึ้นและหายเป็นปกติในเวลาไม่นาน และไม่เป็นอันตราย ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน HPV ครบถ้วนตามกำหนด ยังคงมีความจำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม และเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ เช่นเดียวกับผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีน เพราะวัคซีนยังไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์โดยอาจสามารถก่อโรคได้อยู่

การเตรียมตัวก่อนรับวัคซีน HPV ให้ปฏิบัติตามปกติ พักผ่อนให้เพียงพอ ออกกำลังกายตามปกติ ไม่เครียดหรือวิตกกังวล หากเจ็บป่วยไม่สบายควรเลื่อนการฉีดออกไปก่อน ผู้ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ สามารถรับประทานยาประจำได้ตามปกติ หากมีโรคประจำตัวที่รุนแรง หรือไม่แน่ใจ ให้ปรึกษาแพทย์

ข้อมูลแสดงความประสงค์การฉีดวัคซีน HPV (กรณีนักศึกษาอายุต่ำกว่า 18 ปี)

ชื่อ (ผู้ปกครอง).....นามสกุล.....มีความสัมพันธ์เป็น

.....

ชื่อ (นักศึกษา)

อายุ.....ปี วัน/เดือน/ปีเกิด.....

เลขประจำตัว 13 หลัก.....

ที่อยู่.....

หมู่ที่.....ถนน.....

ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อสถานศึกษา.....

ชั้น/ปี.....ห้อง.....

ประวัติการได้รับวัคซีน HPV

☐ ไม่เคยได้รับวัคซีน

☐ เคยได้รับวัคซีน

☐ ได้รับเข็มที่ 1 เมื่อวันที่.....

☐ ได้รับเข็มที่ 2 เมื่อวันที่.....



QR Code ตรวจสอบประวัติรับวัคซีน HPV <https://hpv.ddc.moph.go.th/>

ท่านได้รับทราบข้อมูลและได้ซักถามรายละเอียดจนเข้าใจเกี่ยวกับวัคซีน HPV

และอาการไม่พึงประสงค์ของวัคซีนที่อาจเกิดขึ้น เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้าพเจ้า ☐ ประสงค์ฉีดวัคซีน HPV โดยสมัครใจ ☐ ไม่ประสงค์ ฉีดวัคซีน HPV และขอรับรองว่าข้อมูลเป็นความจริง

ลงชื่อ..... ผู้ปกครอง/ผู้แทนโดยชอบธรรม ลงชื่อ..... ผู้เยาว์

(.....)

(.....)

วันที่...../...../.....

วันที่...../...../.....

หมายเหตุ : ขอให้นำเอกสารนี้แสดงแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ในวันที่ฉีดวัคซีน



ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีน HPV (อายุไม่เกิน 17 ปี)