

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/ ๓๕๖๓



คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมาย

เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการจัดทำแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 และดำเนินการจัดส่งวัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการฉีดวัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อลดการป่วยรุนแรงและอัตราการเสียชีวิต และปกป้องระบบสาธารณสุขของประเทศ นั้น

กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ พิจารณาแล้ว เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 Pfizer ของหน่วยงานในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และการให้บริการเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอความร่วมมือจากคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ให้เคร่งครัดตามเกณฑ์การให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer สำหรับให้บริการในกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นย้ำสถานพยาบาลในการให้วัคซีน Pfizer แก่กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทยในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ดังนี้

๑. เคร่งครัดการฉีดวัคซีนให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่

๑.๑ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

๑.๑.๑ ประเภทที่ ๑ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้านหน้าทุกคนที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 จากการปฏิบัติงานทั่วประเทศ รวมทั้งนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่ต้องสัมผัสผู้ป่วยโควิดจากการปฏิบัติงาน เช่น แผนกผู้ป่วยนอก แผนกผู้ป่วยใน คลินิกทางเดินหายใจ ห้องฉุกเฉิน แผนกผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลสนาม เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สอบสวนโรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสถานที่กักกันหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจดูแลผู้ป่วยโควิด 19 อื่นๆ ตามการพิจารณาของสถานพยาบาล/หน่วยงานต้นสังกัด โดยมีหลักการให้วัคซีน ดังนี้

๑) บุคลากรที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือ Sinopharm ครบ ๒ เข็ม อย่างน้อย ๑ เดือนพิจารณาให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer กระตุ้น ๑ เข็ม

๒) บุคลากรที่ได้รับวัคซีนใด ๆ มาแล้วเพียง ๑ เข็ม พิจารณาให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ โดยกำหนดระยะห่างระหว่างโดส ตามชนิดของวัคซีนเข็มที่ ๑ เป็นหลัก

๓) บุคลากรที่เคยติดเชื้อโควิดและไม่เคยได้รับวัคซีน พิจารณาให้วัคซีนโควิด 19 Pfizer ๑ เข็ม โดยมีระยะห่างจากวันที่พบการติดเชื้ออย่างน้อย ๑ เดือน

๑.๑.๒ ประเภทที่ ๒ บุคลากรตามข้อ ๑.๑.๑ ที่ไม่เคยได้วัคซีนใดๆ มาก่อน พิจารณาให้วัคซีน Pfizer ๒ เข็ม ห่างกัน ๓ สัปดาห์ ดังนั้น ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร พิจารณาการจัดสรรวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้าที่ได้รับการระบุงรายชื่อให้เข้ารับวัคซีนจนครบถ้วนก่อน หากมีวัคซีนเพียงพอให้พิจารณาจัดสรรกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ตักสำรวจ หรือ บุคลากรที่แจ้งความประสงค์รับวัคซีนเพิ่มเติม หรือบุคลากรใหม่ ทั้งนี้ ให้สถานพยาบาลรับผิดชอบในการให้วัคซีนแก่บุคลากรในสังกัดที่ยังปฏิบัติหน้าที่ ณ วันที่จัดส่งรายชื่อมาขอรับการสนับสนุนวัคซีน โดยขอให้หัวหน้าสถานพยาบาลตรวจสอบรายชื่อบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการสนับสนุนวัคซีนและผู้ที่ได้รับวัคซีนให้เป็นบุคคลเดียวกัน และเปิดเผยจำนวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ได้รับการฉีดวัคซีน Pfizer เพื่อความโปร่งใส

๑.๒ กลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทยในจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

๑.๒.๑. เครื่องครัดการฉีดวัคซีนให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ ผู้มีภาวะเสี่ยงสูงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด 19 ที่มีสัญชาติไทย ในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (๑๓ จังหวัดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒๘) ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) ดังนี้

๑.๒.๑.๑ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป

๑.๒.๑.๒ ผู้มีโรคเรื้อรัง ๗ กลุ่มโรค อายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ได้แก่

๑) โรคทางเดินหายใจเรื้อรังรุนแรง เช่น ปอดอุดกั้นเรื้อรังและโรคหอบหืด ที่ควบคุมได้ไม่ดี

๒) โรคหัวใจและหลอดเลือด

๓) โรคไตเรื้อรังระยะ ๕

๔) โรคหลอดเลือดสมอง

๕) โรคเมเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างเคมีบำบัด รังสีบำบัดและภูมิคุ้มกันบำบัด

๖) โรคเบาหวาน

๗) โรคอ้วน ที่มีน้ำหนักมากกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม หรือ ดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตร

๑.๒.๑.๓ หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป

๑.๒.๑.๔ กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังในเด็กที่จะทำให้โรคโควิด 19 รุนแรงตามคำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีดังต่อไปนี้

๑) บุคคลที่มีโรคอ้วน (ดัชนีมวลกายมากกว่า ๓๕ กิโลกรัมต่อตารางเมตรหรือมีน้ำหนัก ๗๐ กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ ๑๒ - ๑๓ ปี ที่มีน้ำหนัก ๘๐ กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ ๑๓ - ๑๕ ปี ที่มีน้ำหนัก ๙๐ กิโลกรัมขึ้นไป ในเด็กอายุ ๑๕ - ๑๘ ปี หรือเด็กอ้วนที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดกั้น)

๒) โรค...

- ๒) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้ง หอบหืดที่มีอาการปานกลางหรือรุนแรง
- ๓) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
- ๔) โรคไตวายเรื้อรัง
- ๕) โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
- ๖) โรคเบาหวาน
- ๗) กลุ่มโรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาท อย่างรุนแรงเด็กที่มีพัฒนาการช้า

๑.๓ ชาวต่างชาติและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ

๑.๓.๑ ชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย เน้นผู้สูงอายุและโรคเรื้อรัง หญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ ๑๒ สัปดาห์ขึ้นไป และชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศที่มีหลักฐานแสดงความจำเป็นว่าต้องรับวัคซีน Pfizer ก่อนถึงประเทศปลายทาง เช่น นักเรียน/นักศึกษา นักกีฬา นักการทูต หรือผู้ที่มีความจำเป็นต้องทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยมีขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติ ดังนี้

๑.๓.๑.๑ กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกระทรวงการต่างประเทศ (www.expatvac.consular.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และรับบริการตามจุดบริการที่กำหนด โดยกระทรวงการต่างประเทศประสานการดำเนินงานร่วมกับกรมควบคุมโรค

๑.๓.๑.๒ กรณีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลใกล้บ้าน และเข้ารับบริการตามจุดบริการที่จังหวัดกำหนด หรือสามารถลงทะเบียนตามข้อ ๑.๓.๑.๑ ได้อีกช่องทางหนึ่ง

๑.๓.๒ ชาวไทยต้องเดินทางไปต่างประเทศ ให้แสดงหลักฐานความจำเป็นว่าต้องรับวัคซีน Pfizer ตามที่ประเทศปลายทาง เช่น สถานศึกษา/สถานประกอบการกำหนด หรือ มีประวัติแพ้วัคซีนชนิดอื่นอย่างรุนแรง ณ โรงพยาบาลที่ให้บริการวัคซีน Pfizer เพื่อประกอบการพิจารณาของหัวหน้าสถานพยาบาลที่ให้วัคซีนต่อไป

๑.๓.๓ สำหรับนักเรียนสัญชาติไทยที่ต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศภายในปี ๒๕๖๔

๑.๓.๓.๑ กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนกับศูนย์ฉีดวัคซีน และสุขภาพบางรักเพื่อนัดหมายเข้ารับวัคซีน

๑.๓.๓.๒ กรณีอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมควบคุมโรคเพื่อนัดหมายเข้ารับวัคซีน ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานความจำเป็นว่าต้องรับวัคซีน Pfizer ตามที่ประเทศปลายทางกำหนด ให้หัวหน้าสถานพยาบาลสามารถพิจารณาให้วัคซีนชนิดอื่น เช่น AstraZeneca หรือ Sinovac ได้ตามความเหมาะสม

๒. ติดตามกำกับให้มีการรายงานผลให้บริการวัคซีนรายบุคคลให้ครบทุกคน และบันทึกจำนวนวัคซีนคงคลังประจำวัน ผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/> โดยขอให้สถานพยาบาลตรวจสอบการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องและตรงตามกลุ่มเป้าหมาย หากพบว่ามีกรบันทึกข้อมูลคลาดเคลื่อนขอให้แก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว

๓. หากพบการฉีดวัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขด่านหน้า กลุ่มเสี่ยงสัญชาติไทยในจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและชาวไทยที่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ หรือมีประเด็นข้อร้องเรียน ข่าวดูสารผ่านสื่อมวลชน หรือโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนนอกกลุ่มเป้าหมาย ให้คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรายงานไปยังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูล นำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๖๙ - ๙๙ ต่อ ๑๓๒

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙ ต่อ ๑๐๒

สำเนาส่ง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร