

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๙๒๒



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓๖๘ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าในผิวหนัง การฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม กรณีการให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ รวมทั้งการฉีดวัคซีน Moderna

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข้าในผิวหนัง (ID) แนะนำให้ใช้เฉพาะกรณีที่มีปริมาณวัคซีนจำกัด

๒. ให้ฉีดวัคซีนไข้วัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนโควิด 19 ได้

๓. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม

๓.๑ ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ ด้วยวัคซีน Pfizer ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน ขึ้นไป

หลังเข็มที่ ๒

๓.๒ ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน ขึ้นไป

หลังเข็มที่ ๒ หรือภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

๔. การให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้วัคซีน และกรณีเดินทางไปต่างประเทศ

๔.๑ กรณีแพ้วัคซีนโควิด 19 ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

๔.๒ กรณีผู้เดินทางไปต่างประเทศ ให้พิจารณาฉีดวัคซีนตามข้อกำหนดของประเทศปลายทาง

๔.๒.๑ ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ๑ - ๒ เข็ม และวัคซีน AstraZeneca ๑ เข็ม ให้รับวัคซีน AstraZeneca เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ ๘ สัปดาห์ หรือให้รับวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ ๔ สัปดาห์

๔.๒.๒ ผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ๑ - ๒ เข็ม และวัคซีน Pfizer ๑ เข็ม ให้รับวัคซีน Pfizer เพิ่มเติม ๑ เข็ม ระยะห่างจากเข็มสุดท้าย ไม่น้อยกว่า ๓ - ๖ เดือน ระยะเวลาสั้นที่สุดที่รับวัคซีนได้ ๔ สัปดาห์

๔.๒.๓ ผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ๑ เข็ม และวัคซีน Pfizer ๑ เข็ม สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้

๕. การฉีด...

๕. การฉีดวัคซีน Moderna

๕.๑ การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

๕.๑.๑ ให้ฉีดวัคซีน Moderna ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์ โดยสามารถฉีดได้ในผู้ที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ตามเอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna

๕.๒ การฉีดวัคซีนสูตรไขว้

๕.๒.๑ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Sinovac และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๒ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน AstraZeneca และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๓ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Sinopharm และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๒.๔ ให้ฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วยวัคซีน Pfizer และเข็มที่ ๒ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕.๓ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

๕.๓.๑ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒

๕.๓.๒ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒

๕.๓.๓ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม ให้ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ ๓ ด้วยวัคซีน Moderna ระยะห่างประมาณ ๖ เดือน หลังเข็มที่ ๒ เช่นเดียวกับวัคซีน Pfizer หรือสามารถให้วัคซีนได้ก่อน ๖ เดือน หลังเข็มที่ ๒ โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีนภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ - ๙