



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ ต่อ ๑๐๒

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒ /ว ๓๑๕๔

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การเร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓๗๘ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มีมติให้เร่งรัดฉีดวัคซีนโควิด 19 ของประเทศไทย

กรมควบคุมโรค จึงขอให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๑. ให้ทุกจังหวัดพิจารณาฉีดวัคซีนโควิด 19 ได้ทุกสูตรที่ได้รับการรับรองทางวิชาการ โดยการฉีดวัคซีนโควิด 19 ขอให้คำนึงวันหมดอายุของวัคซีน เร่งฉีดโดยเร็วก่อนวันหมดอายุ และบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ภายใต้วัคซีนคงคลังที่มีอยู่ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
 ๒. ให้ตรวจสอบวันหมดอายุของวัคซีนที่มีอายุ และเร่งฉีดโดยเร็วก่อนวันหมดอายุ
 ๓. ให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกในประชากรทั้งสัญชาติไทยและมีเชื้อสัญชาติไทย
 ๔. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เข้ารับวัคซีนโดยเร็ว
 ๕. การขอคืนวัคซีนที่ใกล้หมดอายุ กำหนดให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแจ้งขอคืนวัคซีนที่ใกล้หมดอายุ ไม่น้อยกว่า ๒ เดือน ไปยังกรมควบคุมโรค และเมื่อได้รับการอนุมัติคืนวัคซีนจากกรมควบคุมโรค จึงประสานการส่งคืนวัคซีนต่อไป
- ทั้งนี้ ได้แจ้งเร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าวไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายอภิชาติ วชิรพันธ์)
รองอธิบดี รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมควบคุมโรค

สรุปคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข

๑. การฉีดวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน				
	วัคซีน	ระยะห่างระหว่างเข็ม	รายละเอียด	
๑.๑	Pfizer ๒ เข็ม	๓ - ๔ สัปดาห์	<ul style="list-style-type: none"> กำหนดให้ฉีดวัคซีนในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาหรือเทียบเท่าที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป กรณีที่มีวัคซีนเพียงพออาจพิจารณาให้ในผู้ที่มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไปทุกกลุ่มเป้าหมาย 	
๑.๒	AstraZeneca ๒ เข็ม	๘ - ๑๒ สัปดาห์	กำหนดให้ฉีดในผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ทุกคน	
๑.๓	Sinopharm ๒ เข็ม	๓ - ๔ สัปดาห์	เป็นวัคซีนทางเลือก รายละเอียดการใช้ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนด	
๑.๔	Moderna ๒ เข็ม	๔ สัปดาห์	เอกสารกำกับยาจากบริษัท Moderna ระบุว่า สามารถใช้ได้กับผู้ที่มีอายุ ๑๒ ปี ขึ้นไป	
๒. การฉีดวัคซีนสูตรไขว้				
	เข็มที่ ๑	เข็มที่ ๒	ระยะห่างระหว่างเข็ม	หมายเหตุ
๒.๑	Sinovac	AstraZeneca/ Pfizer	๓ - ๔ สัปดาห์	ใช้ในผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ้นไป ทุกกลุ่ม
๒.๒	Sinovac	Moderna	๔ สัปดาห์	
๒.๓	AstraZeneca	Pfizer	๔ - ๑๒ สัปดาห์	
๒.๔	AstraZeneca	Moderna	๔ สัปดาห์	
๒.๕	Pfizer	Moderna	๔ สัปดาห์	
๒.๖	Sinopharm	Moderna	๔ สัปดาห์	ให้วัคซีนตามคำแนะนำในเอกสารกำกับยาจากบริษัทผู้ผลิตวัคซีน
๓. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น				
	ประวัติวัคซีน	เข็มกระตุ้น	ระยะห่างระหว่างเข็ม	หมายเหตุ
๓.๑	Sinovac - Sinovac	AstraZeneca/ Pfizer*	ตั้งแต่ ๔ เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒*	* หากมีวัคซีนเพียงพอ สามารถให้ได้ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป
๓.๒	Sinovac - Sinovac	Moderna	ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒	
๓.๓	Sinopharm-Sinopharm	AstraZeneca/ Pfizer*	ตั้งแต่ ๔ เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒*	
๓.๔	Sinopharm-Sinopharm	Moderna	ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒	
๓.๕	AstraZeneca - AstraZeneca	Pfizer/ Moderna	ตั้งแต่ ๖ เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒	กรณีกระตุ้นด้วย Moderna สามารถให้วัคซีนได้ก่อน ๖ เดือน หลังเข็มที่ ๒ โดยใช้ระยะห่างและขนาดวัคซีน ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์

สรุปคำแนะนำการให้วัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข (ต่อ)

๔. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่เคยติดเชื้อและรักษาหายแล้ว				
	ประวัติการได้รับวัคซีน	เข็มกระตุ้น	หมายเหตุ	
๔.๑	ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาก่อน	AstraZeneca ๑ เข็ม	สามารถฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หลังติดเชื้อและรักษาหายดีแล้ว อย่างน้อย ๓ เดือนขึ้นไป	
๔.๒	ได้รับวัคซีน ๑ เข็ม	AstraZeneca ๑ เข็ม		
๔.๓	ได้วัคซีนครบ ๒ เข็ม น้อยกว่า ๒ สัปดาห์แล้วติดเชื้อ	AstraZeneca ๑ เข็ม		
๔.๔	ได้วัคซีนครบ ๒ เข็ม มากกว่า ๒ สัปดาห์แล้วติดเชื้อ	ไม่ต้องฉีดวัคซีน	เนื่องจากภูมิคุ้มกันสูงเพียงพอต่อการป้องกันโรค	
๕. การให้วัคซีนโควิด 19 กรณีเดินทางไปต่างประเทศ				
	ประวัติการได้รับวัคซีน	วัคซีน ที่พิจารณาปรับเพิ่มเติม (เข็ม ๓ - ๔ สำหรับผู้เดินทาง)	ระยะห่าง จากเข็มสุดท้าย	ระยะเวลาสั้นที่สุด
๕.๑	Sinovac ๑ - ๒ เข็ม / AstraZeneca	AstraZeneca	> ๓-๖ เดือน	๘ สัปดาห์
๕.๒	Sinovac ๑ - ๒ เข็ม / AstraZeneca	Pfizer	> ๓-๖ เดือน	๔ สัปดาห์
๕.๓	Sinovac ๑ - ๒ เข็ม / Pfizer	Pfizer	> ๓-๖ เดือน	๔ สัปดาห์
๕.๔	AstraZeneca / Pfizer	สามารถเดินทางได้		
๖. การให้วัคซีนโควิด 19 กรณีแพ้ววัคซีน				
	ขอให้เปลี่ยนชนิดวัคซีนตามเกณฑ์ ในแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 ภายใต้ดุลยพินิจของแพทย์			

หมายเหตุ คำแนะนำอาจมีการปรับเปลี่ยนตามข้อมูลการศึกษาวินิจฉัยที่เพิ่มขึ้นในอนาคต หรือ สถานการณ์การระบาด หรือ จำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงเวลา