



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๒๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๐๒

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว ๓๓๓๐๗ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ และกรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนจากต่างประเทศ ที่เป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ และสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๓๘๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 กรณีการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น กรณีที่ได้รับวัคซีนจากต่างประเทศ ที่เป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทย

กรมควบคุมโรค จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนจากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน

๑.๑ กรณีบุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือวัคซีน Sinopharm ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้ใช้วัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna ในการกระตุ้นเป็นเข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ตั้งแต่ ๔ สัปดาห์ขึ้นไป

๑.๒ กรณีบุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้ใช้วัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna ในการกระตุ้นเป็นเข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๓ กรณีบุคคลที่ได้รับวัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna ครบ ๒ เข็ม แนะนำให้ใช้วัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna ในการกระตุ้นเป็นเข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้นตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป

๒. การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเข็มที่ ๓ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนสูตรไขว้

๒.๑ กรณีบุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือวัคซีน Sinopharm เป็นเข็มที่ ๑ และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้ใช้วัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna ในการกระตุ้นเป็นเข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป

๒.๒ กรณีบุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac หรือวัคซีน Sinopharm เป็นเข็มที่ ๑ และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้ใช้วัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna ในการกระตุ้นเป็นเข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป


๒.๓ กรณีบุคคลที่ได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๑ และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มที่ ๒ แนะนำให้ใช้วัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna ในการกระตุ้นเป็นเข็มที่ ๓ โดยมีระยะห่างระหว่างเข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้น ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป

๓. หลักการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพิ่มเติม กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศ กรณีที่ได้รับวัคซีนจากต่างประเทศ โดยเป็นวัคซีนที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศไทยเช่น Spuknit V, Spuknit Light, J&J, covaxin, abdala, และอื่นๆ

๓.๑ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศ ได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ ขอให้เทียบเคียงกับคำแนะนำการฉีดวัคซีนของประเทศไทยตามชนิดของวัคซีนที่เคยได้รับ

๓.๒ กรณีผู้ที่ได้รับวัคซีนมาจากต่างประเทศ ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ขอให้พิจารณาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น โดยเทียบเคียงชนิดของวัคซีนตามคำแนะนำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นของประเทศไทย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ โดยขอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดำเนินการเปิดช่องทาง การลงทะเบียนและให้บริการวัคซีนเข็มกระตุ้นแก่กลุ่มเป้าหมายรวมทั้งบริหารจัดการวัคซีนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และจำนวนวัคซีนในพื้นที่ หรือ จำนวนวัคซีนที่ได้รับมอบในแต่ละช่วงเวลาต่อไป ทั้งนี้ ได้แจ้งคำแนะนำดังกล่าวไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

รายละเอียดชนิดวัคซีนโควิด 19

ลำดับที่	ชนิดวัคซีน	รายการวัคซีน
๑.	Inactivated vaccine	CoronaVac / Sinovac Sinopharm BIBP Sinopharm WIBP Covaxin QazVac/ QazCovid-in Minhai CoviVac COVIran Barekat Chinese Academy of Medical Sciences COVID-19 vaccine FAKHRAVAC (or MIVAC)
๒.	Subunit vaccine	Abdala EpiVacCorona Zifivax Soberana 02 Novavax MVC-COV1901 COVAX-19 / SpikoGen Razi Cov Pars
๓.	Viral vector vaccine	Oxford–AstraZeneca Janssen Sputnik V Sputnik Light Convidecia
๔.	mRNA vaccine	Pfizer–BioNTech Moderna