

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/๓



กระทรวงสาธารณสุข

ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข บุคลากร  
ด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง การให้วัคซีนในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี และการให้วัคซีน  
โควิด 19 เข็มที่ ๓ กรณีผู้ได้รับวัคซีนนอกสูตร

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง  
ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก จากการประชุมคณะอนุกรรมการ  
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ  
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ครั้งที่ ๓๘๙ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  
มีมติให้คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
บุคลากรด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง และการให้วัคซีนในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี

กระทรวงสาธารณสุข จึงขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๑. การฉีดวัคซีนโควิด 19 เข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข  
บุคลากรด่านหน้า และประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคเรื้อรัง

๑.๑ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็ม  
กระตุ้นเข็มที่ ๓ กำหนดให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีน Pfizer หรือวัคซีน  
Moderna จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่าง ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๓

๑.๒ บุคคลที่ได้รับวัคซีน Sinovac ครบ ๒ เข็ม และได้รับวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้น  
เข็มที่ ๓ กำหนดให้ได้รับการกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน Pfizer หรือวัคซีน Moderna จำนวน ๑ เข็ม โดยมี  
ระยะห่าง ตั้งแต่ ๓ เดือนขึ้นไป หลังเข็มที่ ๓

๑.๓ การฉีดวัคซีน Pfizer เข็มกระตุ้นเข็มที่ ๔ แนะนำให้ฉีดโดสตามมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม  
หากมีผู้ประสงค์จะฉีดครั้งโตส หรือฉีดเข้าในผิวหนังให้เป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ และความสมัครใจของ  
ผู้รับวัคซีน

๑.๔ การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ ๔ ในกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับวัคซีนสูตรอื่นๆ ให้เป็นไป  
ตามดุลยพินิจของแพทย์และความสมัครใจของผู้รับวัคซีน

๒. การให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี

๒.๑ การให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี ต้องเป็นวัคซีนที่ขึ้นทะเบียนกับทาง  
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำหรับการฉีดในเด็กอายุ ๕-๑๑ ปี ตามขนาดและข้อบ่งใช้ที่กำหนด

๒.๒ การตัดสินใจให้เด็กเข้ารับวัคซีน ให้เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ปกครอง

๒.๓ กำหนด...

๒.๓ กำหนดให้โรงเรียนเป็นสถานที่ฉีดวัคซีนหลัก ร่วมกับฉีดที่โรงพยาบาล โดยให้มีการ  
ทำความเข้าใจกับผู้ปกครองให้เห็นชอบก่อนให้เด็กเข้ารับวัคซีน

๒.๔ ควรมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบคอบ ไม่ควรรีบฉีดวัคซีนจนเกินไป  
ทั้งนี้ จะมีการแจ้งแนวทางการดำเนินงานการให้วัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ในภายหลัง

๓. การให้วัคซีนโควิด 19 เข็มที่ ๓ กรณีผู้ได้รับวัคซีนนอกสูตร

๓.๑ บุคคลที่ได้รับวัคซีนนอกสูตร กำหนดให้วัคซีนเพิ่มเติมเข็มที่ ๓ เป็นวัคซีน Pfizer  
หรือวัคซีน Moderna จำนวน ๑ เข็ม โดยมีระยะห่าง ตั้งแต่ ๓ เดือน ขึ้นไป หลังเข็มที่ ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข

ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ - ๙

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ - ๙

สำเนาส่ง ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร