

ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๗/ว ๑๕๘



คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
กรมควบคุมโรค
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง คำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี

เรียน ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบการแพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง ประกอบกับมีการติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์กลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมาก กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้วัคซีนโควิด 19 เพื่อลดความรุนแรงของการเจ็บป่วยและเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประชาชนไทย อย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขจึงได้จัดทำคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในกลุ่มเป้าหมายอายุ ๕ - ๑๗ ปี เพื่อให้ได้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดแก่เด็ก มีความเหมาะสมกับจำนวนวัคซีนในพื้นที่ ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค คำแนะนำของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย และคำแนะนำภายใต้การขึ้นทะเบียนของคณะกรรมการอาหารและยา ประกอบกับบริบทการให้บริการวัคซีนในประเทศไทย ที่มีความหลากหลายแตกต่างกัน ทั้งในเขตเมือง ชนบท รวมถึงพื้นที่ทุรกันดารห่างไกล ซึ่งอาจมีทรัพยากร ระบบการขนส่งและจัดเก็บวัคซีน หรือระบบให้บริการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ หรือแต่ละช่วงเวลา และคำนึงถึงปัจจัยเชิงนโยบายการจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมประชากรในประเทศ

กรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ขอแจ้งคำแนะนำการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๗ ปี ดังนี้

๑. เด็กอายุ ๕ - ๖ ปี กำหนดให้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ขนาด ๑๐ ไมโครกรัม/๐.๒ มิลลิลิตร จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ สัปดาห์

๒. เด็กอายุ ๖ - ๑๑ ปี กำหนดให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๒.๑ กำหนดให้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ขนาด ๑๐ ไมโครกรัม/๐.๒ มิลลิลิตร จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ สัปดาห์ หรือ

๒.๒ กำหนดให้ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ ให้วัคซีนซิโนแวค ขนาด ๐.๕ มิลลิลิตร เป็นเข็มที่ ๑ และวัคซีนไฟเซอร์ ขนาด ๑๐ ไมโครกรัม/๐.๒ มิลลิลิตร เป็นเข็มที่ ๒ ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๓. เด็กอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี กำหนดให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ดังนี้

๓.๑ กำหนดให้ได้รับวัคซีนไฟเซอร์ ขนาด ๓๐ ไมโครกรัม/๐.๓ มิลลิลิตร จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ - ๔ สัปดาห์ หรือ

๓.๒ กำหนดให้ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ คือ ให้วัคซีนซิโนแวค ขนาด ๐.๕ มิลลิลิตร เป็นเข็มที่ ๑ และวัคซีนไฟเซอร์ ขนาด ๓๐ ไมโครกรัม/๐.๓ มิลลิลิตร เป็นเข็มที่ ๒ ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๔. เด็กอายุ...

๔. เด็กอายุ ๖ - ๑๗ กำหนดให้ได้รับวัคซีนซิโนแวค ขนาด ๐.๕ มิลลิลิตร จำนวน ๒ เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๕. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เร่งรัดความครอบคลุมวัคซีนในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี ดังกล่าว โดยสามารถบริหารจัดการให้วัคซีนโควิด 19 ได้อย่างเหมาะสมทั้งการฉีดในสถานพยาบาล และผ่านระบบสถานศึกษา ตามบริบทของจังหวัด รายละเอียดตามแนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี (ฉบับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค https://ddc.moph.go.th/dcd/journal_detail.php?publish=12328 หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้

๖. ขอให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด สืบหาความประสงค์ของการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี และส่งไปยังกรมควบคุมโรค ทาง google form https://docs.google.com/spreadsheets/d/18uyadrc7nEP-ep7wbncrTNHF2OicC1FUIEoX_arxiwE/edit?usp=sharing ภายในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการวัคซีนสำหรับกลุ่มเป้าหมายต่อไป รายละเอียดตามภาคผนวกที่ ๓ แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19 สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี (ฉบับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)

อธิบดีกรมควบคุมโรค

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖

โทรสาร ๐ ๒๕๙๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๐๒



แนวทางการให้บริการวัคซีนโควิด 19

สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปี

(ฉบับวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)