



# ด่วนที่สุด

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมควบคุมโรค กองโรคติดต่อทั่วไป โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๕๖ ต่อ ๑๓๓

ที่ สธ.๐๔๑๐.๑๒/ว.๓๔๗

วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ และผู้อำนวยการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ด้วยกรมควบคุมโรคได้แนะนำแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 โดยพิจารณาภายใต้คำแนะนำของคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับผลการศึกษาประสิทธิภาพการใช้วัคซีนตามที่ได้บริการจริงในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๔๑๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงได้จัดทำแผนจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กรมควบคุมโรค ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ของกรมควบคุมโรค ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

### ๑. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

#### ๑.๑ วัคซีน AstraZeneca

๑.๑.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สำหรับผู้ที่อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ตามสูตรวัคซีน AstraZeneca - AstraZeneca และ AstraZeneca - Pfizer

๑.๑.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในผู้ที่ได้รับวัคซีน ตามสูตร AstraZeneca - AstraZeneca (ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ - ๑๒ สัปดาห์) และ Pfizer - AstraZeneca (ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์)

๑.๑.๓ ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตรดังนี้

๑.๑.๓.๑ Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๔ สัปดาห์ขึ้นไป

๑.๑.๓.๒ Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๑.๓.๓ AstraZeneca - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ - ๖ เดือนขึ้นไป เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน โดยหากเว้นระยะห่างจากเข็มที่ ๒ เป็นเวลา ๖ เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร AstraZeneca - AstraZeneca - AstraZeneca ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอาจไม่สูงเท่ากับการฉีดสูตร AstraZeneca - AstraZeneca - Pfizer จึงให้พิจารณาฉีดในผู้ที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีน mRNA

๑.๑.๓.๔ Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๔ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๓ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป เฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศ และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ๑๐ จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี

๑.๑.๔ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับข้อ ๑.๑.๑

#### ๑.๒ วัคซีน Pfizer

๑.๒.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ สำหรับผู้ที่อายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนตามสูตรวัคซีน Pfizer - Pfizer (ฝาสีม่วง) ระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ - ๔ สัปดาห์

๑.๒.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปีที่มี ๗ กลุ่มโรคเรื้อรังและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงฉีดวัคซีนให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นปีอื่นถัดลงไปตามลำดับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามสูตรวัคซีน Pfizer - Pfizer (ฝาสีส้ม) ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ สัปดาห์

๑.๒.๓ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่อายุ ๖ - ๑๑ ปี และสูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้ที่อายุ ๑๒ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๑.๒.๔ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วย AstraZeneca ตามสูตร AstraZeneca - Pfizer ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ - ๑๒ สัปดาห์

๑.๒.๕ ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตร ดังนี้

๑.๒.๕.๑ สูตร AstraZeneca - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๒.๕.๒ สูตร Sinovac/Sinopharm - Pfizer สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๒.๕.๓ ผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๗ ปีที่ได้รับวัคซีนตามสูตร Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๔ สัปดาห์ขึ้นไป (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน)

๑.๒.๖ ผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับข้อ ๑.๒.๑

#### ๑.๓ วัคซีน Sinovac

๑.๓.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ สูตรทางเลือก Sinovac - Sinovac สำหรับผู้ที่อายุ ๖ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๑.๓.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่อายุ ๖ - ๑๑ ปี และสูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้ที่อายุ ๑๒ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๒. ขอให้ทุกหน่วยบริการบันทึกผลการฉีดวัคซีนรายบุคคล และจำนวนวัคซีนคงคลังประจำวันผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ



(นายไกราส การย์กวีนพงศ์)  
อธิบดีกรมควบคุมโรค