

# ด่วนที่สุด

ที่ สธ ๐๔๑๐.๑๒/ว๒๐๙



กระทรวงสาธารณสุข  
ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ฝาสี่เหลี่ยม) ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เดือนมีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔ แผ่น  
๒. แบบสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ฝาสี่เหลี่ยม) เดือนเมษายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ แผ่น

ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้แนะนำแนวทางการให้วัคซีนโควิด 19 โดยพิจารณาภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ร่วมกับผลการศึกษาประสิทธิผลการใช้วัคซีนตามที่ได้บริการจริงในประเทศ รวมทั้งสถานการณ์และเงื่อนไขในการบริหารจัดการวัคซีนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๔๑๙ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จึงได้จัดทำแผนจัดสรรวัคซีนโควิด 19 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งแผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 สำหรับเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

## ๑. แนวทางการให้วัคซีนโควิด 19

### ๑.๑ วัคซีน AstraZeneca

๑.๑.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สำหรับผู้ที่อายุ ๑๘ ปีขึ้นไปที่ไม่เคยได้รับวัคซีน ตามสูตรวัคซีน AstraZeneca - AstraZeneca และ AstraZeneca - Pfizer

๑.๑.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปในผู้ที่ได้รับวัคซีน ตามสูตร AstraZeneca - AstraZeneca (ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ - ๑๒ สัปดาห์) และ Pfizer - AstraZeneca (ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์)

๑.๑.๓ ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตรดังนี้

๑.๑.๓.๑ Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๔ สัปดาห์ขึ้นไป

๑.๑.๓.๒ Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๑.๓.๓ AstraZeneca - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๓ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ - ๖ เดือนขึ้นไป เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน โดยหากเว้น

ระยะห่าง...

ระยะห่างจากเข็มที่ ๒ เป็นเวลา ๖ เดือนขึ้นไป จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตามการฉีดวัคซีนสูตร AstraZeneca - AstraZeneca - AstraZeneca ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นอาจไม่สูงเท่ากับการฉีดสูตร AstraZeneca - AstraZeneca - Pfizer จึงให้พิจารณาฉีดในผู้ที่ไม่ต้องการฉีดวัคซีน mRNA

๑.๑.๓.๔ Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ ๔ หลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๓ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป เฉพาะกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กลุ่มเจ้าหน้าที่ด่านหน้า และกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั่วประเทศ และประชาชนที่อาศัยอยู่ใน ๑๐ จังหวัดนำร่องท่องเที่ยว ได้แก่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี กระบี่ พังงา กรุงเทพมหานคร ชลบุรี สมุทรปราการ นนทบุรี กาญจนบุรี และปทุมธานี

๑.๑.๔ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับข้อ ๑.๑.๑

#### ๑.๒ วัคซีน Pfizer

๑.๒.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนตามสูตรวัคซีน Pfizer - Pfizer (ฝาสีม่วง) ระยะห่างระหว่างเข็ม ๓ - ๔ สัปดาห์

๑.๒.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สำหรับเด็กอายุ ๕ - ๑๑ ปีที่มี ๗ กลุ่มโรคเรื้อรังและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนเป็นอันดับแรก จากนั้นจึงฉีดวัคซีนให้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และชั้นปีอื่นถัดลงไปตามลำดับจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ตามสูตรวัคซีน Pfizer - Pfizer (ฝาสีส้ม) ระยะห่างระหว่างเข็ม ๘ สัปดาห์

๑.๒.๓ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๑ ปี และสูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๑.๒.๔ ฉีดเป็นเข็มที่ ๒ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ ๑ ด้วย AstraZeneca ตามสูตร AstraZeneca - Pfizer ระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ - ๑๒ สัปดาห์

๑.๒.๕ ฉีดเป็นเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ ตามสูตร ดังนี้

๑.๒.๕.๑ สูตร AstraZeneca - AstraZeneca สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๒.๕.๒ สูตร Sinovac/Sinopharm - Pfizer สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๓ เดือนขึ้นไป

๑.๒.๕.๓ ผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๗ ปีที่ได้รับวัคซีนตามสูตร Sinovac/Sinopharm - Sinovac/Sinopharm สามารถฉีดวัคซีน Pfizer เป็นเข็มกระตุ้นหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ แล้ว ๔ สัปดาห์ขึ้นไป (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน)

๑.๒.๖ ผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด 19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับข้อ ๑.๒.๑

#### ๑.๓ วัคซีน Sinovac

๑.๓.๑ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ และ ๒ สูตรทางเลือก Sinovac - Sinovac สำหรับผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์

๑.๓.๒ ฉีดเป็นเข็มที่ ๑ สูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๖ - ๑๑ ปี และสูตรทางเลือก Sinovac - Pfizer (ฝาสีม่วง) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๑๒ - ๑๗ ปี โดยมีระยะห่างระหว่างเข็ม ๔ สัปดาห์



๒. การบริหารจัดการวัคซีน Pfizer (ฝาสี่ส้อม) กรณีไม่มีเด็กแสดงความประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ ๑ แล้ว ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด เก็บเป็นวัคซีนสำรองสำหรับฉีดเข็มที่ ๒ สูตร Pfizer – Pfizer เมื่อถึงกำหนด โดยวัคซีนที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ ๒ – ๘ องศาเซลเซียส จะมีอายุการเก็บรักษา ๑๐ สัปดาห์

๓. ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด แจ้งความประสงค์รับวัคซีน Pfizer (ฝาสี่ส้อม) สำหรับเข็มที่ ๒ และเด็กตกค้างที่ประสงค์รับวัคซีนเข็มที่ ๑ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ผ่าน Google Sheet ภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๓๐ น. รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔. ให้เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มที่ ๑ เข็มที่ ๒ และเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุ โดยขอให้ดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการค้นหาและเร่งรัดให้ประชาชน/ผู้สูงอายุเข้ารับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 และจัดบริการให้ประชาชนสามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนแบบ Walk-in ได้ตามสถานพยาบาลที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด รวมถึงส่งเสริมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้บริการฉีดวัคซีนตามแนวทางการกระทรวงสาธารณสุขกำหนด


๕. ให้ทุก รพ.สต. มีวัคซีนคงคลังเพื่อความสะดวกในการให้บริการประชาชน และสามารถเปิดฉีดวัคซีนได้ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ครบจำนวนตามโดสในแต่ละขบวนการฉีดที่กำหนด โดยเพิ่มการให้บริการในเชิงรุกตามสถานที่ที่ใกล้แหล่งพักอาศัย สถานที่ประกอบการ และแหล่งชุมชน

๖. กระทรวงสาธารณสุขจะจัดส่งวัคซีนโควิด 19 สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง หากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประสงค์ขอรับการสนับสนุนวัคซีนเพิ่มเติมระหว่างรอบการจัดส่งหรือมากกว่าแผนจัดสรรวัคซีนกำหนด ขอให้ทำหนังสือไปยังกรมควบคุมโรค เพื่อจะพิจารณาจัดส่งวัคซีนเพิ่มเติมพร้อมกับการจัดส่งรอบถัดไป กรณีต้องการรับวัคซีนเร่งด่วนขอให้ระบุวันและเวลาที่จะขอรับวัคซีนในหนังสือฉบับดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ จำนวนวัคซีน Pfizer ที่จะจัดสรรขึ้นอยู่กับจำนวนวัคซีนที่กรมควบคุมโรคได้รับมอบ

๗. ขอให้ทุกหน่วยบริการบันทึกผลการฉีดวัคซีนรายบุคคล และจำนวนวัคซีนคงคลังประจำวันผ่านระบบติดตามการให้วัคซีนกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Immunization Center) ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข <https://cvp1.moph.go.th/>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์)  
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข  
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมควบคุมโรค

กองโรคติดต่อทั่วไป

โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๓๓

โทรสาร ๐ ๒๕๕๐ ๓๑๙๖ ต่อ ๑๐๒

## แผนการจัดสรรวัคซีนโควิด 19 เดือนมีนาคม 2565

เขตสุขภาพ	จังหวัด	วัคซีน Sinovac สำหรับอายุ 6 - 11 ปี (โดส)	วัคซีน AstraZeneca สำหรับเป็นเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝาม่วง) สำหรับเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี และสำหรับเป็นเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฟ้าสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี (โดส)
1	เชียงราย	8,757	125,771	33,501	41,238
1	เชียงใหม่	11,366	235,799	198,659	53,503
1	น่าน	3,251	38,898	31,636	15,315
1	พะเยา	2,803	50,728	17,270	13,218
1	แพร่	2,487	33,954	20,391	11,721
1	แม่ฮ่องสอน	2,311	24,716	3,447	10,899
1	ลำปาง	4,056	60,487	43,778	19,099
1	ลำพูน	2,486	42,809	15,337	11,721
2	ตาก	5,367	60,997	19,761	25,280
2	พิษณุโลก	5,973	79,229	23,057	28,129
2	เพชรบูรณ์	6,961	65,513	15,829	32,771
2	สุโขทัย	3,904	45,508	6,407	18,379
2	อุตรดิตถ์	2,838	35,873	7,777	13,376
3	กำแพงเพชร	5,182	47,861	24,289	24,403
3	ชัยนาท	2,146	22,642	4,093	10,122
3	นครสวรรค์	7,158	106,532	18,312	33,705
3	พิจิตร	3,678	54,779	13,119	17,330
3	อุทัยธานี	2,356	24,938	8,305	11,103



เขตสุขภาพ	จังหวัด	วัคซีน Sinovac สำหรับอายุ 6 - 11 ปี (โดส)	วัคซีน AstraZeneca สำหรับเป็นเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝาม่วง) สำหรับเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี และสำหรับเป็นเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี (โดส)
4	นครนายก	1,872	14,912	7,083	8,817
4	นนทบุรี	8,220	54,071	56,644	38,705
4	ปทุมธานี	8,463	64,436	33,447	39,853
4	พระนครศรีอยุธยา	5,938	34,919	16,334	27,971
4	ลพบุรี	5,052	45,813	11,389	23,794
4	สระบุรี	5,083	44,416	15,619	23,941
4	สิงห์บุรี	1,371	8,151	5,026	6,463
4	อ่างทอง	1,883	14,679	19,705	8,883
5	กาญจนบุรี	6,488	56,748	10,605	30,551
5	นครปฐม	6,390	45,577	18,354	30,100
5	ประจวบคีรีขันธ์	4,300	55,992	15,640	20,248
5	เพชรบุรี	3,444	34,142	6,587	16,216
5	ราชบุรี	6,154	67,683	15,493	28,985
5	สมุทรสงคราม	1,161	11,756	2,789	5,482
5	สมุทรสาคร	4,757	75,092	27,971	22,409
5	สุพรรณบุรี	6,008	53,692	28,572	28,288
6	ฉะเชิงเทรา	4,218	81,854	26,046	19,875
6	ฉะเชิงเทรา	5,560	42,709	20,284	26,182
6	ชลบุรี	12,628	137,459	60,785	59,439
6	ตราด	1,704	32,527	2,715	8,029
6	ปราจีนบุรี	3,949	46,428	16,331	18,603
6	ระยอง	6,636	107,339	29,176	31,239
6	สมุทรปราการ	8,970	93,488	30,659	42,240
6	สระแก้ว	4,581	49,703	16,375	21,585



เขตสุขภาพ	จังหวัด	วัคซีน Sinovac สำหรับอายุ 6 - 11 ปี (โดส)	วัคซีน AstraZeneca สำหรับเป็นเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝาม่วง) สำหรับเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี และสำหรับเป็นเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี (โดส)
7	กาฬสินธุ์	7,021	92,844	40,870	33,062
7	ขอนแก่น	13,044	151,412	77,656	61,418
7	มหาสารคาม	6,359	91,954	20,125	29,953
7	ร้อยเอ็ด	8,904	93,323	39,421	41,915
8	นครพนม	5,534	57,250	23,925	26,068
8	บึงกาฬ	3,601	35,260	12,889	16,959
8	เลย	4,971	86,713	19,414	23,421
8	สกลนคร	8,969	92,067	37,423	42,220
8	หนองคาย	3,873	43,063	7,869	18,232
8	หนองบัวลำภู	3,902	37,073	17,287	18,378
8	อุดรธานี	11,948	163,217	42,611	56,260
9	ชัยภูมิ	8,138	106,464	25,193	38,322
9	นครราชสีมา	19,659	250,335	77,379	92,547
9	บุรีรัมย์	12,460	61,750	41,396	58,660
9	สุรินทร์	10,709	118,543	29,827	50,427



เขตสุขภาพ	จังหวัด	วัคซีน Sinovac สำหรับอายุ 6 - 11 ปี (โดส)	วัคซีน AstraZeneca สำหรับเป็นเข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝาม่วง) สำหรับเป็นเข็มที่ 1 และ 2 ผู้ที่มีอายุ 12 - 17 ปี และสำหรับเป็นเข็มที่ 2 และเข็มกระตุ้น ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (โดส)	วัคซีน Pfizer (ฝาสีส้ม) สำหรับผู้ที่มีอายุ 5 - 11 ปี (โดส)
10	มุกดาหาร	2,832	31,695	13,007	13,333
10	ยโสธร	3,800	49,641	27,351	17,894
10	ศรีสะเกษ	11,042	141,523	37,040	51,993
10	อำนาจเจริญ	2,836	36,385	17,057	13,366
10	อุบลราชธานี	14,800	190,741	88,492	69,675
11	กระบี่	4,877	94,368	10,831	22,972
11	ชุมพร	4,146	58,644	23,588	19,536
11	นครศรีธรรมราช	13,007	182,615	43,822	61,229
11	พังงา	2,345	23,080	5,353	11,056
11	ภูเก็ต	3,631	14,154	4,793	17,105
11	ระนอง	1,548	10,430	10,109	7,286
11	สุราษฎร์ธานี	9,474	142,455	34,202	44,606
12	ตรัง	5,456	56,751	9,543	25,697
12	นราธิวาส	9,127	16,853	16,158	42,963
12	ปัตตานี	8,432	17,491	13,691	39,706
12	พัทลุง	4,135	73,121	14,822	19,470
12	ยะลา	6,693	15,715	8,556	31,520
12	สงขลา	13,115	69,853	58,983	61,746
12	สตูล	3,378	45,387	7,568	15,911
13	กรุงเทพมหานคร	37,882	215,231	340,184	178,316
สำรองส่วนกลาง		442	1,979	2,967	7,368
กรมการแพทย์		-	-	-	120,000
รวม		500,000	5,400,000	2,300,000	2,479,800









แบบสำรวจความต้องการวัคซีน Pfizer (ไฟสีส้ม) เดือนเมษายน ๒๕๖๕

<https://bit.ly/3K3XEuu>